



285.2

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

~~~~~  
No. 3426





**Elfter Bericht**

der

**Oberhessischen Gesellschaft**

für

**Natur- und Heilkunde.**



Mit 1 Steindrucktafel.

---

<sup>Sm</sup>  
Gießen,  
im August 1865.



# I n h a l t.

---

|                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung. Von <b>W. Scriba</b> . . . . .                                                                                                       | 1     |
| II. Mykologische Vegetationsbilder in Skizzen. Von <b>H. Hoffmann</b> .                                                                                                                                  | 59    |
| III. Parerga botanica . . . . .                                                                                                                                                                          | 70    |
| 1. Ueber die Wirkung des Kochens auf Pflanzensamen .                                                                                                                                                     | 70    |
| 2. Ueber das s. g. Erfrieren der Pflanzen bei Temperaturen über 0°. Von <b>H. Hoffmann</b> . . . . .                                                                                                     | 72    |
| IV. Beiträge zur Kenntniß der Kryptogamenflora des Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete. . . .                                                                                            | 75    |
| V. Pilze. Von Graf <b>Friedrich zu Solms-Laubach</b> . . . .                                                                                                                                             | 75    |
| VI. Flechtenflora von Frankfurt a. M. Von <b>H. Bagge u. Metzler</b>                                                                                                                                     | 82    |
| VII. Beiträge zur Kryptogamenflora der Wetterau. Von <b>Uloth</b> .                                                                                                                                      | 92    |
| VIII. Laubmoose gesammelt von Verschiedenen. . . . .                                                                                                                                                     | 100   |
| IX. Verzeichniß der von Dillenius (Catalogus plantarum sponte circa Gissam crescent. Francof. 1719 pag. 213 bis 230) in der Umgebung von Gießen beobachteten Laubmoose. Von <b>J. Rofsmann</b> . . . . . | 101   |
| V. Beiträge zur Geologie des hess. Odenwaldes. Von <b>P. Seibert</b> .                                                                                                                                   | 109   |
| VI. Vegetationszeiten im Jahre 1862 und 1863 in Gießen. Von <b>H. Hoffmann</b> . . . . .                                                                                                                 | 138   |
| VII. Meteorologische Beiträge. . . . .                                                                                                                                                                   | 140   |
| I. Meteorologische Beobachtungen zu Salzhausen im Jahr 1863. Von <b>Tasche</b> . . . . .                                                                                                                 | 140   |
| II. Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen im botanischen Garten zu Gießen. Von <b>H. Hoffmann</b> . . .                                                                                          | 144   |
| VIII. Beiträge zur Kenntniß einiger Lichenensporen. Von <b>W. Uloth</b> .                                                                                                                                | 146   |
| IX. Bericht über die Thätigkeit und den Stand der Gesellschaft vom 1. Juli 1863 bis 1. Juli 1865. Von <b>W. Diehl</b> . . . .                                                                            | 155   |
| Aufforderung an die Freunde der Pflanzenkunde. Von <b>H. Hoffmann</b> .                                                                                                                                  | 183   |

---



## I.

### Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung.

Von Herrn Pfarrer **W. Scriba** in Ober-Lais bei Nidda.

(Fortsetzung.)

#### ***Sphaerüdae.***

**Sphaerius.** Waltl.

1. *S. acaroides* Waltl. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Seligenstadt auf schlammigem Boden gefunden.

#### ***Trichopterygia.***

**Ptenidium.** Erichson.

1. *P. apicale* Er. Im ganzen Gebiet häufig.
2. *P. formicetorum* Kraatz. Von Oberlieutenant **v. Heyden** im Frankfurter Wald, von mir bei Seligenstadt in den Colonieen der *Form. fuliginosa* in Mehrzahl gesammelt.
3. *P. fuscicorne* Er. Von Oblt. **v. Heyden** zwei Exemplare bei Frankfurt gefunden.
4. *P. laevigatum* Er. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Wisselsheim und Giefsen, von mir bei Ober-Lais einzeln in Nestern der *Form. fulig.* gefunden.
5. *P. pusillum* Gyll. Im ganzen Gebiet nicht selten.
6. *P. Gressneri* Gillm. Bei Ober-Lais in einer Colonie der *Form. fulig.* in Mehrzahl gesammelt.

**Ptilium.** Erichson.

1. *P. Kunzei* Heer. Von **Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais in faulenden Vegetabilien in großer Zahl gefunden.

2. *P. angustatum* Er. Von **Heyden** bei Frankfurt und Ems, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais gesammelt. Nicht selten.

3. *P. minutissimum* Wb. et M. Bei Frankfurt unter *Formica rufa* von Senator **v. Heyden** in Mehrzahl gefunden, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

4. *P. canaliculatum* Er. Bei Enkheim im Torfstich von **Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden.

5. *P. inquinum* Er. Einzeln bei Seligenstadt und Ober-Lais aufgefunden.

#### Ptinella. Matthews.

1. *P. aptera* Guer. Bei Frankfurt von Dr. **M. Schmidt** und Oblt. **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** und von mir bei Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt, unter Rinden.

2. *P. angustula* Gillm. Von Senator **v. Heyden** bei Heidelberg in Eichenmulm gefunden.

3. *P. testacea* Heer. Im Odenwald, bei Frankfurt und Cronthal im Taunus von Senator **v. Heyden**, von mir bei Seligenstadt einzeln und bei Ober-Lais einmal unter fauler Kiefernrinde in grosser Zahl, dabei auch die Varietät *limbata* Heer, gesammelt.

4. *P. ratisbonensis* Gillm. Ein Exemplar bei Ober-Lais gefunden.

#### Pteryx. Matthews.

1. *P. suturalis* Heer. Im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir gesammelt. Das Käferchen lebt unter Rinden.

#### Trichopteryx. Kirby.

1. *T. atomaria* De Geer. Im ganzen Gebiet häufig.

2. *T. grandicollis* Mannh. Wie die Vorige.

3. *T. fascicularis* Hbst. Bei Ober-Lais in Colonieen der *Form. fuliginosa* gefunden.

4. *T. thoracica* Gillm. Bei Frankfurt zwei Exemplare von Senator **v. Heyden**, bei Darmstadt von Dr. **Nebel** aufgefunden, von mir bei Seligenstadt einzeln.

5. *T. brevipennis* Er. Bei Seligenstadt und Ober-Lais (*Formica fuligin.*) gefunden.

6. *T. pumila* Er. Von Senator **v. Heyden** bei Frankfurt gesammelt.

7. *T. sericans* Heer. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais gefunden.

#### Scaphidilia.

#### Scaphidium. Olivier.

1. *S. quadrimaculatum* Oliv. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Babenhausen (im Untereichem) in

Mehrzahl gesammelt. Der Käfer lebt an Schwämmen und Schimmel, welche sich an faulenden, auf der Erde liegenden Aesten erzeugen.

### Scaphium. Kirby.

1. *S. immaculatum* Oliv. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt, Offenbach (in großer Anzahl) und Mainz von den Herren **v. Heyden** gefunden. Nur in Nadelwäldungen beobachtet.

### Scaphisoma. Leach.

1. *S. agaricinum* Oliv. Ueberall im Gebiet häufig an Baumschwämmen.

2. *S. boleti* Panz. Nach **v. Heyden** von Dr. **M. Schmidt** zu Frankfurt bei Bockenheim gefunden.

3. *S. assimile* Er. Von **v. Heyden I\*)** bei Frankfurt, von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt im Anspülicht des Maines gesammelt.

4. *S. limbatum* Er. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais aufgefunden. Sehr selten.

## Histeridae.

### Platysoma. Leach.

1. *P. frontale* Payk. Durchs ganze Gebiet, nicht häufig.

2. *P. depressum* Fabr. Wie das Vorige, häufiger.

3. *P. oblongum* Fabr. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg aufgefunden.

4. *P. angustatum* Ent. Hft. Bekannte Fundorte im Gebiete sind : Worms (**Klghfr.**), Frankfurt (**v. Heyden**), Seligenstadt (**Scriba**), Ortenberg (Dr. **Bose**). — Selten.

5. *P. filiforme* Er. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.

### Hister. Linné.

1. *H. quadrimaculatus* Lin. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *H. unicolor* Linn. Wie der Vorige.

3. *H. cadaverinus* Ent. Hft. Wie der Vorige, sehr häufig am Aase.

4. *H. terricola* Germ. Von Lehrer **Bach** zu Langsdorf im Odenwald bei Umstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg (unter faulendem Gemüse im ersten Frühjahr), von **Laubenheimer** bei Gießen und von mir bei Ober-Lais (am Aas) gesammelt.

5. *H. merdarius* Ent. Hft. Ueberall im Gebiete nicht selten.

6. *H. fimetarius* Hbst. Wie der Vorige, seltener.

---

\*) Mit **v. Heyden I** bezeichne ich Herrn Senator **v. Heyden**, mit **v. Heyden II** dessen Sohn, Herrn Oberleutenant **Lucas v. Heyden** in Frankfurt.

7. *H. neglectus* Germ. Wie der Vorige.
8. *H. carbonarius* Illig. Wie der Vorige.
9. *H. ventralis* Mars. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln aufgefunden.
10. *H. ruficornis* Grimm. In den Colonieen der *Formica fuliginosa* bei Seligenstadt, Aschaffenburg, Enkheim nicht selten vorkommend.
11. *H. purpurascens* Hbst. Im Süden des Gebiets weniger selten, als im Norden desselben.
12. *H. marginatus* Er. Von **Klghfr.** und Dr. **Nobel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg aufgefunden, von mir bei Ober-Lais ein Stück.
13. *H. stercorarius* Ent. Heft. Allenthalben im Gebiete nicht selten.
14. *H. sinuatus* Illig. Wie der Vorige, aber nicht häufig.
15. *H. quadrinotatus* Scrib. Ueberall häufig.
16. *H. funestus* Er. Von **v. Heyden** I einmal bei Bingen und einmal auf dem Niederwald im Rheingau aufgefunden.
17. *H. bissexstriatus* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir gesammelt. Selten. — Herr **v. Heyden** hat den Käfer einmal auf Erlen, die Larven von *Adimonia alni* fressend, beobachtet.
18. *H. bimaculatus* Lin. Bei Darmstadt nach **Klghfr.** und Dr. **Nebel** häufig; bei Frankfurt und Mainz von **v. Heyden** II, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt. Nach Dr. **Bose** kommt der Käfer auch bei Ortenberg nicht selten vor.
19. *H. duodecimstriatus* Schrnk. Im ganzen Gebiet nicht häufig. Von der Varietät *14-striatus* Gyll. wurde ein Exemplar von Dr. **Nebel** bei Darmstadt und eins von mir bei Haxenheim in Rheinhessen gefunden.
20. *H. corvinus* Grm. In Starkenburg an manchen Orten (Dietzenbach) nicht selten; in Oberhessen bei Wisselsheim von **v. Heyden** I aufgefunden.

### Paromalus. Erichson.

1. *P. parallelipedus* Hbst. Bei Darmstadt (**Klghfr.**), Odenwald (**Wider**), Frankfurt (**v. Heyden**) und Seligenstadt (**Scriba**) vorkommend. Selten.
2. *P. flavicornis* Hbst. Ueberall häufig in faulem Holz.

### Hetaerius. Erichson.

1. *H. sesquicornis* Preyssl. Durchs ganze Gebiet in den Gängen verschiedener Ameisenarten lebend.

### Dendrophilus. Leach.

1. *D. punctatus* Hbst. Ueberall bei *Formica fuliginosa*.
2. *D. pygmaeus* Lin. Ebensoweit verbreitet, wie der Vorige, aber nur in den Nestern der *Formica rufa*.

### Saprinus. Erichson.

1. *S. nitidulus* Payk. Ueberall häufig.
2. *S. immundus* Gyll. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** einzeln bei Darmstadt gefunden.
3. *S. speculifer* Latr. Im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt von **v. Heyden I** aufgefunden.
4. *S. aeneus* Fabr. Durchs ganze Gebiet nicht selten.
5. *S. virescens* Payk. Von **v. Heyden I** bei Frankfurt und Wiesbaden gesammelt.
6. *S. lautus* Er. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg (in faulem *Champignon*) gefunden.
7. *S. conjungens* Payk. Von **v. Heyden I** bei Frankfurt und Mainkur, von mir in Rheinhessen, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg einzeln gefunden.
8. *S. quadristriatus* Ent. Hfte. Bei Frankfurt von **v. Heyden I** aufgefunden.
9. *S. rugifrons* Payk. Bekannte Fundorte sind : Darmstadt, häufig (**Klghfr.**), Frankfurt, Griesheim a. M., Rumpenheim a. M. (**v. Heyden I**), Seligenstadt, einzeln (**Scriba**).

### Gnathoneus. Duval.

1. *G. piceus* Payk. Von **v. Heyden** einmal bei Zwingenberg in der Bergstrasse bei *Formica rufa*, von **Oechsner** einzeln bei Aschaffenburg gefunden.
2. *G. rotundatus* Illig. Durchs ganze Gebiet nicht selten.
3. *G. punctulatus* Chaud. In Oberhessen bei Ober-Lais in Mehrzahl gefunden und sicherlich weiter verbreitet und bisher mit dem vorhergehenden verwechselt, von dem er sich durch geringere Gröfse, flachere Gestalt und den Mangel eines Nahtstreifens unterscheidet.

### Teretrius. Erichson.

1. *T. picipes* Fabr. Einzelne Exemplare wurden gefunden : in Darmstadt (Dr. **Nebel**), Odenwald (**Wider**), Seligenstadt (**Scriba**), Frankfurt (**v. Heyden I**), Ortenberg (Dr. **Bose**).

### Plegaderus. Erichson.

1. *P. vulneratus* Panz. Ein Exemplar bei Ober-Lais gefunden.
2. *P. caesus* Illig. Im ganzen Gebiet, in morschem Holze zuweilen nicht selten.
3. *P. dissectus* Er. Wie der Vorige, aber seltener.

### Onthophilus. Leach.

1. *O. sulcatus* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** in Mehrzahl, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.
2. *O. striatus* Fabr. Durchs ganze Gebiet, nicht häufig.

### Bacanius. Le Conte.

1. *B. rhombophorus* Aubé. Von Dr. **M. Schmidt** bei Bockenheim in einem Gewächshaus bei *Formica flava* einmal in Mehrzahl gesammelt.

### Abraeus. Leach.

1. *A. globulus* Creutz. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von mir in Rheinhessen in trockenem Kuhmist häufig, von **v. Heyden I** einmal bei Frankfurt gefunden.

2. *A. globosus* Ent. Hft. Im ganzen Gebiete häufig in nafsfaulem Holze.

3. *A. granulum* Er. Zwei Exemplare bei Seligenstadt und mehrere bei Ober-Lais gefunden; von **v. Heyden** auch bei Frankfurt gesammelt.

4. *A. parvulus* Aub. Einmal von **v. Heyden I** bei Frankfurt aufgefunden.

### Acritus. Le Conte.

1. *A. punctum* Aubé. Zwei Exemplare von **v. Heyden I** bei Frankfurt.

2. *A. nigricornis* Ent. Hft. Im ganzen Gebiet, an manchen Orten nicht selten.

3. *A. minutus* Fabr. Bei Darmstadt von **Höpfner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt.

### *Phalacridae.*

#### Phalacrus. Paykull.

1. *P. corruscus* Payk. Im ganzen Gebiet häufig.

2. *P. Caricis* Sturm. Zweimal von **v. Heyden** bei Frankfurt, einmal von mir bei Seligenstadt gefunden.

#### Olibrus. Erichson.

1. *O. corticalis* Schh. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

2. *O. aeneus* Ill. Noch häufiger als der Vorige, besonders auf Kamillen.

3. *O. bicolor* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

4. *O. liquidus* Er. Bei Bingen und Soden von **v. Heyden I**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir gesammelt.

5. *O. affinis* Strm. Durchs ganze Gebiet, nicht häufig.

6. *O. Millefolii* Payk. Wie der Vorige, häufig.

7. *O. pygmaeus* St. Von **v. Heyden I** bei Griesheim a. M., von mir bei Seligenstadt auf *Cineraria* in großer Menge gesammelt. Auch von Dr. **Nebel** bei Darmstadt und von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.

8. *O. geminus* Illig. Im ganzen Gebiete häufig, besonders auf *Juniperus*-Arten.

9. *O. piceus* Er. Wie der Vorige, weniger häufig.

10. *O. oblongus* Er. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** am Großen Woog bei Darmstadt, von **v. Heyden** I bei Offenbach, von mir bei Seligenstadt gesammelt. Das Käferchen lebt am Schilf.

### *Nitidulariae.*

#### Cercus. Latreille.

1. *C. pedicularius* Linn. Im ganzen Gebiet sehr häufig.

2. *C. Sambuci* Er. Wie der Vorige; zuweilen auf *Sambucus racemosa* in großer Zahl.

3. *C. Spireae* Mrkl. = *rhenanus* Bach. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais einzeln gesammelt.

4. *C. rufilabris* Latr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einige Stücke gefunden.

#### Brachypterus. Kugelann.

1. *B. gravidus* Illig. Im ganzen Gebiete häufig.

2. *B. cinereus* Heer. Wie der Vorige, aber selten.

3. *B. pubescens* Er. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt und in Rheinhessen von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

4. *B. Urticae* Fabr. Im ganzen Gebiet auf Nesseln gemein.

5. *B. rubiginosus* Er. Nach **Klghfr.** bei Darmstadt vorkommend.

#### Carpophilus. Leach.

1. *C. hemipterus* Lin. v. *bipustulatus* Heer. Von **Wider** im Odenwald in Mehrzahl in Arzneiwaaren gefunden.

2. *C. sexpustulatus* Fbr. Bei Seligenstadt einige Stücke unter Rinden aufgefunden.

#### Epuraea. Erichson.

1. *E. decemguttata* Fabr. Am ausschwitzenden Eichensaft im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *E. aestiva* Lin. Sehr gemein auf Blüthen, besonders denen des Kohls. Auch *Var. bisignata* St. kommt einzeln vor.

3. *E. melina* Er. Im ganzen Gebiet auf Blüthen, zuweilen nicht selten.

4. *E. immunda* Er. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.

5. *E. variegata* Hbst. Einzeln bei Seligenstadt.

6. *E. castanea* Duft. Ein Exemplar bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.

7. *E. neglecta* Heer. Im ganzen Gebiet, einzeln an ausschwitzendem Eichensaft.

8. *E. obsoleta* Fabr. Ueberall häufig an Eichensaft.

9. *E. parvula* St. Nach Dr. **Nebel** bei Darmstadt, und nach Dr. **Bose** bei Ortenberg vorkommend.

10. *E. pygmaea* Gyll. Einige Stücke bei Seligenstadt gefunden.

11. *E. pusilla* Illig. Im ganzen Gebiete nicht selten.

12. *E. oblonga* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

13. *E. longula* Er. Im ganzen Gebiete, manchmal auf Blüten nicht selten.

14. *E. florea* Er. Wie die Vorige, am Saft und auf Blüten.

15. *E. limbata* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

### Nitidula. Fabricius.

1. *N. bipustulata* Fabr. Von **Wider** im Odenwald, von Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden.

2. *N. rufipes* Lin. = *obscura* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.

3. *N. quadripustulata* Fabr. Im ganzen Gebiet, im Süden weniger selten, als im Norden.

### Soronia. Erichson.

1. *S. punctatissima* Ill. Bei Darmstadt, Seligenstadt, Aschaffenburg am ausfließenden Eichensaft. Selten.

2. *S. grisea* Lin. Im ganzen Gebiete häufig.

### Amphotis. Erichson.

1. *A. marginata* Fabr. In den Colonieen der *Formica fuliginosa* nirgends selten.

### Omosita. Erichson.

1. *O. depressa* Linn. Bei Darmstadt und Ober-Lais vorkommend.

2. *O. colon* Lin. Im ganzen Gebiete nicht selten.

3. *O. discoidea* Fabr. Wie die Vorige, noch häufiger.

### Thalycra. Erichson.

1. *T. fervida* Gyll. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.

### Pria. Stephens.

1. *P. Dulcamarae* Ill. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** nicht selten, bei Seligenstadt von mir einzeln und bei Wingershausen im Vogelsberg einmal in Mehrzahl gesammelt.

### Meligethes. Kirby.

1. *M. rufipes* Gyll. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln aufgefunden.

2. *M. lumbaris* St. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais nicht selten von mir im Kötscher gefangen.

3. *M. hebes* Er. Im ganzen Gebiete nicht selten vorkommend.
4. *M. aeneus* Fabr. Aeufserst häufig im ganzen Gebiet.
5. *M. viridescens* Fabr. Wie der Vorige, aber nicht so gemein.
6. *M. coracinus* St. Bei Ober-Lais einzeln.
7. *M. pumilus* Er. Einmal bei Seligenstadt gefunden.
8. *M. subaeneus* St. Ebendasselbst einzeln gesammelt.
9. *M. subrugosus* Gyll. Durchs ganze Gebiet vorkommend; selten.
10. *M. Symphyti* Heer. Wie der Vorige, nicht selten.
11. *M. ochropus* St. Wie der Vorige.
12. *M. difficilis* Heer. Bei Ober-Lais einzeln gesammelt.
13. *M. memnonius* Er. Einige Stücke bei Ober-Lais.
14. *M. morosus* Er. Bei Seligenstadt einzeln gesammelt.
15. *M. brunnicornis* St. Von **Klghfr.** bei Darmstadt gefunden.
16. *M. viduatus* St. Im ganzen Gebiet nicht selten.
17. *M. pedicularius* Gyll. Von Dr. **Nobel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt und Dietzenbach einzeln gefunden.
18. *M. assimilis* St. In der Bergstrafse (Alsbach) und bei Ober-Lais einzeln gesammelt.
19. *M. serripes* Gyll. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir bei Seligenstadt aufgefunden.
20. *M. umbrosus* St. Durchs ganze Gebiet nicht sehr selten.
21. *M. maurus* St. Wie der Vorige.
22. *M. incanus* St. Ein Stück bei Seligenstadt.
23. *M. tristis* St. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** beobachtet.
24. *M. seniculus* Er. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.
25. *M. moestus* Er. Ein Stück bei Seligenstadt.
26. *M. fibularis* Er. Bei Seligenstadt und Ober-Lais gesammelt.
27. *M. ovatus* St. Einzeln bei Seligenstadt.
28. *M. flavipes* St. Bei Seligenstadt und Ober-Lais vorkommend.
29. *M. picipes* St. Bei Seligenstadt nicht selten.
30. *M. discoideus* Er. Ich besitze ein bei Hanau gefundenes Stück.
31. *M. lugubris* St. Im ganzen Gebiet, bei Ober-Lais nicht selten.
32. *M. obscurus* Er. Einzeln bei Seligenstadt.
33. *M. distinctus* St. Wie der Vorige.
34. *M. palmatus* Er. Ein Stück bei Ober-Lais.
35. *M. erythropus* Gyll. Im ganzen Gebiete nicht selten.
36. *M. exilis* St. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir einzeln beobachtet.

### Pocadius. Erichson.

1. *P. ferrugineus* Fabr. Im ganzen Gebiet häufig in Bovisten.

### Cychramus. Kugelann.

1. *C. fungicola* Heer. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir in Schwämmen in Mehrzahl gesammelt.
2. *C. luteus* Fabr. Durchs ganze Gebiet nicht selten auf Blüthen.

### Cybocephalus. Erichson.

1. *C. exiguus* Sahlb. Einmal bei Seligenstadt eine Anzahl unter Rinden eines Apfelbaums gefunden.

### Cryptarcha. Shuckard.

1. *C. strigata* Fabr. und
2. *C. imperialis* Fabr. Beide Arten kommen am ausfließenden Saft der Bäume nicht selten vor.

### Ips. Fabricius.

1. *I. quadriguttatus* Fabr. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.
2. *I. quadripunctatus* Hbst. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.
3. *I. quadripustulatus* Fbr. Wie der Vorige, häufiger.
4. *I. ferrugineus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

### Rhizophagus. Herbst.

1. *R. depressus* Fabr. Im Gebiet überall häufig.
2. *R. cribratus* Gyll. Bei Frankfurt von **v. Heyden I**, bei Hanau von Dr. **Hille**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ober-Lais von mir, aber überall nur einzeln aufgefunden.
3. *R. ferrugineus* Payk. Durchs ganze Gebiet verbreitet.
4. *R. perforatus* Er. Zwei Exemplare wurden von **v. Heyden I** bei Frankfurt gefunden.
5. *R. parallellocollis* Gyll. Im ganzen Gebiet, jedoch nicht häufig.
6. *R. nitidulus* Fabr. Bei Heidelberg von Graf **Jenison** gefunden.
7. *R. bipustulatus* Fabr. Ueberall im Gebiet häufig.
8. *R. politus* Hellw. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt. Nicht häufig. Von **v. Heyden I** unter Ulmen- und Pappelrinden.
9. *R. parvulus* Payk. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden I** bei Frankfurt unter Birken- und Eichenrinde gesammelt.

### Trogositidae.

#### Nemosoma. Latreille.

1. *N. elongatum* Linn. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden; von **v. Heyden** häufig aus altem Buchenholz gezogen.

Trogosita. Olivier.

1. *T. mauritanica* Linn. Im ganzen Gebiet nicht selten.

Peltis. Geoffroy.

1. *P. oblonga* Linn. Bei Frankfurt von **v. Heyden I** ein Exemplar an einem Pappelschwamme, bei Seligenstadt von mir zwei Stück unter Akazienrinde aufgefunden.

Thymalus. Latreille.

1. *T. limbatus* Fabr. Im ganzen Gebiet, aber nicht häufig.

**Colydiadae.**

Sarrotrium. Illiger.

1. *S. clavicorne* Linn. Im ganzen Gebiet verbreitet, nicht häufig.

Endophloeus. Erichson.

1. *E. spinulosus* Latr. **v. Heyden I** fing ein Stück bei Baden-Baden in einem trockenen Schwamme, und dürfte der Käfer auch im südlichen Odenwalde vorkommen.

Coxelus. Latreille.

1. *C. pictus* St. Nach Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg vorkommend.

Ditoma. Illiger.

1. *D. crenata* Hbst. Allenthalben unter Rinden abgestandener Bäume häufig.

Colobicus. Latreille.

1. *C. emarginatus* Latr. Im südlichen Theile des Gebietes sind als Fundorte bekannt: Darmstadt (Dr. **Nebel**), Zwingenberg und Frankfurt (**v. Heyden I**), Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**). Der Käfer lebt unter Rinden.

Synchita. Hellwig.

1. *S. Juglandis* Fabr. Je einzelne Stücke wurden von **v. Heyden I** bei Frankfurt (aus altem Waldholz gezogen), von Dr. **Bose** bei Ortenberg und von mir bei Ober-Lais (im Flug) gefunden.

Cicones. Curtis.

1. *C. variegatus* Hellw. Im ganzen Gebiet in *Sphaeria deusta* an alten Buchen, an manchen Orten nicht selten. Die weiße Larve geht nach den Beobachtungen von **v. Heyden I** in die Erde.

Colydium. Fabricius.

1. *C. elongatum* Fabr.  
2. *C. filiforme* Fabr. Beide Arten kommen im ganzen Gebiet, an manchen Orten nicht selten vor.

### Teredus. Shuckard.

1. *T. nitidus* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden I**, bei Cronthal im Taunus von **v. Heyden II** unter Rinde von zahmen Castanien, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Ober-Lais von mir unter Eichenrinde in Mehrzahl gesammelt.

### Oxylaemus. Erichson.

1. *O. cylindricus* Panz. Einzeln von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg und von mir bei Seligenstadt (an einer alten Eiche) gefunden.

2. *O. caesus* Er. Ich habe das Käferchen bei Seligenstadt in grosser Anzahl an einer alten Eiche, in welcher sich eine Colonie von *Formica fuliginosa* befand, gesammelt (cf. Stettiner Ent. Zeitg. v. 1857, S. 380).

### Aglenus. Erichson.

1. *A. brunneus* Gyll. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Seligenstadt von mir aufgefunden.

### Pycnomerus. Erichson.

1. *P. terebrans* Oliv. Im ganzen Gebiet, selten.

### Cerylon. Latreille.

1. *C. histeroideus* Fabr. Allenthalben in faulem Holze häufig.

2. *C. angustatum* Er. Von **v. Heyden I** einmal bei Frankfurt, von mir einzeln bei Seligenstadt gefunden.

3. *C. deplanatum* Gyll. Durchs ganze Gebiet verbreitet, an manchen Orten unter Buchenrinde nicht selten.

## Cucujidae.

### Brontes. Fabricius.

1. *B. planatus* Lin. Bei Darmstadt auf Zimmerplätzen von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden I** unter Eichenrinde einzeln gefunden.

### Laemophloeus. Erichson.

1. *L. denticulatus* Preyssl. Im ganzen Gebiet, nicht häufig; besonders unter Buchenrinde.

2. *L. bimaculatus* Payk. Von **Oechsner** bei Aschaffenburg gefunden.

3. *L. testaceus* Fabr. Im ganzen Gebiet vorkommend; im Süden an manchen Orten, z. B. Darmstadt, nicht selten.

4. *L. duplicatus* Walzl. Wie der Vorige, aber selten.

5. *L. ferrugineus* Steph. Bei Seligenstadt und Ortenberg einzeln gesammelt.

6. *L. ater* Oliv. Von **v. Heyden II** in Mehrzahl aus Waldholz bei Frankfurt, jedoch nur die *Var. rufus* Walzl.

7. *L. Clematidis* Er. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** nicht selten gefunden.

Lathropus. Erichson.

1. *L. sepicola* Müll. Ein Exemplar wurde auf dem Mühlberg bei Frankfurt von **v. Heyden** I an einer Gartenplanke aufgefunden.

Pediacus. Shuckard.

1. *P. depressus* Hbst. Drei Exemplare von **v. Heyden** bei Frankfurt an dürrer Eichenholz, eines von Dr. **Bose** bei Ortenberg und eines von mir bei Ober-Lais unter Eichenrinde gefunden.

2. *P. dermestoides* Fabr. Von Dr. **Doebner** zwei Stücke bei Aschaffenburg aufgefunden.

Silvanus. Latreille.

1. *S. frumentarius* Fabr. Im ganzen Gebiet verbreitet.

2. *S. bidentatus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** (unter Kiefernrinde), bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

3. *S. unidentatus* Fabr. Im ganzen Gebiet unter Rinden abgestandener Bäume nicht selten vorkommend.

4. *S. similis* Er. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt gesammelt.

5. *S. advena* Waltl. Ich fand den Käfer einmal in ziemlicher Anzahl zu Steinheim im amerikanischen Tabak, jedoch befand sich ein lebendes Stück nicht darunter.

6. *S. (Aerophilus) elongatus* Gyll. Einige Exemplare von Dr. **Nebel** bei Wixhausen gesiebt, drei Stücke von **v. Heyden** I bei Frankfurt unter Riedgräser gefunden.

7. *S. (Aerophilus) geminus* Kraatz. Einige Stücke bei Ober-Lais im Anspülicht.

Monotoma. Herbst.

1. *M. picipes* Payk. Im ganzen Gebiet nicht selten.

2. *M. scabra* Kunze. Bekannte Fundorte sind: Darmstadt (**Klghfr.**), Aschaffenburg (**Doebner**), Ortenberg (**Bose**), Gießen (**Laubenheimer**).

3. *M. conicicollis* Aubé. Im ganzen Gebiete in den Nestern der *Formica rufa*, manchmal sehr häufig.

4. *M. angusticollis* Gyll. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Frankfurt unter *Form. rufa* gesammelt.

5. *M. brevicollis* Aubé. Zwei Stücke bei Frankfurt von **v. Heyden** I.

6. *M. spinicollis* Aubé. Von **Laubenheimer** bei Gießen gefunden, von **v. Heyden** bei Frankfurt und Soden um Dughaufen fliegend.

7. *M. quadricollis* Aubé. Bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** I mit der Vorigen beobachtet.

8. *M. brevipennis* Kunze. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Ober-Lais von mir gefunden.

9. *M. flavipes* Kunze. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, in der Bergstrasse und bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

10. *M. longicollis* Gyll. Bei Jugenheim von **v. Heyden**, bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gefunden.

### ***Cryptophagidae.***

#### **Antherophagus. Latreille.**

1. *A. nigricornis* Fabr. Von **Oechsner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** bei Hofheim im Taunus (auf Himbeerblüthen), bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

2. *A. silaceus* Herbst. Bei Offenbach von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden.

3. *A. pallens* Oliv. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden, von mir bei Ober-Lais.

#### **Emphylus. Erichson.**

1. *E. glaber* Gyll. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt von **v. Heyden** II unter *Form. rufa* aufgefunden.

#### **Cryptophagus. Herbst.**

1. *C. Lycoperdi* Fabr. Im ganzen Gebiet, jedoch nicht häufig.

2. *C. Schmidtii* St. Bei Frankfurt, Seligenstadt, Ortenberg und Ober-Lais beobachtet.

3. *C. setulosus* St. Bei Seligenstadt habe ich das Käferchen nicht selten an schimmeligen Fässern, bei Ober-Lais nur einzeln gefunden. Auch von Dr. **Nebel** bei Darmstadt und von **v. Heyden** bei Frankfurt und Soden gesammelt.

4. *C. pilosus* Gyll. Im ganzen Gebiet nicht selten vorkommend.

5. *C. saginatus* St. Wie der Vorige. Bei Ober-Lais häufig in einer Colonie der *Formica fuliginosa*; **v. Heyden** II hat ihn auch bei *Formica rufa* gefunden.

6. *C. scanicus* Linn. Im ganzen Gebiet, die häufigste Art.

7. *C. badius* St. Zweimal bei Frankfurt von **v. Heyden** II, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

8. *C. subfumatus* Kraatz. Von **v. Heyden** zu Frankfurt in Mehrzahl aus dürrer Waldholz erzogen.

9. *C. quercinus* Kraatz. Bei Seligenstadt an alten Eichen von mir, bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** II gefunden.

10. *C. labilis* Er. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Wisselsheim und Enkheim, von mir bei Ober-Lais in Mehrzahl in einer morschen Buche gesammelt.

11. *C. affinis* St. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt und Cronthal von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir einzeln aufgefunden.

12. *C. cellaris* Scop. Wie der Vorige.

13. *C. acutangulus* Gyll. Im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir gefunden. Selten.

14. *C. fumatus* Gyll. Im ganzen Gebiet; aber im Süden viel häufiger, als im Norden.

15. *C. dentatus* Hbst. Ueberall im Gebiet nicht selten.

16. *C. distinguendus* St. Bei Seligenstadt einzeln vorkommend.

17. *C. bicolor* St. Einige Stücke habe ich bei Harxheim in Rheinhessen gefunden; von Dr. **Bose** auch bei Ortenberg beobachtet.

18. *C. dorsalis* Sahlb. Einmal im Odenwald von **Wider**, einmal bei Seligenstadt von mir gefunden.

19. *C. subdepressus* Gyll. Einige Mal bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.

20. *C. vini* Panz. Wenige Stücke bei Seligenstadt gefunden.

21. *C. pubescens* St. Im ganzen Gebiete, aber nicht häufig.

### Paramecosoma. Curtis.

1. *P. Abietis* Payk. Einmal von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.

2. *P. pilosulum* Er. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir in Mehrzahl bei Seligenstadt auf Leinkraut gefunden.

3. *P. melanocephalum* Hbst. Durchs ganze Gebiet verbreitet; nicht häufig.

### Atomaria. Stephens.

1. *A. fumata* Er. Bei Ober-Lais an trockenen Schwämmen.

2. *A. nana* Er. Im ganzen Gebiet häufig.

3. *A. umbrina* Gyll. Wie die Vorige, aber seltener.

4. *A. badia* Er. Bei Ober-Lais ein Exemplar.

5. *A. elongatula* Er. Bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** I aufgefunden.

6. *A. linearis* Steph. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

7. *A. mesomelas* Herbst. Bei Darmstadt (Dr. **Nebel**), Frankfurt (**v. Heyden**), Seligenstadt (**Scriba**) am Schilf nicht selten. Auch von **Klghfr.** im Rheingebiet gefunden.

8. *A. gutta* Steph. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt vorkommend.

9. *A. fuscipes* Gyll. Bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden** gesammelt.

10. *A. munda* Er. Bei Seligenstadt von mir in Häusern einzeln, von **v. Heyden** zu Frankfurt an Fässern im Keller gefunden.

11. *A. impressa* Er. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.

12. *A. nigripennis* Payk. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gesammelt.

13. *A. basalis* Er. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.

14. *A. cognata* Er. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt vorkommend.

15. *A. atra* Herbst. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.

16. *A. fuscata* Schh. Wie die Vorige. Unter faulenden Vegetabilien oft in großer Menge.

17. *A. salicicola* Kraatz. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.

18. *A. apicalis* Er. Im ganzen Gebiet verbreitet; nicht häufig.

19. *A. atricapilla* Steph. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **Wider** im Odenwalde, von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.

20. *A. gravidula* Er. Von **v. Heyden** bei Frankfurt und Nauheim aufgefunden.

21. *A. pusilla* Payk. Im ganzen Gebiet nicht selten.

22. *A. turgida* Er. Nach **v. Heyden** im Odenwald von **Wider** gefunden.

23. *A. analis* Er. Durchs ganze Gebiet häufig.

23. *A. ruficornis* Mrs. Wie der Vorige, aber nicht häufig.

### Ephistemus. Westwood.

1. *E. globosus* Waltl. Bei Babenhausen von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gefunden.

2. *E. gyρινoides* Marsh. und *Var. piceorrhoeus* Marsh. durchs ganze Gebiet, aber nicht häufig vorkommend.

3. *E. globulus* Payk. Bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einige Stücke aufgefunden.

### Lathridiadae.

#### Anommatus. Wesmähl.

1. *A. duodecimstriatus* Müll. Von Pfarrer **Wahl** zu Hirzenhain einmal unter einem Blumentopfe gefunden und beobachtet, wie das Käferchen kleine Würmchen angriff, welche sich daselbst befanden.

#### Lathridius. Illiger.

1. *L. lardarius* De Gar. Im ganzen Gebiet, aber nicht häufig.

2. *L. angulatus* Mann. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir nicht selten im Mulme hohler Bäume gefunden, wo Nester der *Form. fuliginosa* sich befanden.

3. *L. alternans* Mannh. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **Wider** im Odenwalde, von **v. Heyden** bei Frankfurt und Soden, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.

4. *L. rugicollis* Oliv. Bei Frankfurt und Königstein von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir einzeln gefunden; von Dr. **Bose** einmal in Mehrzahl bei Ortenberg gesammelt.

5. *L. carinatus* Gyll. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais einzeln gesammelt.

6. *L. incisus* Mannh. Im Taunus von **v. Heyden** in Schwämmen, von mir bei Ober-Lais in einer Colonie der *Form. fuliginosa* in Mehrzahl gefunden.

7. *L. constrictus* Gyll. In Seligenstadt an schimmeligen Fässern nicht selten; auch von Dr. **Bose** bei Ortenberg beobachtet.

8. *L. elongatus* Curt. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden. Von **v. Heyden** wurde das Käferchen in Mehrzahl aus Fichtenzapfen erzogen.

9. *L. clathratus* Mannh. In Frankfurt von **v. Heyden**, in Seligenstadt von mir an alten Fässern nicht selten gesammelt.

10. *L. liliputanus* Mannh. Im Odenwald von **Wider**, im Taunus von **v. Heyden** gefunden. Ich fand ihn einmal bei Seligenstadt in einem morschen Apfelstamm in grosser Anzahl.

11. *L. exilis* Mannh. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.

12. *L. collaris* Mannh. Ein Exemplar wurde von **Laubenheimer** bei Gießen gefunden und mir zur Bestimmung mitgetheilt.

13. *L. hirtus* Gyll. Im ganzen Gebiete, aber selten.

14. *L. rugosus* Herbst. Wie der Vorige, weniger selten.

15. *L. rugipennis* Mannh. Ein Exemplar habe ich bei Ober-Lais gefunden.

16. *L. planatus* Mannh. Bei Frankfurt von **v. Heyden** sehr einzeln gesammelt.

17. *L. transversus* Oliv. Im ganzen Gebiet nicht selten.

18. *L. minutus* Linn. Ueberall im Gebiete sehr gemein.

19. *L. anthracinus* Mannh. Nach Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg vorkommend.

20. *L. scitus* Mannh. Ein Stück bei Ober-Lais gefunden.

21. *L. consimilis* Mannh. Nach Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg.

22. *L. parallellocollis* Mannh. Ein Exemplar bei Ober-Lais.

23. *L. brevicornis* Mannh. Bei Seligenstadt sehr einzeln.

24. *L. carbonarius* Mannh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt in Mehrzahl an Eichenklafterholz, von mir bei Ober-Lais in einer faulen Buche gefunden.

25. *L. filiformis* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gesammelt. Herr **v. Heyden** zu Frankfurt hat das Käferchen aus Epheu Zweigen erzogen. Auch im Odenwald wurde es von **Wider** gefunden.

### Corticaria. Marsham.

1. *C. pubescens* Ill. Im ganzen Gebiet nicht selten.

2. *C. piligera* Mannh. Bei Frankfurt von **v. Heyden** auf Epheu gefunden.

3. *C. crenulata* Gyll. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg einzeln gesammelt.

4. *C. denticulata* Gyll. Nach Dr. **Bose** bei Ortenberg vorkommend; von mir auch bei Ober-Lais ein Stück aufgefunden.

5. *C. impressa* Oliv.. Von **v. Heyden** bei Frankfurt einzeln gefunden, von mir bei Seligenstadt.
6. *C. badia* Mannh. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln; von **v. Heyden** aus alten Fichtenzapfen erzogen.
7. *C. bella* Redt. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln unter Baummoos gefunden.
8. *C. serrata* Payk. Im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais gesammelt; überall einzeln.
9. *C. laticollis* Mannh. Ein Stück bei Seligenstadt gefunden.
10. *C. longicornis* Hbst. Einige Exemplare bei Ober-Lais.
11. *C. cylindrica* Mannh. Von **v. Heyden** bei Offenbach, Frankfurt, und Soden, von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir nicht selten bei Ober-Lais durch Kötschern gefunden.
12. *C. foveola* Beck. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir einzeln bei Ober-Lais gesammelt.
13. *C. fulva* Comolli. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt gefunden.
14. *C. longicollis* Zettst. Einmal von **v. Heyden** I aus Fichtenzapfen erzogen.
15. *C. elongata* Gyll. Im ganzen Gebiete nicht selten.
16. *C. ferruginea* Mrsh. Bei Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais in Mehrzahl im Mulme einer Colonie der *Form. fuliginosa* gesammelt.
17. *C. gibbosa* Hrbst. Allenthalben im Gebiete häufig.
18. *C. transversalis* Gyll. Wie die Vorige, viel weniger häufig.
19. *C. brevicollis* Mannh. Ein Stück bei Seligenstadt.
20. *C. crocata* Mannh. Von **v. Heyden** bei Griesheim a. M. und bei Giefßen (Schmidter Hof) aufgefunden.
21. *C. parvula* Mannh. Bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** einzeln gesammelt.
22. *C. trifoveolata* Redt. Im ganzen Gebiet, nicht häufig. Der Käfer möchte nur eine Varietät der folgenden Art sein, mit welcher sie sich zusammen findet.
23. *C. fuscula* Humm. Wie die Vorige, aber häufig.
24. *C. similata* Gyll. Bei Frankfurt und Salzhausen von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.
25. *C. truncatella* Mannh. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt einzeln gefunden.
26. *C. distinguenda* Comolli. Im ganzen Gebiet, bei Ober-Lais nicht selten unter Baummoos.

### Dasycerus. Brogniart.

1. *D. sulcatus* Broga. Als Fundorte sind mir bekannt : Aschaffenburg (**Oechsner**), Seligenstadt (**Scriba**), Frankfurt und Ems (**v. Heyden** I), Ortenberg (**Bose**).

### ***Mycetophagidae.***

#### **Mycetophagus. Hellwig.**

1. *M. quadripustulatus* Lin. Im ganzen Gebiete nicht selten.
2. *M. piceus* Fabr. Wie der Vorige, häufig.
3. *M. decempunctatus* Fabr. Wie der Vorige, sehr selten.
4. *M. atomarius* Fabr. Wie der Vorige, an manchen Orten nicht selten.
5. *M. multipunctatus* Hellw. Wie der Vorige.
6. *M. fulvicollis* Fabr. Von **v. Heyden** II und Dr. **M. Schmidt** im Frankfurter Wald an Buchen, von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Babenhausen und Ober-Lais gefunden. Selten.
7. *M. Populi* Fabr. Von **v. Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt und im Vogelsberg einzeln gesammelt.
8. *M. quadriguttatus* Mull. Einmal von **v. Heyden** I bei Frankfurt an einem alten Eichenschwamm gefunden.

#### **Triphyllus. Latreille.**

1. *T. punctatus* Fabr. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten (z. B. Taunus, Ober-Lais) nicht selten in Baumschwämmen.

#### **Litargus. Erichson.**

1. *L. bifasciatus* Fabr. Ueberall häufig unter Buchenrinde.

#### **Typhaea. Kirby.**

1. *T. fumata* Linn. Allenthalben gemein.

### ***Dermestidae.***

#### **Dermestes. Linné.**

1. *D. vulpinus* Fabr. Von **v. Heyden** I einmal bei Frankfurt aufgefunden.
2. *D. Frischii* Kugel. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** zwei Exemplare bei Frankfurt gefunden.
3. *D. murinus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig an Aas.
4. *D. undulatus* Brahm. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und Dietzenbach von mir, überall nur sehr einzeln gesammelt.
5. *D. mustelinus* Er. Nach **Klghfr.** ist der Käfer in Rheinbaiern in Taubenschlägen gefunden worden.
6. *D. laniarius* Ill. Im ganzen Gebiete nicht selten. Der Käfer findet sich nicht blos am Aas, sondern auch häufig auf Wegen.
7. *D. lardarius* Linn. Allenthalben sehr häufig.
8. *D. bicolor* Fabr. Von Dr. **Bose** einmal in Mehrzahl in seinem Hause gefunden.

### Attagenus. Latreille.

1. *A. peltio* Linn. Ueberall gemein.
2. *A. Schaefferi* Herbst. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
3. *A. megatona* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** und Revisor **Jaennicke** gesammelt.
4. *A. vigintiguttatus* Fabr. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Hanau von Dr. **Hille**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I und bei Schwanheim von **v. Heyden** II gefunden.

### Megatoma. Herbst.

1. *M. undata* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

### Hadrotoma. Erichson.

1. *H. marginata* Payk. Von **v. Heyden** I ein Exemplar bei Frankfurt, von Dr. **Nebel** bei Darmstadt und von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.
2. *H. nigripes* Fabr. Im ganzen Gebiete verbreitet und zuweilen in den Blüthen des Weissdorns (von Dr. **Doebner** und **v. Heyden** I) in grosser Zahl vorkommend.

### Trogoderma. Latreille.

1. *T. elongatulum* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
2. *T. nigrum* Hbst. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Frankfurt und Bürgel aufgefunden.

### Tiresias. Stephens.

1. *T. serra* Fabr. Im ganzen Gebiete, jedoch selten.

### Anthrenus. Geoffroy.

1. *A. Scrophulariae* Linn. Im ganzen Gebiete gemein.
2. *A. Pimpinellae* Fabr. Wie der Vorige, weniger gemein.
3. *A. varius* Fabr. Wie der Vorige, aber im Norden des Gebiets weniger häufig.
4. *A. museorum* Linn. Allenthalben gemein.
5. *A. claviger* Er. Wie der Vorige, jedoch weniger häufig.

### Trinodes. Latreille.

1. *T. hirtus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

### Orphilus. Erichson.

1. *O. glabratus* Fabr. Herr **v. Heyden** I fand zwei Exemplare bei Frankfurt.

### ***Byrrhidae.***

#### Nosodendron. Latreille.

1. *N. fasciculare* Oliv. Im ganzen Gebiete, am ausschwitzenden Saft der Bäume zuweilen in Mehrzahl.

#### Syncalypta. Dillwyn.

1. *S. setigera* Illig. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gefunden; Herr **v. Heyden** hat das Käferchen aus dem Mulme einer Colonie von *Formica fuliginosa* gesiebt.

2. *S. spinosa* Rossi. Bei Seligenstadt am Mainufer von mir, bei Frankfurt am Ufer des Mains und bei Ems am Ufer der Lahn von **v. Heyden** I, bei Darmstadt von Dr. **Nobel** aufgefunden.

#### Byrrhus. Linn.

1. *B. ornatus* Panz. Bei Dietzenbach einzeln, in der Bergstrasse häufig an bemoosten Felsen vorkommend. Von Dr. **Doebner** auch bei Aschaffenburg und von **v. Heyden** I bei Schlangenbad, Frankfurt und Reichelsheim im Odenwalde beobachtet.

2. *B. luniger* Germ. Auf dem Feldberg von **v. Heyden** I einmal, von mir bei Ober-Lais mehrfach aufgefunden. Nach **Jaenicke** auch in Gießen vorkommend.

3. *B. pilula* Linn. Ueberall gemein.

4. *B. fasciatus* Fabr. Bei Seligenstadt nicht selten, bei Darmstadt von **Höpfner**, bei Frankfurt von **v. Twardowski** gefunden.

5. *B. dorsalis* Fabr. Ueberall im Gebiete nicht selten.

6. *B. murinus* Illig. Einige Stücke habe ich bei Harxheim in Rheinhessen gesammelt.

#### Cytilus. Erichson.

1. *C. varius* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.

#### Morychus. Erichson.

1. *M. nitens* Panz. Ueberall nicht selten.

#### Simplocaria. Marsham.

1. *S. metallica* Sturm. Von **v. Heyden** I bei Soden am Salzbrunnen gefunden.

2. *S. semistriata* Illig. Bei Seligenstadt, Harxheim in Rheinhessen und bei Ober-Lais einzeln gesammelt.

#### Limnichus. Latreille.

1. *L. versicolor* Waltl. Bei Seligenstadt einmal in Mehrzahl im ersten Frühjahr am Rande eines Grabens gesammelt.

2. *L. pygmaeus* Sturm. Einzeln bei Seligenstadt gefunden.
3. *L. sericeus* Dfischm. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Frankfurt und bei Ems am Lahnufer gesammelt.

### ***Georyssidae.***

#### Georyssus. Latreille.

1. *G. pygmaeus* Fabr. Durchs ganze Gebiet verbreitet, aber im Süden weniger selten, als im Norden desselben.

### ***Parnidae.***

#### Parnus. Fabricius.

1. *P. prolifericornis* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
2. *P. griseus* Er. Bei Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais in Mehrzahl im Sommer unter Steinen ausgetrockneter Bäche gesammelt. Auch von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.
3. *P. luridus* Er. Von **v. Heyden** bei Rumpenheim, Cronthal und Soden, von mir bei Ober-Lais einzeln aufgefunden.
4. *P. viennensis* Heer. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.
5. *P. auriculatus* Illig. Im ganzen Gebiet nicht selten.
6. *P. nitidulus* Heer. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** aufgefunden.

#### Limnius. Müller.

1. *L. tuberculatus* Müll. Im ganzen Gebiete, jedoch selten.

#### Elmis. Latreille.

1. *E. aeneus* Müll. Durchs ganze Gebiet häufig.
2. *E. Maugetii* Latr. Im Mühlthal bei Darmstadt von **Klgfr.** und Dr. **Nebel**, im Taunus von **v. Heyden** gesammelt.
3. *E. obscurus* Müll. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Ems von **v. Heyden** I aufgefunden.
4. *E. Volkmari* Panz. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden, von mir bei Grebenhain im Vogelsberg.
5. *E. Mülleri* Er. Bei Seligenstadt einmal in sehr großer Anzahl am Mainufer gesammelt, als auf der gegenüberliegenden Seite ein Steindamm aufgeführt wurde.
6. *E. parallelipedus* Müll. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt von **v. Heyden** einmal im Taunus (hohe Mark), von Dr. **Bose** bei Ortenberg einzeln gesammelt.
7. *E. angustatus* Müll. Von **Klgfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Königstein und Falkenstein im Taunus gefunden.
8. *E. pygmaeus* Müll. Einige Stücke bei Seligenstadt am Mainufer aufgefunden.

9. *E. cupreus* Müll. Im Mühlthal bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** in Mehrzahl, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

10. *E. nitens* Er. Wenige Exemplare bei Seligenstadt am Mainufer aufgefunden.

### Macronychus. Müller.

1. *M. quadrituberculatus* Müll. In der Sammlung des Herrn **v. Heyden** befindet sich ein von **Lindheimer** bei Frankfurt gefundenes Exemplar.

### *Heteroceridae.*

1. *H. marginatus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *H. hispidulus* Ksw. Bei Wimpfen von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Oberliederbach am Fusse des Taunus von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gefunden.

3. *H. laevigatus* Panz. Durchs ganze Gebiet nicht selten vorkommend.

4. *H. fuscus* Kiesw. Wie der Vorige, aber seltener.

5. *H. sericans* Kiesw. Bei Darmstadt von **Klghfr.** aufgefunden.

### *Lucanidae.*

#### Lucanus. Linné.

1. *L. cervus* Linn. Im ganzen Gebiete, wo sich noch alte Eichen vorfinden, nicht selten. Die *Var. hircus* Herbst kommt nur einzeln vor. Bei Seligenstadt habe ich auch ein Exemplar gefunden, bei welchem die fünf letzten Fühlerglieder deutlich erweitert sind (*Var. pentaphyllus* Reiche).

#### Dorcus. Mac Leay.

1. *D. parallelopedus* Linn. Allenthalben im Gebiete, besonders in faulem Buchenholz, häufig.

#### Platycerus. Geoffroy.

1. *P. caraboides* Linn. Ueberall nicht selten; die ♀ Varietät *rufipes* Hbst. kommt nur einzeln vor.

#### Aesalus. Fabricius.

1. *A. scarabaeoides* Panz. Bei Babenhausen in einem faulen, in der Erde steckenden Eichenstumpfe einmal in Mehrzahl nebst Larve gefunden. Von **Heynemann** auch bei Hanau gesammelt.

#### Sinodendron. Fabricius.

1. *S. cylindricum* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet, an manchen Orten, namentlich in bergigen Gegenden, nicht selten. Im Odenwalde habe ich ihn in alten Aepfel- und Birnbäumen, im Vogelsberge in Buchen,

Herr **v. Heyden** hat ihn im Taunus in alten zahmen Kastanienbäumen beobachtet.

### *Scarabaeidae.*

#### Gymnopleurus. Illiger.

1. *G. cantharus* Er. Bei Hanau von Dr. **Hille** in Mehrzahl gesammelt; auch bei Heidelberg vom Grafen **Jenison** aufgefunden.

#### Copris. Geoffroy.

1. *C. lunaris* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

#### Onthophagus. Latreille.

1. *O. Häbneri* Fabr. Nach **v. Heyden** im Odenwald von **Wider** aufgefunden.

2. *O. taurus* Linn. Im ganzen Gebiete, doch im Süden desselben häufiger, als im Norden.

3. *O. nutans* Fabr. Ueberall im Gebiete häufig.

4. *O. vacca* Linn. Im Süden des Gebietes an manchen Orten, z. B. bei Seligenstadt nicht selten. Im Vogelsberg habe ich ihn noch nicht gefunden.

5. *O. coenobita* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig.

6. *O. fracticornis* Preyssl. Wie der Vorige.

7. *O. nuchicornis* Linn. Wie der Vorige, noch häufiger.

8. *O. lemur* Fabr. Im Odenwald von **Wider**, bei Frankfurt von **v. Heyden** II, im Taunus von Dr. **Haag** gesammelt. Bei Ortenberg und Ober-Lais ist der Käfer nicht selten.

9. *O. ovatus* Linn. Ueberall gemein.

10. *O. Schreberi* Linn. Im Süden des Gebiets (Frankfurt, Seligenstadt, Mainz u. s. w.) manchmal nicht selten vorkommend; in Oberhessen ist mir ein Fundort des Käfers nicht bekannt.

#### Oniticellus. Lepelletier.

1. *O. flavipes* Fabr. Bei Dietzenbach von mir in Mehrzahl, bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.

#### Aphodius. Illiger.

1. *A. erraticus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

2. *A. subterraneus* Linn. Wie der Vorige.

3. *A. fossor* Linn. Sehr häufig durchs ganze Gebiet. Die Varietät *sylvaticus* Ahr. findet sich bei Ober-Lais fast ebenso häufig, als die Stammform.

4. *A. haemorrhoidalis* Linn. Bei Babenhausen und Seligenstadt einzeln gesammelt.

5. *A. scybalarius* Fabr. Bei Seligenstadt in Mehrzahl von mir, bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** gefunden.

6. *A. foetens* Fabr. Im Süden des Gebietes weit verbreitet, im Norden desselben habe ich den Käfer noch nicht gefunden.
7. *A. fimetarius* Linn. Ueberall sehr gemein.
8. *A. ater* De Geer. Im ganzen Gebiete vorkommend; bei Ober-Lais im Schaafnist nicht selten.
9. *A. granarius* Linn. Durchs ganze Gebiet häufig.
10. *A. foetidus* Fabr. Im Odenwald von **Wider** aufgefunden.
11. *A. sordidus* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
12. *A. rufescens* Fabr. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** I gefunden.
13. *A. nitidulus* Fabr. Ueberall im Gebiete nicht selten.
14. *A. immundus* Creutz. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** I einzeln gesammelt.
15. *A. bimaculatus* Fabr. Im ganzen Gebiete, im Süden häufiger, als im Norden.
16. *A. niger* Panz. Einige Stücke bei Seligenstadt.
17. *A. plagiatus* Linn. Durchs ganze Gebiet verbreitet. Bei Ober-Lais sehr häufig im Schlamme und im Anspüllicht.
18. *A. lividus* Oliv. Einige Stücke bei Seligenstadt aufgefunden.
19. *A. inquinatus* Fabr. Ueberall sehr häufig.
20. *A. melanostictus* Schm. Bei Dietzenbach einzeln, bei Harxheim in Rheinhessen in großer Anzahl von mir, bei Frankfurt, Offenbach und Rumpenheim von **v. Heyden** gesammelt.
21. *A. sticticus* Panz. Im ganzen Gebiete nicht selten.
22. *A. pictus* Sturm. Von **v. Heyden** I bei Frankfurt (im April auf Aeckern fliegend), von mir einzeln bei Ober-Lais gefunden.
23. *A. tessulatus* Payk. Allenthalben im Gebiete häufig.
24. *A. maculatus* Sturm. Ich habe bei Seligenstadt und Ober-Lais einzelne Stücke gefunden, Herr **v. Heyden** I bei Ems ein Exemplar.
25. *A. porcus* Fabr. Einige Stücke bei Seligenstadt.
26. *A. scrofa* Fabr. Bei Lorsch von **v. Heyden** I, bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt und in Rheinhessen von mir gesammelt.
27. *A. tristis* Panz. Bei Frankfurt und Offenbach von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.
28. *A. pusillus* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig.
29. *A. quadriguttatus* Hbst. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Hanau von Dr. **Hille**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Offenbach von **v. Heyden** II gesammelt.
30. *A. quadrimaculatus* Linn. Bekannte Fundorte im Gebiete sind Darmstadt (Dr. **Nebel**), Frankfurt (**v. Heyden** I), Hanau (**Heynemann**), Friedberg (**Fuhr**), Ortenberg (Dr. **Bose**).
31. *A. merdarius* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.
32. *A. prodromus* Brahm. Ueberall gemein.
33. *A. punctatosulcatus* Sturm. Wie der Vorige, doch weniger gemein.
34. *A. consputus* Creutz. Bei Seligenstadt einzeln von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.

35. *A. contaminatus* Hbst. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten nicht selten.

36. *A. obliteratus* Panz. Bei Darmstadt, im Odenwald, bei Frankfurt und Aschaffenburg vorkommend. Da der Käfer nach **Riehl** auch bei Cassel vorkommt, so dürfte er in Oberhessen nicht fehlen.

37. *A. rufipes* Linn. Ueberall im Gebiete nicht selten.

38. *A. luridus* Payk. Allenthalben häufig.

39. *A. depressus* Kugel. Einige Stücke bei Ober-Lais.

40. *A. atramentarius* Er. Bei Seligenstadt einzeln, bei Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt.

41. *A. pecari* Fabr. Bei Dietzenbach einmal in Mehrzahl von mir, bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden I** gefunden.

42. *A. arenarius* Oliv. Bei Darmstadt von Advokat **Heyer**, bei Frankfurt und Wiesbaden von **v. Heyden** gesammelt.

43. *A. sus* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von **v. Heyden II** einmal in großer Anzahl auf der Mombacher Haide bei Mainz gefunden.

44. *A. testudinarius* Fabr. Im südlichen Theile des Gebietes nicht selten; auch bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

45. *A. porcatus* Fabr. Im ganzen Gebiete gemein.

### Rhyssemus. Mulsant.

1. *R. germanus* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet, an manchen Orten (Rhein Hessen, Seligenstadt, Ortenberg) nicht selten.

### Psammmodius. Gyllenhal.

1. *P. caesus* Panz. Im Süden des Gebietes, besonders in Rhein Hessen nicht selten.

2. *P. vulneratus* Strm. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt aufgefunden.

3. *P. sulcicollis* Ill. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Mainz von **v. Heyden II** einzeln gesammelt.

### Ochodaeus. Lepelletier.

1. *O. chrysomelinus* Fabr. Von **v. Heyden I** bei Frankfurt und Offenbach in der Dämmerung fliegend gefunden, von **Oechsner** bei Aschaffenburg.

### Odontaeus. Klug.

1. *O. mobilicornis* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden I**, in Rhein Hessen (Odernheim) von mir, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** und bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

### Geotrupes. Latreille.

1. *G. Typhoeus* Linn. Bei Darmstadt, Seligenstadt, Aschaffenburg, Frankfurt und Hanau nicht selten; in Oberhessen kommt der Käfer auch bei Büdingen vor.

2. *G. stercorarius* Linn. Im ganzen Gebiete sehr gemein.
3. *G. putridarius* Er. Wie der Vorige, weniger gemein.
4. *G. mutator* Marsh. Wie der Vorige, sehr häufig.
5. *G. sylvaticus* Panz. Allenthalben sehr häufig in Waldungen, besonders an Pilzen.
6. *G. vernalis* Linn. Im ganzen Gebiete, doch im Norden desselben weniger häufig, als im Süden.

### Trox. Fabricius.

1. *T. perlatus* Scriba. In der Umgegend von Darmstadt und in der Bergstrasse, sowie in Rheinhessen bei Mainz und Harxheim nicht selten. Auch im Taunus von **v. Heyden** gefunden.
2. *T. hispidus* Laichart. Bei Darmstadt, Seligenstadt, Frankfurt einzeln.
3. *T. sabulosus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
4. *T. scaber* Linn. Wie der Vorige, jedoch im Norden desselben nicht häufig.
5. *T. concinnus* Er. Ich besitze ein von **Heynemann** bei Hanau gefundenes Exemplar.

### Hoplia. Illiger.

1. *H. philanthus* Sulz. Durchs ganze Gebiet häufig.
2. *H. praticola* Duftschm. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt früher von **v. Heyden** I einzeln gesammelt.
3. *H. farinosa* Linn. Dr. **Nebel** hat den Käfer in vielen Exemplaren aus Neckar-Steinach erhalten. Bei Frankfurt wurde er früher auch von **v. Heyden** I und bei Friedberg von **Renner** gefunden.

### Homaloplia. Stephens.

1. *H. ruricola* Fabr. Von mir bei Seligenstadt, von **v. Heyden** I bei Frankfurt, Offenbach und Griesheim a. M. gesammelt.

### Serica. Mac-Leay.

1. *S. holosericea* Scop. Im ganzen Gebiete nicht selten, besonders in Sandgegenden vorkommend.
2. *S. brunnea* Linn. Wie die Vorige, aber weniger häufig.

### Melolontha. Fabricius.

1. *M. vulgaris* Fabr. Ueberall sehr häufig.
2. *M. albida* Frio. Muls. Von **Klghfr.** und **Reifsig** bei Darmstadt gefunden.
3. *M. aceris* Er. Vom verstorbenen **Höpfner** bei Darmstadt im Juli aufgefunden.
4. *M. Hippocastani* Fabr. Im ganzen Gebiete, in manchen Gegenden und an manchen Orten sehr häufig.

### Polyphylla. Harris.

1. *P. fullo* Linn. Bei Darmstadt nicht selten; ausserdem im Süden des Gebietes überall in Sandgegenden einzeln. Sein Vorkommen in Oberhessen ist mir nicht bekannt.

### Anoxia. Laporte.

1. *A. villosa* Fabr. Bei Darmstadt, Lorsch, Babenhausen, Hanau, überhaupt in allen Sandgegenden der Provinz Starkenburg häufig.

### Rhizotrogus. Latreille.

1. *R. solstitialis* Linn. Im ganzen Gebiete gemein.

2. *R. ochraceus* Knoch. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von Dr. **M. Schmidt** einzeln gesammelt.

3. *R. ruficornis* Fabr. Einmal bei Seligenstadt in grosser Anzahl um Pfungsten in früher Morgenstunde fliegend beobachtet. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden II**, bei Friedberg von Dr. **Renner** gefunden.

4. *R. assimilis* Herbst. Ein Stück habe ich in der Tann bei Darmstadt gefunden.

5. *R. aequinotialis* Schh. Bei Seligenstadt einzeln.

6. *R. aestivus* Oliv. Im ganzen Gebiete nicht selten.

7. *R. marginipes* Muls. Bei Umstadt von Lehrer **Bach**, bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Frankfurt und Cronthal von **v. Heyden II** einzeln gesammelt.

### Anisoplia. Laporte.

1. *A. fruticola* Fabr. Von Dr. **M. Schmidt** in einigen Exemplaren bei Frankfurt gefunden.

2. *A. agricola* Fabr. Im Süden des Gebietes, besonders in Sandgegenden, nicht selten.

### Phyllopertha. Kirby.

1. *P. horticola* Linn. Ueberall sehr häufig.

### Anomala. Koeppé.

1. *A. oblonga* Fabr. Bei Pfungstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden.

2. *A. Frischii* Fabr. Im ganzen Gebiet, jedoch im Süden häufiger.

### Oryctes. Illiger.

1. *O. nasicornis* Linn. Ein Exemplar wurde von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden. Auch in Alsfeld soll der Käfer sich finden. Bei der Saline Allendorf in Kurhessen gefundene Exemplare befinden sich in der Sammlung des Herrn **v. Heyden**. Nach **Jaennicke** kam der Käfer auch in Büdingen in Gewächshäusern des Hofgartens vor.

### Oxythyrea. Mulsant.

1. *O. stictica* Linn. Im Süden des Gebietes weniger selten, als im Norden. Im Vogelsberg habe ich den Käfer noch nicht gefunden.

### Cetonia. Fabricius.

1. *C. hirtella* Linn. Durchs ganze Gebiet verbreitet, jedoch im Süden desselben häufiger.

2. *C. speciosissima* Scop. Im ganzen Gebiete, aber selten.

3. *C. affinis* Andersh. Im Frankfurter Wald einzeln von v. Heyden I gefunden.

4. *C. marmorata* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

5. *C. floricola* Herbst. Wie die Vorige; die Varietät *obscura* Andersch. wurde bei Frankfurt gefunden.

6. *C. aurata* Linn. Allenthalben häufig.

### Osmoderma. Lepell. et Serv.

1. *O. eremita* Linn. Im ganzen Gebiet, an manchen Orten, z. B. am Altrhein an alten Weidenbäumen, häufig.

### Gnorimus. Lepell. et Serv.

1. *G. variabilis* Linn. Durchs ganze Gebiet verbreitet, jedoch überall selten.

2. *G. nobilis* Linn. Wie der Vorige, aber nicht selten.

### Trichius. Fabricius.

1. *T. fasciatus* Linn. von Klghfr. bei Darmstadt, von mir bei Babenhausen, von v. Heyden bei Frankfurt gesammelt.

2. *T. abdominalis* Ménétr. Im Süden des Gebietes nicht selten; auch bei Ortenberg und Nidda von Dr. Bose und mir gefunden.

### Valgus. Scriba.

1. *V. hemipterus* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

## Buprestidae.

### Acmaeodera. Eschscholtz.

1. *A. taeniata* Fabr. Von Dr. Zitz bei Mainz gefundene Stücke befinden sich in der Sammlung des Herrn v. Heyden.

2. *A. octodecimguttata* Pill. et Métt. Bei Zwingenberg in der Bergstrasse wurde von Pfarrer Scriba zu Alsbach ein Exemplar dieser Art gefunden und mir mitgetheilt.

### Ptosima. Solier.

1. *P. flavoguttata* Illig. Nach Herrn v. Heyden's Angabe wurde der Käfer bei Rüdesheim in Ulmen gefunden.

## Buprestis. Linné.

1. *B. berolinensis* Fabr. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten, wo alte, abständige Buchen sich finden, nicht selten.

2. *B. Alni* Fischer. Ein Exemplar von Senator **v. Heyden** aus Waldholz von Frankfurt erzogen.

## Pocilonota. Eschscholtz.

1. *P. conspersa* Gyll. Bei Darmstadt von **Reifsig**, bei Auerbach in der Bergstrafse von **Klier** an Pappeln gefunden. Bei Speyer wurde der Käfer in Mehrzahl gesammelt.

2. *P. rutilans* Fabr. Bei Bockenheim von Lehrer **Berntheusel** gefunden (**Heyden**).

## Ancylochira. Eschscholtz.

1. *A. punctata* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden I** bei Frankfurt aufgefunden.

2. *A. flavomaculata* Fabr. Von **Reifsig** bei Darmstadt entdeckt.

3. *A. octoguttata* Linn. Im ganzen Gebiete, aber überall selten.

## Eurythyrea. Solier.

1. *E. austriaca* Linn. Bei Darmstadt von **Klghfr.** ein Stück gefunden.

2. *E. carniolica* Hbst. Bei Babenhausen und Friedberg von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden. Die Larve lebt in alten Eichen und nach den Larvengängen zu urtheilen kommt der Käfer auch bei Ober Lais vor.

## Chalcophora. Solier.

1. *C. mariana* Linn. Schon von **Brehm** wurde der Käfer bei Mainz gefunden. Außerdem wurde er bei Lorsch und Lampertheim (**Heyden**), Babenhausen (**Scriba**), Hanau (**Heynemann**) beobachtet.

## Melanophila. Eschscholtz.

1. *M. cyanea* Fabr. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir in der Bergstrafse (Alsbacher Schlofs), von **v. Heyden I** bei Frankfurt einzeln gesammelt.

## Anthaxia. Eschscholtz.

1. *A. Millefolii* Fabr. Von Dr. **Bose** einige Stücke bei Ortenberg gefunden.

2. *A. manca* Fabr. In Rheinhessen von Superintendent **Schmitt** gesammelt.

3. *A. candens* Panz. Der Käfer wurde einzeln bei Eberstadt, Frankfurt, Hanau, Ortenberg, Ober-Lais gefunden, ist demnach im ganzen Gebiete verbreitet, aber sehr selten.

4. *A. Salicis* Fabr. Im Süden des Gebietes, an manchen Orten (Darmstadt, Babenhausen, Aschaffenburg) in manchen Jahren nicht selten.

5. *A. nitidula* Linn. Ueberall nicht selten.

6. *A. sepulchralis* Fabr. In der Bergstrasse, bei Darmstadt und Babenhausen einzeln beobachtet.

7. *A. morio* Fabr. Einige Stücke habe ich bei Babenhausen gefunden.

8. *A. quadripunctata* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet, im Süden desselben an manchen Orten häufig.

### Chrysobothris. Eschscholtz.

1. *C. affinis* Fabr. Bei Darmstadt nicht selten, bei Seligenstadt nur einzeln vorkommend. Bei Frankfurt und im Taunus von **v. Heyden**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

2. *C. Solieri* Lap. Von **Klghfr.** bei Darmstadt in Mehrzahl gesammelt.

### Coraebus. Laporte et Gory.

1. *C. undatus* Fabr. Im ganzen Gebiete, aber überall selten.

### Agrilus. Solier.

1. *A. biguttatus* Fabr. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

2. *A. sexguttatus* Hbst. Bei Darmstadt, Crumstadt und Worms beobachtet. Bei Aschaffenburg hat die Larve des Käfers die in den Schönen Busch führende Pappelallee im Jahr 1860 fast gänzlich zerstört, doch wurde der Käfer nur selten gefunden, weil er nach seiner Entwicklung wahrscheinlich nach den Spitzen der Bäume fliegt.

3. *A. sinuatus* Oliv. Bei Bingen von **Wagner**, bei Frankfurt von **Jaenicke**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Nidda von mir einzeln gesammelt.

4. *A. subauratus* Gebler. Von **v. Heyden II** bei Offenbach auf Aspen, bei Friedberg von mir aufgefunden.

5. *A. tenuis* Ratzb. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

6. *A. angustulus* Illig. Allenthalben nicht selten.

7. *A. olivicolor* Kiesw. Wie der Vorige, aber seltener.

8. *A. graminis* Lap. Bei Darmstadt einige Stück von Dr. **Nebel** gefunden.

9. *A. coeruleus* Rossi. Im ganzen Gebiet beobachtet, selten.

10. *A. convexicollis* Redt. Von Stud. **Böttger** bei Frankfurt aufgefunden.

11. *A. laticornis* Illig. Durchs ganze Gebiet, nicht häufig.

12. *A. rugicollis* Ratzb. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden.

13. *A. obscuricollis* Kiesw. Wie der Vorige.

14. *A. pratensis* Ratzb. Im ganzen Gebiete, selten.

15. *A. viridis* Linn. mit seinen verschiedenen Varietäten ist im ganzen Gebiete nicht selten.

16. *A. betuleti* Ratzeb. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von Stud. **Böttger** aufgefunden.

17. *A. Hyperici* Creutz. Bei Soden von **v. Heyden** I gefunden.

18. *A. cinctus* Oliv. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel** einzeln gesammelt; bei Herrstein an der Nahe von **v. Heyden** auf *Spartium scoparium* beobachtet.

19. *A. aurichalceus* Redt. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Zwingenberg in der Bergstrasse, von **v. Heyden** im Taunus auf Himbeeren gesammelt.

20. *A. integerrimus* Ratzeb. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Offenbach von **v. Heyden** II, bei Gießen von **Laubenheimer** gefunden.

### Cylindromorphus. Kiesenwetter.

1. *C. filum* Schh. Von **Klghfr.** bei Darmstadt in Mehrzahl gesammelt.

### Aphanisticus. Latreille.

1. *A. emarginatus* Fabr. Im Odenwald von **Wider**, bei Darmstadt von Dr. **Nebel** aufgefunden.

2. *A. pusillus* Oliv. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

### Trachys. Fabricius.

1. *T. minutus* Linn. Ueberall im Gebiete häufig.

2. *T. troglodytes* Schh. Bekannte Fundorte im Gebiete sind: Darmstadt (**Klghfr.**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Odenwald (**Wider**), Mombach bei Mainz und Eppstein im Taunus (**v. Heyden**), Ortenberg (Dr. **Bose**).

3. *T. nanus* Payk. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Superintendent **Schmitt** bei Mainz, von **v. Heyden** im Frankfurter Wald gesammelt.

## *Eucnemidae.*

### Drapetes. Redtenbacher.

1. *D. equestris* Fabr. Ein Exemplar in den Steinbrüchen von Groß-Steinheim von **v. Twardowski** gekötschert; desgleichen ein Exemplar von **Jaennicke** im Frankfurter Wald bei Schwanheim gefunden.

### Throscus. Latreille.

1. *T. dermestoides* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *T. carinifrons* Bonv. Einmal bei Soden von **v. Heyden** I aufgefunden.

3. *T. elateroides* Heer. Einige Stücke habe ich bei Seligenstadt gesammelt, **v. Heyden** bei Frankfurt und Soden.

4. *T. exul* Bonv. Von **v. Heyden** I bei Soden gefunden.

5. *T. obtusus* Curt. Von **Klghfr.** in Mehrzahl im Rheingebiet, von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg einzeln gesammelt.

### Cerophytum. Latreille.

1. *C. elateroides* Latr. Bei Enkheim an einer alten Weide von **v. Heyden** in Mehrzahl, bei Ortenberg von Dr. **Bose** ein ♀ Stück gefunden.

### Melasis. Olivier.

1. *M. beprestoides* Linn. Durchs ganze Gebiet in Eichen und Buchen, jedoch selten, vorkommend.

### Tharops. Laporte.

1. *T. melasoides*. Lap. Von **Reifsig** bei Darmstadt, von **v. Heyden** bei Frankfurt in Mehrzahl gesammelt. Lebt in Buchen.

### Eucnemis. Ahrens.

1. *E. capucinus* Ahr. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten häufig. Ich habe den Käfer in Pappeln und Buchen beobachtet.

### Dromaeolus. Kiesenwetter.

1. *D. barnabita* Villa. Von **v. Heyden** bei Frankfurt entdeckt; Stud. **Weis** hat in der Fasanerie bei Darmstadt ein Stück gefunden und mir mitgetheilt.

## ***Elateridae.***

### Adelocera. Latreille.

1. *A. varia* Oliv. Bei Seligenstadt von mir, bei Schwanheim von **v. Heyden** I und Dr. **M. Schmidt**, bei Soden von **v. Heyden** I und bei Ober-Lais in Mehrzahl von mir gesammelt. Der Käfer lebt in alten Eichen.

### Lacon. Laporte.

1. *L. murinus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

### Ludius. Latreille.

1. *L. ferrugineus* Linn. Bei Darmstadt, Crumstadt und der Bergstraße kommt der Käfer nicht selten in alten Weiden vor. Bei Babenhäusen und Seligenstadt fand ich ihn einzeln in alten Buchen. Bei Frankfurt wurde er von **v. Heyden** I, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gefunden.

### Corymbites. Latreille.

1. *C. pectinicornis* Linn. Im ganzen Gebiete, besonders in Gebirgsgegenden nicht selten.

2. *C. cupreus* Fabr. und *Var. aeruginosus* Fabr. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir im hohen Vogelsberg sehr häufig beobachtet, doch kommt die Stammform da nur einzeln vor.

3. *C. castaneus* Linn. Im ganzen Gebiet, aber nicht häufig.
4. *C. haematodes* Fabr. Allenthalben nicht selten.
5. *C. tessellatus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig; die Varietät *assimilis* Gyll findet sich nur einzeln.
6. *C. impressus* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
7. *C. metallicus* Payk. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt gefunden.
8. *C. aeneus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig in allen verschiedenen Färbungen.
9. *C. latus* Fabr. Wie der Vorige, aber seltener. Die Varietät *gravidus* Germ. ist selten.
10. *C. cruciatus* Fabr. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt in Mehrzahl gesammelt; auch bei Frankfurt von Senator **v. Heyden**.
11. *C. bipustulatus* Linn. Im ganzen Gebiete nicht häufig.
12. *C. holosericeus* Linn. Ueberall im Gebiete häufig.
13. *C. cinctus* Panz. Nicht häufig, aber durchs ganze Gebiet verbreitet.

### Campylus. Fischer.

1. *C. linearis* Linn. Im Süden des Gebietes weniger selten, als im Norden.

### Athous. Eschscholtz.

1. *A. rhombeus* Oliv. Eine Puppe, aus welcher sich der Käfer entwickelte, fand ich bei Ober-Lais in einer faulen Buche.
2. *A. niger* Linn. Im ganzen Gebiete häufig; die Varietät *scrutator* Hrbst. findet sich nur selten.
3. *A. mutilatus* Rosnh. Von **v. Heyden** I ein Stück bei Frankfurt aus Waldholz erzogen; ein Stück habe ich bei Ober-Lais an einer alten Eiche gefunden.
4. *A. haemorrhoidalis* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
5. *A. vittatus* Fabr. Wie der Vorige.
6. *A. longicollis* Fabr. Wie der Vorige.
7. *A. subfuscus* Müll. Noch häufiger, als die Vorigen.

### Limonius. Eschscholtz.

1. *L. Bructeri* Fabr. Im ganzen Gebiete, im Süden desselben aber weniger selten, als im Norden.
2. *L. violaceus* Müll. Ein Exemplar von **v. Heyden** I im Frankfurter Wald, eins von Dr. **Bose** bei Lifsberg in einer faulen Eiche aufgefunden.
3. *L. nigripes* Gyll. Im ganzen Gebiet, doch im Norden selten.
4. *L. cylindricus* Payk. Ueberall nicht selten.
5. *L. minutus* Linn. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** und bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt. Nicht häufig.

6. *L. parvulus* Panz. Im ganzen Gebiete nicht selten.

7. *L. lythroides* Germ. Im Süden des Gebietes viel weniger selten, als im Norden desselben.

### Sericosomus. Redtenbacher.

1. *S. brunneus* Linn. und *V. fugax* Fabr. Durchs ganze Gebiet häufig.

### Dolopius. Eschscholtz.

1. *D. marginatus* Linn. Ueberall sehr häufig.

### Agriotes. Eschscholtz.

1. *A. aterrimus* Linn. Im Süden des Gebietes nicht selten, im Norden nur sehr einzeln vorkommend.

2. *A. pilosus* Panz. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

3. *A. pallidulus* Illig. Noch häufiger als der Vorige.

4. *A. sobrinus* Kiesw. Im ganzen Gebiete verbreitet, bei Ober-Lais nicht selten.

5. *A. lineatus* Linn. Allenthalben sehr gemein.

6. *A. obscurus* Linn. Wie der Vorige und fast eben so gemein.

7. *A. sputator* Linn. Wie der Vorige.

8. *A. ustulatus* Schaller und *V. sputator* Redtenb. Ueberall auf Schirmblumen häufig.

9. *A. gallicus* Lap. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

### Betarmon. Kiesenwetter.

1. *B. bisbimaculatus* Schh. Bei Aschaffenburg von **Oechsner** mehrfach gesammelt.

### Adrastus. Eschscholtz.

1. *A. limbatus* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gefunden.

2. *A. pallens* Er. Im ganzen Gebiete, gerade nicht häufig.

3. *A. pusillus* Fabr. Wie der Vorige, weniger selten.

4. *A. humilis* Er. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

### Synaptus. Eschscholtz.

1. *S. filiformis* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.

### Melanotus. Eschscholtz.

1. *M. niger* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt häufig, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.

2. *M. brunnipes* Germ. Bei Seligenstadt und in der Bergstraße einzeln, in Rheinhessen häufig beobachtet.

3. *M. castanipes* Payk. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, im Vogelsberg von Dr. **Bose** gefunden.

4. *M. rufipes* Herbst. Im ganzen Gebiete häufig.

### Elater. Linné.

1. *E. sanguineus* Linn. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

2. *E. lythropterus* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** aufgefunden. Selten.

3. *E. sanguinolentus* Schrnk. Im ganzen Gebiete vorkommend, jedoch nicht häufig.

4. *E. praeustus* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt und bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt.

5. *E. pomorum* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir gefunden; selten.

6. *E. crocatus* Lap. Im ganzen Gebiete, aber nicht häufig.

7. *E. elongatulus* Oliv. Wie der Vorige, noch seltener.

8. *E. elegantulus* Schh. Von Revisor **Jaennicke** zu Frankfurt ein Exemplar bei Rüdelsheim an einem alten Weidenstamm gefunden.

9. *E. balteatus* Linn. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

10. *E. erythrogonus* Müll. Von Dr. **Doebner** im Spessart aufgefunden.

11. *E. ruficeps* Muls. Ein Exemplar habe ich bei Ober-Lais an einer Eiche gefunden.

12. *E. Megerlei* Lac. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von v. **Heyden** II bei Frankfurt aufgefunden.

13. *E. scrofa* Germ. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** sehr einzeln gesammelt.

14. *E. nigerrimus* Lac. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl in einem faulenden Eichenstumpfe gefunden.

### Ischnodes. Germar.

1. *I. sanguinicollis* Panz. Ein Stück bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, zwei Stück bei Frankfurt von v. **Heyden** I, zwei Stück von **Oechsner** bei Aschaffenburg und ein Stück bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

### Megapenthes. Kiesenwetter.

1. *M. tibialis* Lac. Im ganzen Gebiete, selten.

### Cryptohypnus. Eschscholtz.

1. *C. pulchellus* Linn. Im ganzen Gebiete, aber im Norden desselben seltener, als im Süden.

2. *C. tetragraphus* Germ. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** am Ufer der Nidder in Mehrzahl gesammelt.

3. *C. dermestoides* Hbst. Von Hauptmann **Fuhr** bei Friedberg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.

4. *C. lapidicola* Germ. Bei Darmstadt von **Klghfr.** gesammelt.

5. *C. minutissimus* Germ. Von **Oechsner** bei Aschaffenburg, von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir in der Bergstrasse, von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.

### Cardiophorus. Eschscholtz.

1. *C. thoracicus* Fabr. Im ganzen Gebiet, jedoch im Norden seltener.  
2. *C. ruficollis* Linn. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von v. **Heyden** I im Frankfurter Wald gesammelt.

3. *C. rufipes* Fabr. Von mir in der Bergstrasse und in Rheinhessen auf Blüthen gefunden. Herr Oberlieutenant v. **Heyden** hat den Käfer bei Bingen gesammelt.

4. *C. nigerrimus* Er. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt und in der Bergstrasse aufgefunden.

5. *C. musculus* Er. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gefunden.

6. *C. asellus* Er. Bei Darmstadt (Dr. **Nebel**), Seligenstadt (**Scriba**), Frankfurt (v. **Heyden** II) und Aschaffenburg (Dr. **Doebner**) vorkommend.

7. *C. cinereus* Hbst. Bei Seligenstadt, Darmstadt und Aschaffenburg einzeln.

8. *C. Equiseti* Hbst. Einige Stücke bei Seligenstadt gefunden.

### Dascillidae.

#### Dascillus. Latreille.

1. *D. cervinus* Minn. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden; nach **Klghfr.** auch bei Biedenkopf vorkommend. Bei Frankfurt nicht selten von v. **Heyden** II an *Salix caprea* gesammelt.

#### Helodes. Latreille.

1. *H. minuta* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten. Die Varietät *laeta* Panz hat Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden.

2. *H. marginata* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, im Taunus (Altkönig) von v. **Heyden** I, bei Ortenberg von Dr. **Bose** gesammelt.

3. *H. testacea* Linn. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von v. **Heyden** bei Frankfurt, von mir bei Seligenstadt an Schilf gefunden.

#### Cyphon. Paykull.

1. *C. coartatus* Payk. Im ganzen Gebiet nicht selten.

2. *C. nitidulus* Thoms. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

3. *C. fuscicornis* Thoms. Im ganzen Gebiete einzeln beobachtet.
4. *C. macer* Ksw. Ein Stück bei Seligenstadt gefunden.
5. *C. variabilis* Thunb. Ueberall im Gebiete häufig.
6. *C. Padi* Linn. Im Süden des Gebietes an manchen Orten nicht selten.

### Prionocyphon. Redtenbacher.

1. *P. serricornis* Müll. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Seligenstadt und Ober-Lais sehr einzeln gefunden.

### Hydrocyphon. Redtenbacher.

1. *H. deflexicollis* Müll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, im Taunus bei Falkenstein und Eppstein von **v. Heyden** gesammelt.

### Scirtes. Illiger.

1. *S. haemisphaericus* Linn. Im ganzen Gebiet, an manchen Orten zuweilen sehr gemein.

### Eucinetus. Germar.

1. *E. haemorrhoidalis* Germ. Bei Frankfurt von Oberlieutenant **v. Heyden** ein Exemplar an einem Staubpilz, bei Griesheim a. M. von Senator **v. Heyden** ein Stück gefunden.

### Eubria. Redtenbacher.

1. *E. palustris* Germ. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.

## **Malacodermata.**

### Dictyoptera. Latreille.

1. *D. sanguinea* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

### Eros. Newman.

1. *E. Aurora* Fabr. Von Dr. **Nebel** ein Stück auf dem Kuhkopf, von **v. Heyden** I eines bei Frankfurt aufgefunden.
2. *E. minutus* Fabr. Bei Darmstadt von **Höpfner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gesammelt.
3. *E. Cosnardi* Chevr. Von **v. Heyden** I bei Frankfurt und im Lorsbacher Thal, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von Dr. **Bose** bei Ortenberg gefunden.

### Homalisus. Geoffroy.

1. *H. suturalis* Fabr. Durchs ganze Gebiet nicht selten.

Lampyris. Linné.

1. *L. noctiluca* Linn. Im Norden des Gebietes häufiger, als im Süden.

Lamprorhiza. Duval.

1. *L. splendidula* Linn. Im ganzen Gebiete sehr gemein.

Phosphaenus. Laporte.

1. *P. hemipterus* Fabr. Bei Frankfurt von Dr. **Steitz**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Höchst a. M. von **v. Heyden I** aufgefunden.

Drilus. Olivier.

1. *D. flavescens* Fabr. Bei Frankfurt und Offenbach von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden. Herr **v. Heyden** hat den Käfer aus verschiedenen *Helix*-Arten, als *lapicida*, *fruticum*, *nemoralis* erzogen, auch Larven in *Clausilica* gefunden.

2. *D. concolor* Ahr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden I** bei Sachsenhausen an Hecken, von Dr. **Bose** bei Ortenberg gesammelt.

Cantharis. Linné.

1. *C. alpina* Payk. nebst Varietäten *rubens* Fabr. und *lateralis* Linn. von **v. Heyden I** auf dem Feldberg gefunden. Der Käfer kommt auch im hohen Vogelsberg vor.

2. *C. abdominalis* Fabr. *V. cyanipennis* Bach. In der hohen Mark am Taunus von **v. Heyden I** ein Stück gefunden.

3. *C. violacea* Payk. ♀ *V. tigurina* Dietr. Ein Exemplar am Feldberg von **v. Heyden I** aufgefunden.

4. *C. oculata* Gebl. Bei Frankfurt nach Herrn **v. Heyden's** Angabe nicht selten.

5. *C. fusca* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

6. *C. rustica* Fallen. Wie die Vorige.

7. *C. obscura* Linn. Ueberall im Gebiete häufig.

8. *C. pulicaria* Fabr. Sehr einzeln bei Seligenstadt und Ober-Lais.

9. *C. nigricans* Müll. Im ganzen Gebiete nicht selten.

10. *C. pellucida* Fabr. Wie die Vorige.

11. *C. livida* Linn. und *Var. dispar* Fabr. Ueberall sehr häufig.

12. *C. assimilis* Payk. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

13. *C. sudetica* Letzn. Im Odenwald von **Wider**, bei Soden, Kirschberg von **v. Heyden I**, bei Seligenstadt von mir gesammelt.

14. *C. haemorrhoidalis* Fabr. Von Senator **v. Heyden** im Taunus (Falkenstein, Hofheim, Feldberg) gesammelt.

15. *C. rufa* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

16. *C. bicolor* Panz. Wie die Vorige, aber nicht häufig.

17. *C. fulvicollis* Fabr. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten häufig.

18. *C. thoracica* Oliv. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I an Sumpfstellen sehr häufig gesammelt.

19. *C. paludosa* Fall. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt, von **v. Heyden** auf dem Feldberg einzeln gefunden.

20. *C. oralis* Germ. Im ganzen Gebiete, gerade nicht selten.

21. *C. discoidea* Ahr. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Gießen von **Laubenheimer** gesammelt, bei Ober-Lais von mir gefunden.

22. *C. rufescens* Letzn. Bei Ober-Lais einige Stücke gefunden.

23. *C. fulva* Scop. Ueberall sehr häufig.

24. *C. fuscicornis* Oliv. Wie die Vorige, weniger häufig.

25. *C. testacea* Linn. Im ganzen Gebiete gemein.

26. *C. femoralis* Brull. Bei Seligenstadt ein Stück aufgefunden.

27. *C. pallida* Fabr. und *Var. pallipes* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

28. *C. atra* Linn. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Frankfurt und auf dem Feldberg gesammelt.

29. *C. elongata* Fall. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Ober-Lais von mir einzeln aufgefunden.

30. *C. denticollis* Schumm. Ein Exemplar hat Revisor **Jaennicke** zu Frankfurt im Taunus (Urselthal) gefunden.

### Silis. Latreille.

1. *S. nitidula* Fabr. Von **Klghfr.** bei Lorsch gesammelt.

### Malthinus. Latreille.

1. *M. fasciatus* Fall. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten, z. B. Alsbacher Schloß in der Bergstrasse, Soden, nicht selten. Die Varietät *seriepunctatus* Kiesw. kommt nur einzeln vor.

2. *M. glabellus* Kiesw. Bei Seligenstadt und in der Bergstrasse von mir, im Taunus von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden, nicht häufig.

3. *M. flaveolus* Payk. Im ganzen Gebiete, gerade nicht selten vorkommend.

4. *M. biguttulus* Payk. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg aufgefunden.

5. *M. frontalis* Marsh. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln an alten Bäumen gesammelt. Von Dr. **Doebner** auch bei Aschaffenburg gefunden. Herr **v. Heyden** hat den Käfer nicht selten aus dürrer Waldholz erzogen.

### Matthodes. Kiesenwetter.

1. *M. sanguinolentus* Fall. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *M. marginatus* Latr. Wie der Vorige, seltener.

3. *M. mysticus* Kiesw. Einige Stücke bei Ober-Lais.

4. *M. trifurcatus* Kiesw. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir bei Seligenstadt einzeln gesammelt.
5. *M. guttifer* Kiesw. Bei Seligenstadt und Ober-Lais einzeln.
6. *M. dispar* Germ. Im ganzen Gebiet, aber nicht häufig.
7. *M. flavoguttatus* Kiesw. Ein Stück bei Seligenstadt.
8. *M. maurus* Redt. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.
9. *M. misellus* Kiesw. Bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.
10. *M. hexacanthus* Kiesw. Von **v. Heyden** am Feldberg und am Falkenstein im Taunus nicht selten gesammelt.
11. *M. nigellus* Kiesw. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg, von mir bei Ober-Lais einzeln gefunden.
12. *M. brevicollis* Payk. Im ganzen Gebiet nicht selten.
13. *M. spathifer* Kiesw. Im Taunus von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais in Mehrzahl von mir gesammelt, von Eichen geklopft.
14. *M. pulicarius* Redt. Ein Exemplar fing Senator **v. Heyden** bei Frankfurt.

#### Malachius. Fabricius.

1. *M. aeneus* Linn. Bei Seligenstadt von mir, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln, bei Gladenbach sehr häufig gesammelt.
2. *M. scutellaris* Er. Im ganzen Gebiete einzeln. Herr Oberlieutenant **v. Heyden** hat die Larve im Neste einer Mauerbiene beobachtet.
3. *M. rubidus* Er. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Offenbach, Frankfurt und Mainz von **v. Heyden**, bei Seligenstadt von mir aufgefunden.
4. *M. bipustulatus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.
5. *M. viridis* Fbr. Wie der Vorige.
6. *M. marginellus* Fabr. Wie der Vorige, weniger häufig.
7. *M. elegans* Oliv. Von **v. Heyden** I bei Oberstein an der Nahe, von mir bei Ober-Lais gefunden.

#### Axinotarsus. Motschulsky.

1. *A. pulicarius* Fabr. Bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden**, bei Seligenstadt und in Rheinhessen von mir gesammelt.
2. *A. marginalis* Er. Im ganzen Gebiete nicht selten.
3. *A. rubicollis* Mrsh. Wie der Vorige.

#### Anthocomus. Erichson.

1. *A. sanguinolentus* Fabr. Bei Offenbach und Frankfurt an Schilf häufig von **v. Heyden** I, bei Jugenheim in der Bergstrasse ein Exemplar von **v. Heyden** II gefunden.
2. *A. equestris* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
3. *A. fasciatus* Linn. Wie der Vorige; ein Exemplar der *Var. regalis* Charp. von **v. Heyden** I bei Soden.

Attalus. Erichson.

1. *A. lobatus* Oliv. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.

Ebaeus. Erichson.

1. *E. pedicularius* Schrnk. Im ganzen Gebiet, an manchen Orten, z. B. in Rheinhessen, häufig.
2. *E. appendiculatus* Er. Bei Flörsheim am Main von v. **Heyden** häufig gesammelt.
3. *E. thoracicus* Oliv. Im ganzen Gebiet nicht selten.

Hypebaeus. Kiesenwetter.

1. *H. flavipes* Fabr. Durchs ganze Gebiet verbreitet.

Charopus. Erichson.

1. *C. flavipes* Payk. Ueberall im Gebiete häufig.

Troglops. Erichson.

1. *T. albicans* Linn. Im ganzen Gebiete, selten.

Dasytes. Paykull.

1. *D. niger* Linn. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von mir bei Ober-Lais gefunden.
2. *D. coeruleus* Fabr. Ueberall häufig.
3. *D. fuscus* Illig. Bei Frankfurt, Ortenberg, Friedberg, Ober-Lais einzeln beobachtet.
4. *D. plumbeus* Müller. Im ganzen Gebiete sehr häufig.

Dolichosoma. Stephens.

1. *D. lineare* Fabr. Im ganzen Gebiete, im Süden häufiger, als im Norden desselben.

Haplocnemus. Stephens.

1. *H. Pini* Redt. Durchs ganze Gebiet verbreitet, nicht häufig.
2. *H. nigricornis* Fabr. Wie der Vorige, viel häufiger.

Julistus. Kiesenwetter.

1. *J. floralis* Oliv. Bei Darmstedt von **Klghfr.** aufgefunden.
2. *J. fulvohirtus* Brisout. Von v. **Heyden** aus abgefallenen Fichtenzapfen gezogen.

Danacaea. Laporte.

1. *D. pallipes* Panz. Im ganzen Gebiete, aber im Süden häufiger.
2. *D. nigratarsis* Kust. In Rheinhessen nicht selten; auch bei Frankfurt von v. **Heyden** II gesammelt.

## **Telmatophilidae.**

### Psammoechus.

1. *P. bipunctatus* Fabr. Bei Frankfurt von v. Heyden aufgefunden.

### Telmatophilus.

1. *T. Sparganii* Heer. Bei Darmstadt von Dr. Nebel, bei Seligenstadt von mir einzeln, bei Frankfurt und Enkheim von v. Heyden nicht selten gesammelt.
2. *T. Typhae* Fall. Im ganzen Gebiete, aber im Süden weniger häufig.
3. *T. Caricis* Oliv. Wie der Vorige, häufiger.
4. *T. Schönherri* Gyll. Einige Stücke bei Enkheim von v. Heyden I gefunden.
5. *T. brevicollis* Aubé. Bei Seligenstadt von mir in wenigen Exemplaren aufgefunden.

### Byturus. Latreille.

1. *B. fumatus* Fabr. Im ganzen Gebiete häufig.
2. *B. tomentosus* Fabr. Wie der Vorige, nur auf Himbeeren vorkommend.

### Diplocoelus. Guérin.

1. *D. Fagi* Guér. Im ganzen Gebiete verbreitet; an manchen Orten, Frankfurt, Ober-Lais, an alten Buchen nicht selten.

## **Cleridae.**

### Denops. Fischer.

1. *D. albofasciatus* Charp. Von Superintendent Schmitt bei Mainz ein Exemplar aufgefunden.

### Tillus. Olivier.

1. *T. elongatus* Linn. Im ganzen Gebiete vorkommend, besonders in Buchen. Von Dr. Nebel in Mehrzahl auch aus Saalweiden erzogen. Die Var. *bimaculatus* Dön. wurde bei Frankfurt von v. Heyden I gefunden.
2. *T. unifasciatus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. Nebel, bei Aschaffenburg von Oechsner (in Mehrzahl), bei Hanau von Heynemann, bei Mainz von Dr. Zitz gesammelt.

### Opilus. Latreille.

1. *O. mollis* Linn. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
2. *O. domesticus* St. Wie der Vorige, seltener. Klghfr. hat *Opilus*-Larven beobachtet, wie dieselben in den Gängen von *Anobium striatum* die Larven aufsuchten und verzehrten.

### Clerus. Geoffroy.

1. *C. mutillarius* Fabr. Bei Darmstadt wurde der Käfer früher im Holzhohe nicht selten gefunden; auch bei Frankfurt fand er sich früher auf Zimmerplätzen an Eichenholz öfters vor; jetzt wird er nur sehr einzeln angetroffen.

2. *C. formicarius* Linn. Ueberall häufig.

3. *C. rufipes* Brahm. Von **Klghfr.** und Dr. **Nebel** bei Darmstadt gefunden, von **v. Heyden** aus dürrer Holz in Mehrzahl erzogen.

4. *C. quadrimaculatus* Fabr. Bekannte Fundorte sind: Darmstadt (**Klghfr.** und Dr. **Nebel**), Alsbach in der Bergstrasse (**Scriba**), Aschaffenburg (**Oechsner**), Frankfurt (**v. Heyden I**, Dr. **Haag**, Dr. **M. Schmidt**), Ortenberg (Dr. **Bose**).

### Trichodes. Herbst.

1. *T. alvearius* Fabr. Im ganzen Gebiet häufig.

2. *T. apiarius* Linn. Wie der Vorige, aber im Süden häufiger.

### Orthopleura. Spinola.

1. *O. sanguinicollis* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und **Reifsig**, bei Babenhausen von mir, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** und bei Frankfurt von Dr. **Steltz** einzeln gesammelt.

### Corynetes. Herbst.

1. *C. coeruleus* Degeer. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

2. *C. ruficornis* Sturm. Wie der Vorige, häufiger.

3. *C. ruficollis* Fabr. Bei Darmstadt nicht selten.

4. *C. rufipes* Fabr. Bei Frankfurt von **v. Heyden I** einzeln aufgefunden.

5. *C. violaceus* Linn. Ueberall am Aas häufig.

### Lymexylidae.

#### Hylecoetus. Latreille.

1. *H. dermestoides* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet, im Süden weniger selten. Die männliche Varietät *proboscideus* Fabr. wurde von **Wider** im Odenwald gesammelt.

#### Lymexylon. Fabricius.

1. *L. navale* Linn. Ueberall im Gebiete nicht selten. Der Käfer findet sich besonders in alten Eichen, wurde aber von **v. Heyden** bei Cronthal im Taunus auch in zahmen Kastanien häufig angetroffen.

### **Ptiniore.**

#### **Hedobia. Sturm.**

1. *H. imperialis* Linn. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten (Darmstadt, Frankfurt) nicht selten.

2. *H. regalis* Duftschm. Bei Seligenstadt ein Exemplar von mir, bei Soden 2 Stück von **v. Heyden** I aufgefunden.

#### **Ptinus. Linné.**

1. *P. variegatus* Rossi. Von **Klghfr.** bei Darmstadt aufgefunden.

2. *P. sexpunctatus* Panz. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt. Bei Frankfurt wurde der Käfer von **v. Heyden** I nicht selten unter Rinden angetroffen.

3. *P. dubius* St. = *crenatus* Payk. Bei Seligenstadt einzeln von mir gesammelt; bei Offenbach und Frankfurt hat ihn **v. Heyden** I in Mehrzahl auf Fichten beobachtet.

4. *P. rufipes* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

5. *P. ornatus* Müller. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** in Mehrzahl gesammelt. Herr **v. Heyden** I hat ihn bei Soden in dürrn Pflaumenzweigen und bei Rüdesheim in altem Epheu angetroffen.

6. *P. bicinctus* Sturm. Bei Lorsch und Frankfurt von **v. Heyden** I einzeln aufgefunden.

7. *P. fur.* Linn. Ueberall gemein.

8. *P. pusillus* Strm. Von **v. Heyden** I bei Frankfurt häufig in Bucheln gefunden.

9. *P. subpilosus* Strm. Bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir im Mulme der Colonieen von *Form. fuliginosa* aufgefunden; bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** I und Dr. **M. Schmidt** gesammelt.

10. *P. pilosus* Müller. Bekannte Fundorte im Gebiete sind: Darmstadt (Dr. **Nebel**), Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Hanau (**Heynemann**), Frankfurt (**v. Heyden** I).

11. *P. brunneus* Duftschm. Bei Mainz und Bingen von **v. Heyden** I aufgefunden.

12. *P. latro* Fabr. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von den Herren **v. Heyden** bei Frankfurt und Mainz gesammelt.

13. *P. testaceus* Ol. In Frankfurt in Häusern, einzeln von **v. Heyden** I gefunden.

14. *P. bidens* Ol. Bei Seligenstadt nicht selten an Häusern, bei Ober-Lais nur sehr einzeln vorkommend. Herr **v. Heyden** I hat 2 Stücke bei Frankfurt unter Buchenrinde gefunden und Dr. **Bose** den Käfer auch bei Ortenberg beobachtet.

15. *P. crenatus* Fabr. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von mir bei Seligenstadt einzeln gesammelt. **v. Heyden** I hat den Käfer auf der Ruine Königstein im Taunus in Mehrzahl in alten Schneckenhäusern angetroffen.

### Gibbium. Scopoli.

1. *G. scotias* Fabr. In Mainz von Dr. **Zitz** gefunden. Auf dem Senkenbergischen Museum zu Frankfurt wurde der Käfer von Herrn Bankbeamten **Scheidel** in Mehrzahl als aus Australien eingeschleppt beobachtet.

### Dryophilus. Chevrolat.

1. *D. pusillus* Gyll. Im ganzen Gebiete auf blühenden Fichten nicht selten.

2. *D. anobioides* Chevr. Von Dr. **Doebner** auf *Spartium scoparium* bei Aschaffenburg einige Stücke gefunden.

### Gastrallus. Duval.

1. *G. immarginatus* Müller. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** II gefunden.

### Anobium. Fabricius.

1. *A. denticolle* Panz. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

2. *A. emarginatum* Duftschm. Ein Exemplar habe ich bei Ober-Lais gefunden.

3. *A. pertinax* Linn. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.

4. *A. striatum* Oliv. Im ganzen Gebiete gemein.

5. *A. fulvicorne* Strm. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** I bei Soden, von mir bei Ober-Lais aufgefunden.

6. *A. nitidum* Hbst. Im ganzen Gebiete beobachtet, von **v. Heyden** in Menge aus altem Buchenholz erzogen.

7. *A. rufipes* Fabr. Im ganzen Gebiete, aber im Süden häufiger, als im Norden desselben.

8. *A. paniceum* Linn. Ueberall häufig.

9. *A. pulsator* Schaller. Wie der Vorige.

10. *A. plumbeum* Illig. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** (in großer Menge im Buchenholz), bei Ortenberg von Dr. **Böse** gesammelt.

11. *A. molle* Linn. Auf dem Alsbacher Schloß in der Bergstraße einige Stücke an Epheu gefunden. Herr **v. Heyden** fand den Käfer einzeln in Frankfurt an Häusern.

12. *A. abietis* Fabr. Ueberall im Gebiete häufig in alten Fichtenzapfen.

13. *A. pini* St. Von **v. Heyden** I einmal aus Fichtenzapfen erzogen.

14. *A. nigrinum* Strm. Bei Frankfurt von **v. Heyden** ein Stück auf Kiefern aufgefunden.

15. *A. longicorne* Strm. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Cronthal 2 Exemplare von **v. Heyden** I gefunden.

16. *A. angusticollis* Ratzeb. Von **v. Heyden** I einigemal aus Fichtenzapfen gezogen.

17. *A. abietinum* Gyll. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Ortenberg von Dr. **Bose** einzeln gesammelt. Herr **v. Heyden** I hat den Käfer auch aus Fichtenzapfen erzogen.

### Oligomerus. Redtenbacher.

1. *O. brunneus* Oliv. Im ganzen Gebiete an alten Eichen, Buchen und Aepfelbäumen, an manchen Orten nicht selten.

### Trypopytus. Redtenbacher.

1. *T. Carpini* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt.

### Ochina. Sturm.

1. *O. Hederæ* Müll. Im ganzen Gebiete auf Epheu, an manchen Stellen, z. B. Bergstrasse (Alsbacher Schloß), Frankfurt (Eschenheimer Thurm) sehr häufig.

### Ptilinus. Geoffroy.

1. *P. costatus* Gyll. Durchs ganze Gebiet an alten Weiden und Pappeln nicht selten.

2. *P. pectinicornis* Linn. Wie der Vorige, sehr häufig an alten Buchen.

### Xyletinus. Latreille.

1. *X. pectinatus* Fabr. Im ganzen Gebiet, nicht häufig.

2. *X. ater* Panz. Wie der Vorige, seltener.

3. *X. laticollis* Duftschm. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr**, bei Ober-Lais von mir in je einem Exemplar aufgefunden.

### Pseudochina. Duval.

1. *P. laevis* Illig. Man findet das Käferchen oft in großer Menge in Tabaksrollen todt und alsdann aus Amerika eingeschleppt; aber auch lebend in Herbarien. Es ist durch den Handel überall verbreitet.

2. *P. testacea* Duftschm. Bei Mainz von Superintendent **Schmitt** auf Disteln gefunden und Herrn **v. Heyden** mitgetheilt.

### Mesocoelopus. Duval.

1. *M. niger* Müll. Auf Epheu bei Seligenstadt von mir, bei Rüdesheim von **v. Heyden** I nicht selten gesammelt.

### Dorcatoma. Herbst.

1. *D. dresdensis* Hbst. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I einzeln aufgefunden.

2. *D. chrysolina* Strm. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg, von **v. Heyden** bei Frankfurt an Baumschwämmen gesammelt.

3. *D. flavicornis* Fabr. Im ganzen Gebiete, an alten Eichenschwämmen.

4. *D. Bovistae* Ent. Heft. Wie die Vorige, aber nur in Bovisten.

5. *D. rubens* Ent. Heft. Von **v. Heyden** im Frankfurter Wald und bei Königstein einzeln an rothfaulen Eichen gefunden.

### Sphindus. Chevrolat.

1. *S. dubius* Gyll. Bei Frankfurt von **v. Heyden** an Staubpilzen, bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gesammelt.

### Aspidiphorus. Latreille.

1. *A. orbiculatus* Gyll. Im ganzen Gebiet vorkommend.

### Xylopertha. Guérin.

1. *X. sinuata* Fabr. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** in dürren Eichenästen mehrfach, im Frankfurter Wald von Dr. **Steitz** ein Exemplar an Buchenholz gefangen.

### Apate. Fabricius.

1. *A. capucina* Linn. Bei Darmstadt früher nicht selten von **Reifsig** und **Klghfr.**, bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden** I an Eichenholz gefunden.

2. *A. varia* Ill. Im ganzen Gebiet verbreitet, aber nirgends häufig.

### Lyctus: Fabricius.

1. *L. canaliculatus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *L. pubescens* Panz. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von **v. Heyden** I bei Frankfurt, von mir bei Harxheim in Rheinhessen in einzelnen Stücken aufgefunden.

3. *L. bicolor* Comolli. Von **v. Heyden** I bei Frankfurt öfter in Weidenholz gefunden.

## Cisidae.

### Rhopalodontus. Mellié.

1. *R. fronticornis* Panz. Im ganzen Gebiete, an manchen Orten (Darmstadt, Frankfurt) nicht selten.

### Cis. Latreille.

1. *C. Boleti* Scopoli. Ueberall gemein.

2. *C. rugulosus* Mellié. Bei Frankfurt einmal von **v. Heyden** aufgefunden.

3. *C. setiger* Mellié. Bei Frankfurt und Rüdesheim in je einem Exemplar von **v. Heyden** gefunden.

4. *C. micans* Hbst. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir einzeln gesammelt.

5. *C. hispidus* Payk. Allenthalben im Gebiete nicht selten.

6. *C. comptus* Gyll. Von **v. Heyden** I bei Frankfurt einmal, von mir bei Ober-Lais in Mehrzahl gesammelt.

7. *C. quadridens* Mellié. Einige Exemplare hat **v. Heyden** I bei Frankfurt gefunden.

8. *C. elongatulus* Gyll. Bei Ober-Lais ein Exemplar.

9. *C. bidentatus* Oliv. Bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl gesammelt.

10. *C. nitidus* Hbst. Bei Frankfurt häufig in morschem Fichtenholz (**v. Heyden**).

11. *C. Alni* Gyll. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.

12. *C. festivus* Panz. Wie der Vorige, häufig.

13. *C. castaneus* Mellié. Von **v. Heyden** bei Frankfurt und Zwingenberg an der Bergstrasse aufgefunden.

#### Ennearthron. Mellié.

1. *E. cornutum* Gyll. Im ganzen Gebiete, bei Ober-Lais nicht selten.

2. *E. affine* Gyll. Wie das Vorige.

#### Octotemnus. Mellié.

1. *O. glabriculus* Gyll. Ueberall im Gebiete nicht selten.

### ***Tenobrionidae.***

#### Blaps. Fabricius.

1. *B. mucronata* Latr. Ich besitze ein in Mainz aufgefundenes Exemplar. Nach **v. Heyden** ist der Käfer auch in Frankfurt in Pferdeställen nicht selten.

2. *B. mortisaga* Linn. Von Dr. **Nebel** in Darmstadt, von mir in Seligenstadt gesammelt.

3. *B. similis* Latr. Im ganzen Gebiete häufig.

#### Crypticus. Latreille.

1. *C. quisquilius* Linn. Im Süden des Gebietes, besonders in Sandgegenden häufig.

#### Opatrum. Fabricius.

1. *O. sabulosum* Linn. Wie der Vorige. Von **Klghfr.** wurde im Rheingenist ein *Opatrum* in mehreren Exemplaren gefunden, welches dem

*O. sabulosum* sehr ähnlich ist, sich jedoch durch folgende Merkmale unterscheidet : Die Ausrandung des Kopfschildes ist mehr gerundet, das Halschild nicht gleichförmig gekörnt, das Schildchen weniger dicht und schwächer punktirt, die Flügeldecken einzelner gekörnt und der Enddorn der Vorderschienen ist kräftiger entwickelt, als bei *O. sabulosum*. Ein ganz gleiches Stück habe ich auch aus dem Allgäu erhalten. **Klghfr.** hat dem Käfer den Namen *O. riparium* gegeben.

#### Microzoum. Redtenbacher.

1. *M. tibiale* Fabr. Im Süden des Gebietes, besonders in Sandgegenden nicht selten.

#### Bolitophagus. Illiger.

1. *B. reticulatus* Linn. Von Dr. **Doebner** aus Holzschwämmen, die ursprünglich aus Südbaiern stammten, in Mehrzahl erzogen.

2. *B. interruptus* Illig. Bei Baden-Baden von **v. Heyden I** in einem Schwamme in großer Anzahl gesammelt.

3. *B. armatus* Panz. Bei Frankfurt in trockenen Eichenschwämmen von **v. Heyden I** und Dr. **M. Schmidt** gefunden.

#### Eledona. Latreille.

1. *E. agaricola* Hbst. Im ganzen Gebiete häufig in Baumschwämmen.

#### Diaperis. Geoffroy.

1. *D. Boleti* Linn. Allenthalben im Gebiete nicht selten.

#### Scaphidema. Redtenbacher.

1. *S. aeneum* Payk. Der Käfer wurde gefunden zu Darmstadt (Dr. **Nebel**), Seligenstadt (**Scriba**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Frankfurt (Dr. **M. Schmidt**). Ueberall selten.

#### Platydema. Laporte.

1. *P. violaceum* Fbr. Bei Darmstadt von **Reifsig**, Advokat **Hoyer** und Lieutenant **Scriba**, bei Frankfurt von den Herren **v. Heyden** und bei Ober-Lais von mir einzeln aufgefunden.

#### Pentaphyllus. Latreille.

1. *P. testaceus* Hellw. Im ganzen Gebiete in rothfaulem trockenen Eichenholz nicht selten.

#### Tribolium. Mac Leay.

1. *T. ferrugineum* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, bei Seligenstadt von mir in Specereiwaaren, bei Frankfurt von **v. Heyden** unter Rinden gefunden.

### Hypophloeus. Hellwig.

1. *H. depressus* Fabr. Im ganzen Gebiete unter Rinden nicht selten.
2. *H. castaneus* Fabr. Wie der Vorige, aber seltener.
3. *H. Fraxini* Kugel. Im Frankfurter Wald von **v. Heyden** zwei Exemplare unter Kiefernrinde gefunden.
4. *H. rufulus* Rosenh. Ein von **Reifsig** bei Darmstadt gefundenes Stück befindet sich in der Sammlung des Herrn **v. Heyden**.
5. *H. bicolor* Oliv. Durchs ganze Gebiet verbreitet, bei Frankfurt nicht selten.
6. *H. longulus* Gyll. Von Dr. **Doebner** bei Aschaffenburg gesammelt.
7. *H. fasciatus* Fabr. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** einzeln gesammelt.
8. *H. linearis* Fabr. Von **v. Heyden** in großer Anzahl aus dürrern Waldholz erzogen.

### Uloma. Redtenbacher.

1. *U. culinaris* Linn. Im ganzen Gebiete; bei Ober-Lais in morschem Buchenholz nicht selten.

### Tenebrio. Linné.

1. *T. molitor* Linn. Ueberall gemein im Mehl.
2. *T. obscurus* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.
3. *T. opacus* Dftschm. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Frankfurt und Soden von **v. Heyden I**, bei Ober-Lais von mir im Mulme hohler Bäume gefunden.
4. *T. transversalis* Dftschm. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden I** einzeln gesammelt.

### Helops. Fabricius.

1. *H. lamipes* Linn. Bei Frankfurt einzeln von **v. Heyden**, bei Friedberg in Mehrzahl von Hauptmann **Fuhr** an alten Apfelstämmen gesammelt.
2. *H. striatus* Foucroy. In der Provinz Starkenburg überall in Waldungen häufig.
3. *H. quisquilius* Fabr. Auf dem Niederwald bei Rüdesheim von **v. Heyden I** unter Eichenrinden gefunden.

### Cistelidae.

#### Allecula. Fabricius.

1. *A. morio* Fabr. Im ganzen Gebiete in alten Waldungen.

#### Cistela. Fabricius.

1. *C. Luperus* Hbst. Im Süden des Gebietes häufiger als im Norden

desselben; die Varietät *ferruginea* Fabr. hat **v. Heyden** bei Frankfurt gesammelt.

2. *C. ceramboides* Linn. Im ganzen Gebiete, überall sehr einzeln vorkommend.

3. *C. fusca* Illig. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Crumstadt von mir, bei Frankfurt und Eberstadt von **v. Heyden** I einzeln gesammelt.

4. *C. murina* Linn. Im ganzen Gebiete, aber im Süden häufiger.

5. *C. atra* Fabr. Wie die Vorige, weniger häufig.

### Mycetochares. Latreille.

1. *M. barbata* Latr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

2. *M. bipustulata* Illig. Bei Aschaffenburg von **Oechsner**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir einzeln gesammelt. Dr. **Bose** in Ortenberg hat den Käfer in einem faulen Eichenstumpf in großer Anzahl in Gesellschaft mit der folgenden Art gesammelt, wodurch die Vermuthung **Mulsant's** bestärkt wird, daß diese Art das ♀ von *M. scapularis* sei.

3. *M. scapularis* Gyll. Ausser von Dr. **Bose** auch von **Klghfr.** bei Darmstadt, **Oechsner** bei Aschaffenburg und **Heynemann** bei Hanau aufgefunden.

4. *M. axillaris* Payk. In Mehrzahl in faulen Buchen bei Ober-Lais gesammelt.

### Cteniopus. Solier.

1. *C. sulfureus* Linn. Im Süden des Gebietes nicht selten.

2. *C. bicolor* Fabr. Von **Klghfr.** bei Darmstadt, von mir bei Seligenstadt einzeln aufgefunden.

### Omophlus. Solier.

1. *O. Amerinae* Curt = *pinicola* Redt. Ein Exemplar bei Seligenstadt gefunden.

2. *O. lividipes* Muls = *picipes* Redt. Bei Darmstadt, Seligenstadt, Lorsch, Mombach, Ortenberg vorkommend.

3. *O. lepturoides* Fabr. In der Sammlung des Herrn **v. Heyden** befinden sich Exemplare, welche bei Herrstein gesammelt wurden.

### Pythidae.

#### Salpingus. Illiger.

1. *S. aeratus* Muls. Im Frankfurter Wald und bei Bieber von **v. Heyden** einzeln an Kiefern aufgefunden.

2. *S. castaneus* Panz. Im ganzen Gebiete unter Kiefernrinde, an manchen Orten nicht selten.

3. *S. foveolatus* Ljungh. Von Dr. **Nebel** bei Darmstadt, von Dr. **Bose** ein Stück bei Ortenberg unter Buchenrinde von mir ein Stück bei Nidda unter Birkenrinde gefunden.

Lissodema. Curtis.

1. *L. denticolle* Gyll. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Soden von **v. Heyden I** an Zäunen gesammelt.

Rhinosimus. Latreille.

1. *R. ruficollis*. Im ganzen Gebiete, gerade nicht häufig.
2. *R. viridipennis* Latr. Von Dr. **Bose** bei Ortenberg in Mehrzahl unter Birkenrinden aufgefunden.
3. *R. planirostris* Fabr. Ueberall im Gebiete nicht selten.

*Melandryadae.*

Tetratoma. Fabricius.

1. *T. fungorum* Fabr. Im ganzen Gebiet in Baumschwämmen, zuweilen nicht selten.
2. *T. ancora* Fabr. Von Dr. **Bose** und mir in Mehrzahl aus Moos geschüttelt, welches im Winter von Bäumen abgekratzt wurde und in welchem der Käfer seinen Winterschlaf hielt. Von **v. Heyden I** auch bei Kirschberg aufgefunden.

Eustrophus. Latreille.

1. *E. dermestoides* Fabr. Im ganzen Gebiete nicht selten.

Orchesia. Latreille.

1. *O. micans* Panz. Ueberall nicht selten in Baumschwämmen.
2. *O. minor* Walk. Einige Exemplare von mir bei Seligenstadt, zwei Stück von Dr. **Bose** bei Ortenberg aufgefunden.

Hallomenus. Panzer.

1. *H. humeralis* Panz. Bei Frankfurt ein Exemplar von **v. Heyden I**, bei Darmstadt von **Höpfner** gefunden.

Phloeotrya. Stephens.

1. *P. rufipes* Gyll. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** gefunden.
2. *P. Vaudoueri* Muls. Bekannte Fundorte im Gebiete sind: Darmstadt (Stud. **Weis**), Cronthal **v. Heyden I**, Dr. **M. Schmidt**), Aschaffenburg (Dr. **Doebner**), Ober-Lais (**Scriba**).

Dircaea. Fabricius.

1. *D. laevigata* Hellen. In der Sammlung des Herrn **v. Heyden** befinden sich zwei bei Reichelsheim im Odenwald von **Wider** gefundene Exemplare.

### Anisoxya. Mulsant.

1. *A. fuscula* Ill. Ein Exemplar habe ich bei Seligenstadt gefunden.

### Abdera. Stephens.

1. *A. quadrifasciata* Curt. Von Dr. Haag bei Hallgarten im Rheingau einige Exemplare gesammelt.
2. *A. triguttata* Gyll, Var. *scutellaris* Muls. Bei Frankfurt wurde ein Stück von v. Heyden I an schimmeliger Kiefernrinde aufgefunden.
3. *A. affinis* Payk. Im ganzen Gebiete verbreitet, in Baumschwämmen oft in großer Zahl anzutreffen.
4. *A. flexuosa* Payk. Bei Darmstadt von Klghfr., bei Frankfurt von v. Heyden, bei Ortenberg von Dr. Bose, bei Ober-Lais von mir in Mehrzahl in einem Baumschwamm gefunden.

### Hypulus. Paykull.

1. *H. quercinus* Payk. Im Frankfurter Wald von v. Heyden II einige Stücke gefunden. Dr. Bose und ich haben den Käfer in Menge bei Lifsberg an einem faulen Eichenstumpfe gesammelt, in welchem sich auch die Larve vorfand.

### Melandrya. Fabricius.

1. *M. caraboides* Linn. Im ganzen Gebiete verbreitet, an manchen Orten nicht selten.

### Conopalpus. Gyllenhal.

1. *C. testaceus* Oliv. Bei Aschaffenburg von Dr. Doebner, bei Frankfurt v. Heyden, bei Ober-Lais von mir in einem faulen Stück Hainbuchenholz einige Stücke aufgefunden.

### Lagriariae.

#### Lagria. Fabricius.

1. *L. hirta* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

### Pedilidae.

#### Xylophilus. Latreille.

1. *X. pygmaeus* Degeer. Im ganzen Gebiete, aber nicht häufig.
2. *X. nigrinus* Germ. Von Klghfr. bei Darmstadt, von v. Heyden I bei Frankfurt sehr einzeln gesammelt.
3. *X. populneus* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. Nebel, bei Aschaffenburg von Dr. Doebner, bei Frankfurt v. Heyden I in Mehrzahl gefunden.

Scraptia. Latreille.

1. *S. fuscula* Müll. Im ganzen Gebiete verbreitet.

**Anthicidae.**

Notoxus. Geoffroy.

1. *N. monoceros* Linn. Im Süden des Gebietes nicht selten; in Oberhessen bei Ortenberg von Dr. **Bose** aufgefunden.

2. *N. trifasciatus* Rossi. Herr **v. Heyden** I fand einige Stücke bei Rüdesheim.

Anthicus. Paykull.

1. *A. humilis* Germ. Bei Creutznaeh, Nauheim, Wisselsheim, Salzhäusen auf Salzboden in Menge vorkommend.

2. *A. bimaculatus* Illig. Ein Exemplar von **v. Heyden** I bei Darmstadt aufgefunden.

3. *A. floralis* Fabr. Im ganzen Gebiete, im Süden häufiger.

4. *A. bifasciatus* Rossi. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von **v. Twardowski** einzeln gesammelt.

5. *A. antherinus* Linn. Durchs ganze Gebiet häufig.

6. *A. luteicornis* Schmidt. Von **Laubenheimer** bei Gießen aufgefunden.

7. *A. flavipes* Panz. Von **v. Heyden** I am Main- und Lahnufer nicht selten auf Kiesboden, auch von **Laubenheimer** bei Gießen gefunden.

**Pyrochroidae.**

Pyrochroa. Fabricius.

1. *P. coccinea* Linn. Im ganzen Gebiete häufig. Die Larve findet man nicht selten unter der Rinde abgestorbener Bäume.

2. *P. rubens* Fabr. Bei Darmstadt von **Reifsig**, auf dem Kuhkopfe bei Erfelden von Dr. **Nebel** und Advokat **Heyer** in Mehrzahl gesammelt.

3. *P. pectinicornis* Fabr. Auf dem Feldberge auf Himbeeren von **v. Heyden** I öfters gesammelt.

**Mordellonae.**

Tomoxia. Costa.

1. *T. biguttata* Gyll. Im ganzen Gebiete, nicht sehr häufig.

Mordella. Linné.

1. *M. maculosa* Naez. Bei Frankfurt ein Exemplar von Dr. **M. Schmidt** gefunden.

2. *M. fasciata* Fabr. Durchs ganze Gebiet nicht selten.
3. *M. villosa* Schrnk. Bei Babenhausen ein Stück von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** aufgefunden.
4. *M. aculeata* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

### Mordellistena. Costa.

1. *M. abdominalis* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und **Dr. Nebel**, bei Frankfurt von **v. Heyden** I, bei Ortenberg von **Dr. Bose** einzeln gesammelt.
2. *M. humeralis* Linn. *Var. flavescens* Mrsh. Nach **v. Heyden** bei Frankfurt selten vorkommend.
3. *M. axillaris* Gyll. Bei Darmstadt von **Klghfr.**, bei Ortenberg von **Dr. Bose** gesammelt.
4. *M. brunnea* Fabr. Im ganzen Gebiete verbreitet.
5. *M. lateralis* Oliv. Wie die Vorige.
6. *M. inaequalis* Muls. Bei Seligenstadt von mir, bei Frankfurt von **v. Heyden** I aufgefunden.
7. *M. grisea* Muls. Bei Darmstadt von **Höpfner**, bei Frankfurt, Mombach, Eberstadt von **v. Heyden** auf *Euphorbia* gesammelt.
8. *M. subtruncata* Muls. Zwei Exemplare von **v. Heyden** bei Frankfurt aufgefunden.
9. *M. pumila* Gyll. Ueberall im Gebiete sehr häufig.
10. *M. parvula* Gyll. Bei Frankfurt und Oberstein auf Malven von **v. Heyden** I einzeln gesammelt.

### Anaspis. Geoffroy.

1. *A. ruflabris* Gyll. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
2. *A. frontalis* Linn. Wie die Vorige, häufig.
3. *A. labiata* Costa. Bei Frankfurt von **v. Heyden** II ein Stück aufgefunden.
4. *A. Geoffroyi* Müll. Bei Seligenstadt von mir, bei Aschaffenburg von **Dr. Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden** gesammelt. Selten.
5. *A. ruficollis* Fabr. Im ganzen Gebiete vorkommend. Selten.
6. *A. thoracica* Linn. Wie die Vorige, weniger selten.
7. *A. flava* Linn. Wie die Vorige, an manchen Orten, z. B. bei Harxheim in Rheinhessen sehr häufig auf Blüten.
8. *A. maculata* Fourc. Bekannte Fundorte im Gebiete, wo der Käfer in großer Zahl auf blühenden Gesträuchen angetroffen wurde, sind: Auerbach (**Dr. Nebel**), Frankfurt (**Dr. Haag**, **Dr. M. Schmidt**), Harxheim in Rheinhessen (**Scriba**, **Hoyer**), Ortenberg (**Dr. Bose**).
9. *A. (Silaria) varians* Muls. Bei Soden und Oberstein nicht selten von **v. Heyden** I gesammelt.
10. *A. quadripustulata* Müll. Bei Seligenstadt auf blühendem Dill häufig, bei Frankfurt, Oberstein, Rüdesheim von **v. Heyden** I, bei Ortenberg von **Dr. Bose** gefunden.

Pentaria. Mulsant.

1. *P. badia* Rosenh. Von v. Heyden I in einigen Exemplaren bei Rüdesheim aufgefunden.

**Rhipiphoridae.**

Pelecotoma. Fischer.

1. *P. fennica* Payk. Von Dr. Doebner bei Aschaffenburg, von Dr. Bose bei Ortenberg, von Dr. Bauer bei Birstein (nach v. Heyden) aufgefunden. Sehr selten.

Emmenadia. Castelnau.

1. *E. bimaculata* Fabr. Der Käfer soll nach Herrn v. Heyden bei Speyer in Hummelnestern von Linz gefunden worden sein.

Rhipiphorus. Fabricius.

1. *R. paradoxus* Linn. Bei Darmstadt von Klgfr. und Advokat Heyer in je einem Exemplar aufgefunden. Ein von Schweikart bei Reichelsheim im Odenwald gefangenes Stück befindet sich in der Sammlung des Herrn v. Heyden und ein von Heynemann bei Hanau gefundenes in der Sammlung des Herrn Dr. Haag. Ein Stück fand C. Schneider zu Frankfurt auf der Isenburger Chaussee am 5. Oct. 1862 an einem Baum, und ein Stück wurde von Dr. Renner bei Friedberg gefunden.

**Stylopidae.**

Stylops. Kirby.

1. *S. Melittae* Kirby. Senator v. Heyden fing bei Lorsch mehrfach stylopisirte *Andraena*, aus welchen sich jedoch nur ♀ entwickelten.

Xenos. Rossi.

1. *X. vesparum* Rossi. Von v. Heyden aus *Polystes gallica*, im botanischen Garten zu Frankfurt gefangen, in beiden Geschlechtern lebend erzogen.

2. *X. Klugii* Saund. Von v. Heyden ein ♂ und ein ♀ aus *Odynerus auctus* erzogen.

3. *X. Latreillei* Heydn. Aus *Polystes gallica* von Frankfurt ein ♂ von v. Heyden erzogen. Das Thier ist so groß, wie *X. vesparum*, aber die Fühler haben Aehnlichkeit mit denen von *Stylops*.

**Meloidae.**

Meloë. Linné.

1. *M. proscarabaeus* Linn. Im ganzen Gebiete häufig.

2. *M. violaceus* Marsh. Wie der Vorige.
3. *M. autumnalis* Oliv. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt von **v. Heyden**, bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.
4. *M. limbatus* Fabr. Bei Worms von General **Klghfr.** gefunden. Ein bei Isenburg von Dr. **Grommers** gefundenes Stück befindet sich in der Sammlung des Herrn **v. Heyden**.
5. *M. decorus* Brandt et Er. Von Dr. **Nebel** bei Worms einige Stücke gesammelt.
6. *M. cicatricosus* Leach. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner** in Mehrzahl, bei Frankfurt von **v. Heyden** I in zwei Exemplaren aufgefunden.
7. *M. coriarius* Br. et Er. Bei Umstadt ein Exemplar von mir, bei Frankfurt zwei von **v. Heyden** I gefunden.
8. *M. variegatus* Donov. Im Süden des Gebietes nicht selten, im Norden desselben nur sehr einzeln (Friedberg, Nauheim) vorkommend.
9. *M. rugosus* Marsh. Bei Aschaffenburg von Dr. **Doebner**, bei Frankfurt und Budenheim a. Rhein von **v. Heyden** I, bei Friedberg von Dr. **Renner** einzeln gesammelt.
10. *M. scabriusculus* Br. et Er. Im ganzen Gebiete, aber im Süden häufiger.
11. *M. brevicollis* Panz. Allenthalben im Gebiete sehr häufig. Ich habe den Käfer auch auf der Herchenhainer Höhe angetroffen.

### Cerocoma. Geoffroy.

1. *C. Schaefferi* Linn. Durchs ganze Gebiet, jedoch im Süden desselben weniger selten.

### Lytta. Linné.

1. *L. vesicatoria* Linn. Ueberall im Gebiete, in manchen Jahren in großer Menge an Eschen und Rainweide.

### Sitaris. Latreille.

1. *S. muralis* Forst. Herr **v. Heyden** besitzt eine Anzahl Exemplare dieser Art, welche 1829 von **Vogt** bei Mannheim in einem Bienen-neste gefunden wurden.

## Oedemeridae.

### Asclera. Schmidt.

1. *A. sanguinicollis* Fabr. Im ganzen Gebiete, nicht häufig.
2. *A. coerulea* Linn. Wie die Vorige, häufig.

### Oedemera. Olivier.

1. *O. Podagrariae* Linn. Durchs ganze Gebiet vorkommend, an manchen Orten (Soden) häufig.

2. *O. flavescens* Linn. Bei Ortenberg von Dr. **Bose**, bei Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

3. *O. subulata* Oliv. = *marginata* Fabr. Von v. **Heyden** bei Frankfurt und Falkenstein im Taunus nicht selten gefunden.

4. *O. coerulea* Linn. Im ganzen Gebiete nicht selten.

5. *O. flavipes* Fabr. Bei Darmstadt von Dr. **Nebel**, in der Bergstrasse von mir, bei Frankfurt von v. **Heyden** aufgefunden.

6. *O. virescens* Linn. Im ganzen Gebiete, nicht selten.

7. *O. lurida* Marsh. Wie die Vorige, überall sehr häufig.

### Anoncodes. Schmidt.

1. *A. rufiventris* Scop. Bei Frankfurt zwei ♂ von v. **Heyden** I aufgefunden.

2. *A. ustulata* Fabr. Bei Darmstadt von **Klghfr.** und Dr. **Nebel**, bei Frankfurt von v. **Heyden** I, bei Friedberg von Hauptmann **Fuhr** einzeln gesammelt.

### Chrysanthia. Schmidt.

1. *C. viridissima* Linn. Im Süden des Gebietes sehr häufig.

2. *C. viridis* Illig. Bei Frankfurt von v. **Heyden**, bei Seligenstadt und Ober-Lais von mir einzeln gesammelt.

### Mycterus. Olivier.

1. *M. curculionoides* Illig. Bei Seligenstadt und Babenhausen nicht selten auf Spiräen von mir gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

---

## III.

### Mykologische Vegetationsbilder in Skizzen

von Herrn Prof. **Hermann Hoffmann** in Gießen.

Mit den nachfolgenden Schilderungen der herbstlichen Pilzflora einiger von mir in dieser Beziehung durchforschten Gegenden kann natürlich nicht beabsichtigt werden, die Pilzflora von einer oder der andern derselben irgend wie zu erschöpfen. Der Zweck derselben ist kein anderer, als ein mykologisches Charakterbild einer jeden derselben zu entwerfen, etwa wie der Reisende in fremden Ländern ein Vegetationsbild der Phanerogamenflora zu entwerfen pflegt, um den physiognomischen Typus und die Eigenthümlichkeit derselben in ihren grossen, allgemeinen Grundzügen anschaulich zu machen; wobei ihm freilich die Arbeit, wie dem Leser das Verständniß, wesentlich dadurch erleichtert wird, daß es sich um grosse, in die Augen fallende, oft in Massen auftretende, ja geradezu landschaft-

lich bestimmende Formen handelt, während die unscheinbaren Pilze erst gesucht sein wollen. In Betreff der Vertheilung der Schwämme sind wir in unserem eigenen Vaterlande noch ziemlich gerade so fremd, wie bezüglich der Blüthenpflanzen in Brasilien. Denn einige wenige Specialfloren von wirklichem Werthe abgerechnet, ist nur zerstreutes Material, wenn auch massenhaft, bis jetzt vorhanden. Ja kaum ist der Gesamtbestand unserer deutschen Pilzflora in seinen Hauptumrissen einigermaßen festgestellt, so wenig abgeschlossen jedoch, daß fast jeden Tag Neues gefunden wird. Wie weit sind wir in dieser Beziehung bezüglich der Pilzkunde noch von einem Werke wie **Koch's Synopsis** entfernt!

Es werden demnach in den folgenden Blättern nach einer kurzen orientirenden Darstellung des allgemeinen Vegetations- und Landschaftscharakters nur diejenigen Pilze, und in beschränkter Zahl, aufgeführt, welche für die betreffende Gegend entweder mehr oder weniger eigenthümlich, oder durch Häufigkeit für sie charakteristisch sind, wobei hier und da durch Vergleichen diese Besonderheiten ausdrücklich hervorgehoben und anschaulicher gemacht werden sollen. Die Verschiedenheit der Pilzfloren ist nämlich viel größer, als gewöhnlich angenommen wird; ja ich bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß sie in ihrer Mannigfaltigkeit und raschen Veränderlichkeit in keiner Weise der phanerogamischen Flora nachsteht. Mögen auch die Gesamtareale der einzelnen Species größer sein als bei Blüthenpflanzen; eine merkbare Veränderung in der Pilzflora zeigt sich beim Vorschreiten aus einer Gegend in eine andere durch die Mischung und relative Häufigkeit der Arten in geringer Entfernung schon sehr bestimmt ausgeprägt. Und zwar liegt dies einerseits in der Natur der herrschenden Vegetationsdecke, denn ein Buchwald begünstigt das Gedeihen von ganz anderen Pilzen, als ein Wald von Weißtannen. Dann aber auch und oft noch mehr drückt die Natur des unterliegenden Bodens und der Gebirgsart der Pilzflora einen eigenthümlichen Stempel auf, was, wie mir scheint, ganz mit Unrecht bisher oft bestritten, oft ganz übersehen worden ist. In gewissen Fällen ist es allerdings unverkennbar, daß dies in der durch eben jene geognostische Unterlage bedingten Eigenthümlichkeit der höheren Gewächse begründet ist, von deren verwesenden Trümmern oder auf deren frischen Leibern die Pilze vegetiren. In andern Fällen aber ist dies keineswegs der Fall; wie denn z. B. die *Leotia lubrica* P. und *Geoglossum viride* in den ausgedehnten Buchwäldungen um Gießen (auf Basalt und lehmig verwitternder Grauwacke) äußerst spärlich vorkommen, während dieselben in den Buchwäldungen um Niederbronn (Vogesen) und bei Herrenalb (Schwarzwald) auf Buntsandstein in den gleichartigen Wäldungen zahlreich sich finden. So ist das *Scleroderma vulgare* auf der Sandsteinformation des östlichen Odenwaldes sowie um Herrenalb, außerordentlich häufig, während dasselbe, bei sonst gleicher Beschaffenheit der Localitäten, in der Umgegend von Gießen, wo diese Gebirgsart fehlt, nur selten beobachtet wird. *Leotia atrovirens* und *Polyporus pes Caprae*, beide auf nackter Erde wachsend wie der vorige Pilz, sind in den Vogesen und um Herrenalb und die erstere auch auf

dem Syenitsande um Darmstadt hier und da beobachtet worden, während dieselben auf dem schweren Boden von Giessen niemals angetroffen wurden. *Fungorum diversis locis varietas magis vulgo e physica regionis indole quam e climate pendet*, sagt **Fries** (Nov. Act. soc. sc. Upsal. I, 1855, p. 21) mit Recht.

Mögen demnach die folgenden Mittheilungen einstweilen als ein Surrogat und Vorläufer wirklicher, ausgearbeiteter und vollständiger Pilzfloren angesehen werden, welche dem ferner Wohnenden ein ungefähres Bild zu verschaffen bezwecken; eine Absicht, welche, da eine eigentliche Flora in der Hauptsache einen ganz andern Zweck hat und vor Allem den Gesamtbestand darlegen soll, durch eine solche doch keineswegs immer erreicht werden würde, wohl aber mit ihr verbunden werden kann; wie dieß noch neuerlich durch **Milde** bezüglich der schlesischen Laubmoosflora (Bot. Ztg. 1861) und durch **von Heufler** bezüglich der Hypneen Tyrols (Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1860) in musterhafter Weise geschehen ist. Wer hätte nicht schon wenigstens auf Reisen in entferntere Gegenden die Verschiedenheit der Pilzflora im Vergleiche zu seiner Heimath in ihren auffallendsten Verhältnissen zu bemerken Gelegenheit gehabt? Hiervon aber gibt eine bloße floristische Aufzählung, welche zunächst nur ein systematischer Katalog ist, keine lebhafte Vorstellung.

Wenn aus den eigentlichen Floren, in pflanzengeographischer Hinsicht nämlich, zuletzt als Haupt- und Endresultat die Kenntniß des Gesamtareals einer oder der andern und zuletzt aller Pflanzenarten hervorgeht, sowie die Form seiner Begrenzung nach Nord, Süd, West, Ost, und deren physikalische Begründung mit Beziehung auf Elevation, ja selbst auf historische Verhältnisse und Einflüsse; so hat dagegen eine Sammlung solcher Vegetationsbilder, wie sie hier versucht werden, den Zweck, nicht die einzelnen Pflanzenarten bezüglich ihres Areals zu verfolgen, sondern die Eigenthümlichkeit einer Gegend in phytogeographischer Hinsicht im Vergleiche mit andern anschaulich zu machen. Wesentlich gehört hierzu auch, daß auf das Fehlen einer sonst verbreiteten Species ausdrücklich aufmerksam gemacht werde. Und wenn schon dieses „Fehlen“ in manchen Fällen nur von interimistischem Werthe sein sollte und zuletzt nur auf ein relatives Seltnessein hinauslaufen würde, so behält es auch dann noch seine Bedeutung und trägt wesentlich dazu bei, die Besonderheit einer Gegend deutlicher hervortreten zu lassen. Ueberhaupt scheint es, als wenn bei den bisherigen pflanzengeographischen Untersuchungen diese so wesentliche negative Seite viel zu wenig im Auge behalten worden wäre.

### I. Giessen.

Giessen liegt in einer weiten, flachen Thalmulde am Zusammenflusse der Wieseck mit der Lahn, 500' p. über dem Meere. Diese ganze Fläche ist theils mit ausgedehntem Wiesengrund (längs der Wieseck), theils mit Ackerfeld (längs der Lahn) bedeckt; ringsher ist der Horizont mit Hügeln umgeben, welche nach West und Süd größtentheils aus Grauwacke, nach Ost und Nord aus Basalt bestehen und eine nur geringe Höhe

erreichen (Schiffenberg 862'). Der höchste Berg, der Dünsberg, liegt nach Westen und schon in größerer Entfernung; er ist 1551' hoch und besteht aus Kieselschiefer. Fast alle diese Höhen sind mit Buchenhochwald bekleidet; nur auf der Ostseite, wo der basaltische Gebirgszug von einem Saume der Braunkohlenformation mit kiesigem, lettigem oder stellenweise auch sandigem Boden begrenzt wird, sind Kiefern-, zum Theil auch Fichtenwäldungen von ziemlicher Ausdehnung angepflanzt worden, welche, stellenweise auch mit Laubholz untermischt, in einzelnen Vorsprüngen bis auf  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{4}$  Stunde der Stadt sich nähern. Bestände von Eichen (*Quercus pedunculata*) kommen nur ganz vereinzelt vor. Gerade diese Wäldungen auf der Ost- und Nordseite sind besonders reich an Pilzen und in ihnen spiegelt sich in dieser Beziehung am besten der eigenthümliche Charakter der Gegend ab. In dem breiten Saume der Kiefernbestände ist namentlich die Häufigkeit des *Agaricus muscarius*, *polygrammus*, *galericulatus*, *lateritius*, *fascicularis*, der *Thelephora palmata*, *Clavaria rugosa*, hervorzuheben; während in der daran sich anschließenden Hügelregion mit Buchenwald, auf basaltischem Boden, *Agar. phalloides*, *laccatus*, *Hydnum repandum*, *Cantharellus cibarius*, *Clavaria flava* und *Boletus edulis* sich besonders bemerklich machen.

Als charakteristisch in mykologischer Beziehung müssen auch die zahlreichen Raine, Rasenwege und kleinen Triften hervorgehoben werden, welche theils am Rande dieser Wäldungen zerstreut sind, theils die Ackerflur durchziehen; auf ihnen treten *Agar. campester*, *virgineus*, *chlorophanus miniatulus*, *psittacinus*, *conicus*, mehrere *Geoglossa* und *Bovisten* zahlreich auf.

In den die ganze Stadt in breitem Gürtel umgebenden Obstgärten sind vorzugsweise häufig *Agar. melleus*, *velutipes*, *squarrosus*, *Hypoxylon vulgare* u. dgl. Auch *Coprinus micaceus* und *comatus* verdienen hier angemerkt zu werden. Für Holzschwämme ist die Gegend aus dem Grunde nicht günstig, weil im Walde alles morsche Holz als Leseholz weggeschafft wird, und, was die Hochstämme betrifft, beim Holzfällen sämtliche Stöcke und Wurzeln, wenigstens im Laubwalde, ausgegraben werden, so daß der Boden des Hochwaldes in der Regel rein wie eine Tenne ist. Auch die sorgfältig durchgeführte Entwässerung trägt dazu bei, den Waldboden in der für die Pilze günstigsten Zeit oft etwas zu trocken werden zu lassen.

Die ganze Pilzflora trägt, wie auch die Phanerogamenflora, im Allgemeinen das Gepräge des nach Osten anstoßenden Vogelsberges, eines ausgedehnten Basaltgebirges, welches in den östlich von Gießen liegenden Hügeln seine Grenze findet.

Es folgt nun eine kleine alphabetisch geordnete Uebersicht der am meisten in die Augen fallenden oder sonstwie charakteristischen größeren Pilze der Gegend von Gießen.

*Agaricus adiposus* Batsch \*) (*Pholiota*).

*A. aeruginosus* Curt. (*Stropharia*).

\*) Nomenclatur nach Rabenhorst, Handbuch 1844.

- A. butyraceus* Bull. (*Collyb.*).  
*A. campester* L. Häufig. Einmal an einer Mauer.  
*A. comatus* (*Coprinus*). Häufig.  
*A. conicus* (*Hygroph.*). Häufig.  
*A. deliciosus* (*Lactarius*). Ebenso.  
*A. eburneus* (*Hygroph.*).  
*A. epipterygius* Scop. (*Mycena*).  
*A. fascicularis* (*Hyphol.*). Häufig.  
*A. fuliginosus* (*Lactar.*).  
*A. galericulatus* Scop. (*Mycena*). Häufig.  
*A. geophyllus* Bull. (*Inocybe*). Häufig.  
*A. granulatus* (*Lepiota*) v. *ochracea*. Häufig.  
*A. Hypnorum* Batsch. (*Galera*). Häufig.  
*A. hypothejus* Fr. (*Hygroph.*).  
*A. laccatus* (*Clitocybe*). Häufig, roth und violett.  
*A. lateritius* Batsch. (*Hyphol.*). Häufig.  
*A. Mappa* Fr. Ep. (*Amanita*. — Krombh. t. 30, f. 7—10).  
*A. melleus* Vahl (*Armillaria*). Sehr gemein.  
*A. miniatus* Fr. (*Hygroph.*).  
*A. muscarius* L. (*Amanita*). Sehr häufig.  
*A. mutabilis* (*Pholiota*). Häufig.  
*A. nebularis* Batsch. (*Clitocybe*). Häufig.  
*A. nudus* Bull. (*Trichol.*).  
*A. oreades* (*Marasmius*). Häufig.  
*A. ovinus* Bull. (*Hygroph.*).  
*A. pantherinus* (*Amanita*).  
*A. phalloides* Fr. Ep. Häufig.  
*A. piperatus* (*Lactar.*). Häufig.  
*A. polygrammus* (*Mycena*). Häufig.  
*A. pratensis* P. (*Hygroph.*) var. 1) gelbröthlich, 2) unrein citronengelb; beide an getrennten Standorten, bis jetzt ohne beobachteten Uebergang.  
*A. procerus* (*Lepiota*).  
*A. psittacinus* Schff. (*Hygroph.*).  
*A. radicans* (*Collyb.*).  
*A. Rotula* (*Marasmius*).  
*A. rubescens* Fr. (*Amanita*). Häufig.  
*A. salignus* (*Pleurot.*) Item.  
*A. saponaceus* Fr. (*Trichol.*) c. v. *napipes* Krombh.  
*A. spadiceo-griseus* Schff. (*Psathyra*).  
*A. stypticus* (*Panus*). Häufig.  
*A. tenacellus* Fr. (*Collyb.*). Häufig unter Fichten.  
*A. terreus* Schff. (*Tricholoma*).  
*A. umbellifer* (*Omphalia*).  
*A. vaccinus* (*Trichol.*). Häufig.  
*A. variegatus* Scop. (*Trichol.*, zu *rutilans* Rbh.).

- A. velutipes* (Collyb.). Häufig.  
*A. virgineus* (Hygroph.). Sehr gemein.  
*Boletus edulis*.  
*B. granulatus*.  
*B. luteus*.  
*B. strobilaceus*. Selten.  
*B. submentosus*.  
*B. variegatus* Fr.  
*Bovista gigantea*.  
*B. nigrescens*.  
*B. plumbea*.  
*Calocera viscosa* Fr. Nicht häufig.  
*Cantharellus cibarius*. Gemein.  
*Clavaria fastigiata* L. (*pratensis* P.).  
*Cl. flava*. Nicht selten.  
*Cl. rugosa*. Häufig.  
*Cyathus striatus* Fr. Nicht selten.  
*C. Olla* P. (*laevis*).  
*Daedalea quercina*.  
*Gomphidius glutinosus*. Gemein.  
*Hydnum Auriscalpium*. Häufig.  
*H. imbricatum* L. Selten.  
*H. repandum*. Sehr häufig.  
*Hypoxyton vulgare*. Ebenso.  
*Lycoperdon caelatum*. Nicht selten; besonders die *var. pusilla*  
(Rostk. bei Sturm. III, 5; t. 4).  
*Lycoperdon constellatum*.  
*L. gemmatum*. Sehr häufig (*varr.*).  
*Lyc. pyriforme*.  
*Peziza abietina*.  
*P. hemisphaerica* Hoffm. Selten.  
*P. vesiculosa* Bull.  
*Polyporus Ribis*.  
*P. versicolor*. Sehr gemein.  
*Rhymovis involuta*. Ebenso.  
*Spathulea flavida*. Häufig.  
*Thelephora hirsuta*. Sehr gemein.  
*T. palmata*. Sehr häufig. Die *var. digitata* (Sow t. 156) selten.  
*T. purpurea*.

## II. Darmstadt.

Darmstadt liegt an der nordwestlichen, in Syenithügel auslaufenden Ecke der Bergstraße und des Odenwaldes, 450' ü. M., auf etwas geneigter, nach dem Rheine abfallender Fläche. Jene Hügel, welche kaum über 800' aufsteigen, sind durchweg mit grobkörnigem Syenitsande bedeckt und, zumal nach Süd, mit Buchenhochwald bekleidet; nach Ost und Nordost

flacht sich die Gegend ab, und der Buchwald, stellenweise mit wenigen Eichen untermischt, steht hier auf Rothtodtliegendem oder Augitporphyr, deren Oberfläche einen etwas schweren Boden, doch selten wirklich lettig, bildet. Die von diesen Waldungen halbseitig umschlossene Ackerflur, in deren Mitte Darmstadt gerade am Uebergange des Syenitbodens und des Todtliegenden (nebst Augitporphyr) in die ganz flache Region des Dünensandes liegt, ist nach Norden hin offen. Nach Nordwest, West und Süd aber schliessen ausgedehnte Kiefernwaldungen den Horizont ab, welche stellenweise bis auf wenige Minuten der Stadt sich nähern und in breiter Zone von mehr als einer Stunde Durchmesser durchaus auf genanntem Sandboden stehen.

*Sarothamnus vulgaris* und *Pteris aquilina*, auf dem schweren Boden Gießens seltene Erscheinungen, sind hier überall in größter Menge verbreitet; *Calluna*, *Vaccinium Myrtillus* treten allerwärts auf, und unter den Kiefern findet sich häufig die *Pyrola umbellata*, welche bei Gießen gänzlich fehlt. Häufig findet sich auch auf diesem etwas kalkreichen Sandboden *Eryngium campestre* und *Dianthus Carthusianorum*; ferner *Euphorbia Cyparissias* und *Gerardiana*.

In mykologischer Hinsicht ist nun der Unterschied in der Flora der Kiefernwaldungen von jener der Laubwaldungen hervorzuheben, doch ist derselbe nicht überall gleich bedeutend, was durch die Aehnlichkeit des Bodens — hier stellenweise Syenitsand oder -Grufs, dort Dünensand — wahrscheinlich von demselben Gebirge abgeflößt — begreiflich wird.

Für den Laubwald charakteristisch sind: *Clavaria flava*, *Botrytis*, *Agaricus Prunulus*, *Craterellus cornucopioides*, *Polyporus confluens*; während die Kiefernforste *Helvella esculenta*, *crispa*, *Hydnum ferrugineum*, *Geaster* und *Thelephora caryophyllea* bergen.

#### Uebersicht der Hauptformen:

|                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Agaricus aeruginosus</i> Curt. ( <i>Psalliota</i> ).                         | <i>A. Oreades</i> ( <i>Marasmius</i> ).              |
| <i>A. cristatus</i> Bolt. ( <i>Lepiota</i> ).                                   | <i>A. pascuus</i> P. ( <i>Nolanea</i> ).             |
| <i>A. cyathiformis</i> ( <i>Clitocybe</i> ).                                    | <i>A. picaceus</i> Bull. ( <i>Coprin.</i> ). Selten. |
| <i>A. deliciosus</i> ( <i>Lactarius</i> ).                                      | <i>A. procerus</i> ( <i>Lepiota</i> ). Häufig.       |
| <i>A. equester</i> ( <i>flavo-virens</i> P. ( <i>Trichol.</i> ).                | <i>A. Prunulus</i> ( <i>Clitopil.</i> ).             |
| <i>A. excoriatus</i> ( <i>Lepiota</i> ).                                        | <i>A. radicans</i> ( <i>Collyb.</i> ).               |
| <i>A. extensorius</i> Bull. ( <i>Coprinus</i> ).                                | <i>A. squarrosus</i> ( <i>Pholiota</i> ).            |
| <i>A. fascicularis</i> ( <i>Hypholoma</i> ).                                    | <i>A. stypticus</i> ( <i>Panus</i> ).                |
| <i>A. Hypnorum</i> Batsch. ( <i>Galera</i> ).                                   | <i>A. terreus</i> Fr. ( <i>Trichol.</i> ). Häufig.   |
| <i>A. laccatus</i> Scop. ( <i>Clitoc.</i> ) Besonders häufig die violette Form. | <i>A. torminosus</i> Schff. ( <i>Lactar.</i> ).      |
| <i>A. mastoideus</i> Fr. ( <i>Lepiota</i> ).                                    | <i>Boletus bovinus</i> .                             |
| <i>A. melleus</i> ( <i>Armill.</i> ).                                           | <i>B. edulis</i> .                                   |
| <i>A. muscarius</i> ( <i>Amanita</i> ).                                         | <i>B. granulatus</i> . Sehr häufig.                  |
| <i>A. nebularis</i> Batsch. ( <i>Clitoc.</i> ).                                 | <i>B. piperatus</i> .                                |
| <i>A. nudus</i> ( <i>Trichol.</i> ).                                            | <i>B. strobilaceus</i> . Fr. Selten.                 |
|                                                                                 | <i>B. variegatus</i> Fr.                             |

*Bovista gigantea*.  
*Calocera viscosa* Fr.  
*Cantharellus aurantiacus* Wulf.  
 Häufig.  
*C. cibarius* L.  
*C. lobatus* Fr. Torfmoor bei Pfungstadt.  
*Clavaria flava*.  
*C. Botrytis*.  
*C. cristata* P. (weifs).  
*Craterellus cornucopioides*. Häufig.  
*Cyathus Crucibulum* Hoffm.  
*C. Olla* P. (*laevis*).  
*Daedalea quercina*.  
*Geaster coliformis*! Karlshof  
 unter Weifsbuchengebüsch.  
*G. fimbriatus* Fr. Häufig.  
*G. fornicatus*. Selten.  
*G. mammosus*. Fr. Selten.  
*G. striatus* Fr. (Mich. t. 100, f. 2).  
*Gomphidius glutinosus*.  
*Helvella crispa* Fr. (*leucophaea*)  
 Häufig.  
*Hydnum Auriscalpium*.  
*H. ferrugineum* Fr.

*H. nigrum* Fr. Selten.  
*H. repandum*. Häufig.  
*Hypoxyylon vulgare*.  
*Irpex pendulus* Fr.  
*Lycoperdon gemmatum*. Häufig, auch  
 die *F. papillatum* Fr. (Schff. t.  
 184, f. 4).  
*L. pusillum*. Häufig.  
*Peziza Acetabulum* L.  
*P. hemisphaerica* Hoffm.  
*P. nigrella* P. Unter Fichten.  
*P. onotica* P. Selten.  
*P. tuberosa*.  
*Polyporus cristatus* Pers. Fr.  
*P. confluens*.  
*P. frondosus* Fr.  
*P. perennis* Lk. Fr. Häufig.  
*Scleroderma vulgare* Fr.  
*Sistotrema confluens* P.  
*Spathulea flavida* P.  
*Thelephora quercina* (*Corticium*).  
*T. caryophyllea*. Häufig.  
*T. hirsuta* W.  
*T. palmata* Fr.

Während nun die Pilzflora der Laubwaldungen um Darmstadt im Vergleiche zu der bei Gießen bei aller Verschiedenheit des Bodens wenig Unterschied in der Qualität, wenn auch in der relativen Häufigkeit der vorherrschenden Pilzformen, zeigt, so ist dagegen die Differenz der vorherrschenden Schwämme in den sandigen Kiefernwaldungen eine um so auffallendere. Sie findet ihre Erklärung theils und vorzüglich in der genannten Beschaffenheit des Bodens, wie sie bei Gießen nur ausnahmsweise und ganz beschränkt vorkommt; theils in dem Vorhandensein zahlreicher sehr alter Kiefernstämme, während in der Umgegend von Gießen diese meistens noch jung sind, und nur sehr wenige Bestände etwa 80 Jahre erreicht haben mögen.

So ist für den Sandboden von Darmstadt besonders charakteristisch die Häufigkeit von *Lycoperdon gemmatum* var. *papillatum* und von *L. pusillum*, welche, entsprechend der meist schweren Beschaffenheit des Bodens, bei Gießen nur ganz ausnahmsweise angetroffen werden. Dasselbe gilt von *Polyporus cristatus*; von Geastern ist bei Gießen nur einmal der *hygrometricus* und *fimbriatus* gefunden worden, während diese merkwürdigen Gewächse bei Darmstadt verhältnismässig nicht selten sind und in mehreren Formen vorkommen. Nicht beobachtet sind bis jetzt bei Gießen *Irpex pendulus* auf alten Kiefern), sowie die bei Darmstadt auf

dem Sandboden der Kiefernwälder vielfach verbreiteten : *Helvella crispa* f. *leucophaea* und *Hydnum candicans*. Dagegen hat die Flora von Gießen die oben genannten Rain- und Triftenpilze voraus, welche bei Darmstadt theils selten sind, theils ganz fehlen. Hervorgehoben zu werden verdient, daß *Ag. compester*, sonst gewöhnlich auf sonnigen Rasenplätzen vorkommend, in der Gegend von Darmstadt, wo solche Stellen in Folge des lockeren Sandbodens seltener sind, ganz gewöhnlich in den Waldungen sich findet.

### III. Herrenalb.

Herrenalb, im nördlichen Schwarzwalde württembergischen Antheils, halbwegs zwischen Wildbad und Baden-Baden, liegt in einer schönen, romantischen Gegend am Zusammenflusse mehrerer Seitenbäche in die Alb, 1135 p. Fuß ü. M., rings umgeben von hohen Bergen, welche sich etwas isolirt neben- und aneinander schieben. In östlicher und südöstlicher Richtung gehen diese in ausgedehnte Hochflächen über, von denen das benachbarte Hohloh in die Region der Krummholzkiefer (*Pinus Pumilio*) aufsteigt, 3268' hoch, also höher als der mit derselben Holzart bedeckte Kniebis (2560') ist und zu den höchsten Punkten des Schwarzwaldes gehört. Die Sohle der engen Thäler ist mit Rieselwiesen und spärlichem Ackerlande bekleidet, die Höhen sind überall mit Weifstannen-Hochwald bedeckt, welcher Baum nur untergeordnet von Rothtannen, Kiefern („Forchen“), Rothbuchen, Eichen („*Quercus sessiliflora*“ weitaus vorherrschend“, **Schütz**, Flora des Schwarzwaldes) und Weifsbuchen verdrängt wird. Das Gestein ist überwiegend Buntsandstein, stellenweise tritt auch Granit und Rothtoddlegendes auf, ohne jedoch auf die Pflanzendecke einen merklichen Einfluß zu äußern. Diese geognostischen Verhältnisse bedingen eine gewisse Aehnlichkeit der Flora mit jener des analog beschaffenen Waldgebirges im gegenüberliegenden Theile der niederen Vogesen (um Niederbronn), sowie mit dem hessischen Antheile des Odenwaldes, wenn auch mehr in der Qualität der Vorkommnisse, während die relative Häufigkeit der einzelnen Arten zum Theil sehr verschieden ist. In beiden letztgenannten Gebirgen ist Laubwald (meist Buchen, auch Eichen) durchaus vorherrschend; die Weifstanne, massenhaft in den oberen Vogesen, fehlt in Niederbronn und ist im Odenwald nur durch Einen Bestand (bei Wembach) vertreten. Ebenso kommt die Stechpalme (*Ilex Aquifolium*) im Odenwalde nur am Neckar vor (Hirschhorn, Neckarsteinach), sowie ich dieselbe auch in den tiefen Waldungen um Niederbronn nicht angetroffen habe; während dieselbe um Herrenalb äußerst verbreitet ist. *Prenanthes purpurea* dagegen, durch den Odenwald und die Bergstrasse fast überall vorkommend, fehlt auch bei Herrenalb nirgends. Beide, sowie *Digitalis purpurea* (letztere im Odenwald auf Buntsandstein überall, in der Bergstrasse auf Granit und Syenit selten; auch in den oberen Vogesen verbreitet), kommen um Herrenalb sowohl auf Buntsandstein, als auf Granit und auf Todtlegendem vor. *Pteris aquilina*, *Sarothamnus* und *Calluna vulgaris* sind dem nördlichen Schwarzwalde und dem Odenwalde gemeinsam; wäh-

rend *Vaccinium uliginosum* und *Vitis idaea*, im Schwarzwalde auf Hochpunkten äußerst verbreitet, im Odenwalde zwar vorkommen, aber nur ganz vereinzelt.

Das Unterholz besteht aus *Rhamnus Frangula* („Vogelbeere“ oder „Teufelsbeere“), *Sorbus aucuparia* („Geishecke“), *Sorbus Aria* („Mehlbaum“), *Genista pilosa* u. dgl. *Adenostyles albifrons*, auf der „Teufelsmühle“ (2809') einzeln von mir beobachtet, bildet eine weitere Verwandtschaft mit den hohen Vogesen.

Eine interessante Analogie mit den nördlichen Vogesen (Niederbronn) zeigt sich in dem Vorkommen einer rein gelben Form des überall verbreiteten *Melampyrum pratense*; doch ist die Blüthe weniger tief goldgelb gefärbt (übrigens ohne Roth), auch ist sie kleiner, als in den Vogesen, wo sie genau in der von **Treviranus** für Neustadt a. d. Haardt, also in der nördlichsten Fortsetzung dieses Gebirges mit analoger Gesteinsart, beobachteten Gestalt und Farbe sich vorfindet (vgl. bot. Ztg. 1860, S. 337). Im Odenwalde fehlen dagegen beide rein gelben Formen.

Kalkpflanzen kommen bei Herrenalb nicht vor. So findet sich *Sedum album* nur auf Mauern; es fehlen *Bupleurum falcatum*, *Asperula cynanchica*, *Coronilla varia*, *Dianthus carthusianorum*, *Prunella grandiflora*, sonst in der Rheingegend verbreitet. Merkwürdiger Weise fehlt auch, trotz dem Sandboden, *Euphorbia Cyprissias*, welche, wie *Mentha rotundifolia*, von der Rheinfläche her über Ettlingen nur eine kurze Strecke längs diesem Seitenthale (der Alb) aufwärts gehen; eine Eigenthümlichkeit, welche sich bezüglich der letzteren Pflanze, soweit meine Beobachtungen reichen, durch das ganze mittlere Rheingebiet in völlig gleicher Weise wiederholt und wohl eine eingehende Untersuchung verdiente.

Was die Pilzflora um Herrenalb besonders begünstigt, ist theils die unberührte, wilde Beschaffenheit der feuchten, düsteren und ausgedehnten Waldungen, die Häufigkeit der Schluchten, namentlich aber die besondere Art der Waldbenutzung. Es werden nämlich die Stämme der Weißstanne, welche auf der Murg, der Eiach und anderen Flüßchen fortgeschafft, oder zu der schwunghaft betriebenen Köhlerei verwendet werden, stets in einer Höhe von 4 bis 5 Fufs über dem Boden abgehauen; der zurückbleibende Stumpf ist der beliebigen Privatbenutzung der Ortseinwohner überlassen. Da nun die Bevölkerung sehr dünn ist, so fällt bei weitem der größte Theil dieser Stümpfe der Verwesung anheim und bedeckt sich bald mit einem dichten Filze von Moosen, worunter *Hypnum undulatum*, zahlreichen Arten von Cladonien, *Biatora icmadophila* und holzbewohnenden Pilzen, unter welchen namentlich *Agaricus lignatilis*, *Hydnum gelatinosum* und *Calocera viscosa* die Aufmerksamkeit auf sich ziehen; während am Fusse dichte Büsche von Farnen (*Blechnum Spicant*, *Aspidium Filix mas* und *femina*), *Oxalis Acetosella*, sowie stellenweise *Lycopodium clavatum* („Bärenklawe“) sich ansiedeln. Das Ueberwallungsphänomen sieht man häufig an diesen Strünken, während Aeste und Zweige der Hochstämme sehr gewöhnlich zahlreiche knollenförmige Anschwellungen bis zu 5 Zoll Länge und 3 Zoll Dicke zeigen, welche nicht selten mit der Bildung von Hexen-

besen verbunden sind und wahrscheinlich von Insectenverletzungen her-  
rühren.

Die von mir im September um Herrenalb beobachteten größeren Pilze sind nun folgende. Ich bitte damit zu vergleichen, was ich bezüglich der vorherrschenden Pilzformen im oberen, südlich von hier gelegenen Theile des Schwarzwaldes früher in der botan. Zeitung (1853, Nr. 9 und 10) mitgetheilt habe.

- |                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Agaricus alliaceus</i> Jacq. ( <i>Marasmius</i><br>Fries <i>Epicrisis</i> ).         | <i>B. variegatus</i> Fr.                                                                                                                        |
| <i>A. caliginosus</i> Jungh. ( <i>Panaeolus</i> ).                                      | <i>Cantharellus cibarius</i> , „Pffifferling,<br>Rehling“.                                                                                      |
| <i>A. campester</i> L., selten, bei Moos-<br>bronn.                                     | <i>Cordyceps ophioglossoides</i> auf <i>Ela-</i><br><i>phomyces granulatus</i> am Ostab-<br>hange des Mauzensteins, auch<br>sonst stellenweise. |
| <i>A. cinnamomeus</i> L. <i>conformis</i> (Cortin.).                                    | <i>Daedalea quercina</i> .                                                                                                                      |
| <i>A. deliciosus</i> ( <i>Lactar.</i> ), einzeln.                                       | <i>Dacrymyces stillatus</i> Nr. (Weißstannen).                                                                                                  |
| <i>A. flavidus</i> Schaeff. ( <i>Derm.</i> ), auf<br>Weißstannen.                       | <i>Elaphomyces granulatus</i> .                                                                                                                 |
| <i>A. galericulatus</i> Scop. ( <i>Mycena</i> ).<br>Ebenso.                             | <i>Fistulina hepatica</i> .                                                                                                                     |
| <i>A. laccatus</i> ( <i>Clitoc.</i> ); fuchsroth; über-<br>all häufig, seltener violet. | <i>Geoglossum viride</i> , Buchwald, selten.                                                                                                    |
| <i>A. lateritius</i> ( <i>Hyphol.</i> ).                                                | <i>Hydnum gelatinosum</i> Scop., auf<br>Weißstannen, am Wege nach<br>der Teufelsmühle.                                                          |
| <i>A. lignatilis</i> Fr. ( <i>Pleur.</i> ), an Weiß-<br>stannen.                        | <i>Hydnum repandum</i> , wenig häufig.                                                                                                          |
| <i>A. muscarius</i> ( <i>Aman.</i> ), wenig häufig.                                     | <i>Lenzites variegata</i> Fr. häufig.                                                                                                           |
| <i>A. mutabilis</i> ( <i>Derm.</i> ), auf Weißstannen.                                  | <i>Leotia atro-virens</i> P.                                                                                                                    |
| <i>A. pantherinus</i> ( <i>Aman.</i> ).                                                 | <i>Leotia lubrica</i> , selten.                                                                                                                 |
| <i>A. pascuus</i> P. ( <i>Nolan.</i> ). Auf der<br>Schirsighalde.                       | <i>Lycoperdon gemmatum</i> , selten.                                                                                                            |
| <i>A. phalloides</i> Rbh. ( <i>Aman.</i> ).                                             | <i>Peziza aurantia</i> Oeder, auf Sandboden,<br>auch an Eichenstämmen nahe<br>der Erde.                                                         |
| <i>A. piperatus</i> ( <i>Lact.</i> ), einzeln.                                          | <i>Phallus impudicus</i> ( <i>non vidi</i> , nach<br>fremden Angaben, „Hirsch-<br>brunft“).                                                     |
| <i>A. pratensis</i> P. ( <i>Hygr.</i> ), fleischfarb-<br>ledergelb.                     | <i>Polyporus adustus</i> Fr.                                                                                                                    |
| <i>A. radicans</i> ( <i>Collyb.</i> ).                                                  | <i>Polyporus biennis</i> Bull. ( <i>teste</i><br>Fries).                                                                                        |
| <i>A. rubescens</i> ( <i>Aman.</i> ).                                                   | <i>P. perennis</i> Fr.                                                                                                                          |
| <i>A. stypticus</i> ( <i>Panus</i> ), auf Weißstannen.                                  | <i>P. pes Caprac</i> P. Auf Sandboden,<br>einzeln.                                                                                              |
| <i>A. variegatus</i> Scop. ( <i>Trichol.</i> ).                                         | <i>P. picipes</i> Pers. (ic. pict. t. 4).                                                                                                       |
| <i>Boletus bovinus</i> L., häufig.                                                      | <i>P. versicolor</i> Fr., häufig.                                                                                                               |
| <i>B. edulis</i> .                                                                      | <i>P. zonatus</i> Fr., auf Weißstannen.                                                                                                         |
| <i>B. elegans</i> Fr. (Grev. I, 183).                                                   | <i>Pyronema marianum</i> Car., häufig;<br>die entwickelte <i>Peziza ompha-</i><br><i>lodes</i> nicht bemerkt.                                   |
| <i>B. luridus</i> Schff.                                                                |                                                                                                                                                 |
| <i>B. parasiticus</i> auf <i>Scleroderma</i><br><i>vulgare</i> .                        |                                                                                                                                                 |
| <i>B. scaber</i> ( <i>aurantiacus</i> ).                                                |                                                                                                                                                 |
| <i>B. strobilaceus</i> Scop. (Pers. myc. e,<br>t. 19).                                  |                                                                                                                                                 |

*Rhymoris involuta*; sehr häufig.

*Rhytisma acerinum*.

*Russula integra*.

*Scleroderma vulgare*, überall sehr verbreitet; selten die *v. citrina*.

*Sepedonium mycophilum*.

*Sphaeriadeusta* (*Hypoxyylon ustulatum*).

*Thelephora terrestris* Ehrh.

*Trametes gibbosa* Fr., an Eichen.

*Tremella mesenterica* Retz.

Im Vergleiche zu der Flora des oberen Schwarzwaldes fällt auf, daß die *Lenzites sepiaria* zu fehlen scheint, während dieselbe dort, wenigstens in der Region der Rothtannen, äußerst verbreitet ist. Bei einer Vergleichung analoger Localitäten in der Flora von Gießen und Darmstadt macht sich das Fehlen der *Thelephora palmata*, in Kiefernwaldungen an letztgenannten Orten ungemein häufig, bemerkbar, was mit dem beschränkten Vorkommen dieses Baumes zusammenhängen dürfte. Dasselbe gilt von *Clavaria rugosa*, sowie bezüglich der Buchwaldungen von *Clavaria flava* und *pistillaris*.

In dem auf der andern Rheinseite gerade gegenüberliegenden Theile der Vogesen (um Niederbronn) findet sich, bei fast gleicher geognostischer Beschaffenheit der Gegend (vorherrschend Buntsandstein), wie gesagt nur Buchen- und Eichenwald statt der Weifstanne. Demgemäß beobachtet man hier häufiger die *Leotia lubrica* und *Geoglossum viride*, während die oben aufgeführten interessanten Holzschwämme gänzlich zu fehlen scheinen (*Hydnum gelatinosum*, *Lenzites variegata*, *Agar. lignatilis*); auch *Lenzites sepiaria* habe ich hier nicht bemerkt, während *Polyporus pes Caprae*, auch in den oberen Vogesen vorkommend (*Mougeot*), beiden Orten gemeinsam ist. *Cortinarius sanguineus*, auf dem Sandsteingebirge um Niederbronn sowie im östlichen Odenwalde sehr häufig, habe ich bei Herrenalb nicht angetroffen.

---

### III.

## Parerga botanica.

Von Herrn Prof. Hermann Hoffmann in Gießen.

---

#### 1.

### Ueber die Wirkung des Kochens auf Pflanzensamen.

Es ist eine oft wiederholte und sehr verbreitete Behauptung, daß gewisse Sämereien, wie die der Lärchen, mancher Palmen, jene der Brombeeren und Himbeeren unbeschadet das Sieden im Wasser ertragen sollen, ja daß bei einigen derselben die Keimfähigkeit dadurch wesentlich erhöht werde. Um diese Angaben einer Prüfung zu unterwerfen, schien mir der Same der beiden letztgenannten Pflanzen besonders geeignet. Da ich durch frühere Versuche (Jahrb. f. wiss. Botanik II, 1860, S. 326) den Nachweis

geliefert hatte, daß gewisse Pilzsporen im trockenen Zustande eine Temperatur weit über der Siedehitze des Wassers ohne Schaden ertragen, während dieselben im feuchten oder nassen Zustande schon weit unter dem Siedepunkte ihre Keimkraft einbüßen; so schien es nicht unmöglich, daß bei den Rubus-Arten etwas Ähnliches vorkommen könne; es schien denkbar, daß durch die dicke, feste Hülle des holzigen Steines mit seinen lufthaltigen Zellen aus Holzsubstanz, dem Wasser die unmittelbare Berührung des Samens verwehrt würde, so daß derselbe, scheinbar rings umgeben von Wasser, factisch in einem je nach seinem Alter mehr oder weniger trockenen Zustande, durch den isolirenden Holzpanzer geschützt, sich befände. Bei der Himbeere besteht der Stein aus 2 Straten von Zellen, welche überall sehr enge Lumina und sehr dicke Wände haben. Läßt man Wasser vom Rande des Deckgläschens her eintreten, unter welchen ein trockener, feiner Abschnitt eines solchen Steines sich befindet, so sieht man stets eine große Menge kleinerer und größerer Luftbläschen austreten; die Transparenz wird dabei bedeutend erhöht, was auf einen sehr trockenen Zustand hinweist. Auf diese Weise zeigt sich, daß die Zellen der äußeren Schicht, weniger deutlich jene der inneren, lufthaltig sind. — Die Samen enthalten viel Oel, durch Jodtinctur wird nichts blau gefärbt.

Es wurden daher im Juni 1862 65 unversehrte Steine (mit Samen) der Brombeere — vom Sommer 1861 her trocken aufbewahrt — in nahezu siedend heißes Wasser gebracht, danach 2 Stunden hindurch das Wasser im Sieden erhalten und dann langsam erkalten lassen. Unmittelbar darauf wurden dieselben in ausgekochte Erde gesät. Bis zum August 1864 war keine einzige Pflanze gekeimt.

Andere 60 Stück Brombeersteine wurden direct angeschnitten, daß das Wasser durch die verletzte Steinschale unmittelbar den Samen berühren konnte. Begreiflicher Weise fand hier bei gleicher Behandlung wie im vorigen Falle ebensowenig eine Keimung statt.

Himbeeren. 7 Steine, unversehrt; vom Sommer 1861 her trocken aufbewahrt. Behandlung wie oben. Keine Keimung. — 7 angeschnittene Steine, wie oben bei der Brombeere behandelt, brachten ebensowenig eine Pflanze hervor.

Im Jahre 1863 wurden dieselben Versuche mit einer größeren Zahl von Samen wiederholt, und zwar mit frischen; ferner ein Gegenversuch hinzugefügt, um zu constatiren, ob die angewendeten Samen überhaupt keimfähig waren.

Diesmal wurden die Früchte der Himbeere gegen Ende Juli gesammelt, einige Tage durch in Wasser gelegt, alsdann das Fleisch abgerieben und die Steine getrocknet. Am 4. August wurden

a) 60 Stück davon in kaltes Wasser gebracht und dies weiterhin eine Stunde lang im Sieden erhalten; die folgenden Tage in die Erde gebracht. — Zu Anfang des August 1864 war kein einziger Same gekeimt.

b) Andere 60 Stück Steine wurden, wie oben, etwas angeschnitten, und so der Same selbst an einer kleinen Stelle bloßgelegt. Im Uebrigen

die Behandlung wie bei a), auch hier keine Keimung. Alle Samen bei a) und b) lagen nach dem Sieden auf dem Boden des Gefäßes.

c) Andere 60 Stück Steine wurden ohne vorheriges Kochen in ausgekochte Erde gesät. Ende Juli 1864 zeigte sich, daß ein Sechstel der Pflanzen gekeimt und kräftig aufgegangen war.

Diese Ergebnisse sind der Eingangs erwähnten Ansicht sehr ungünstig und machen es wünschenswerth, daß bei passender Gelegenheit auch bezüglich der anderen, namentlich stärkereichen Sämereien die Frage durch den Versuch entschieden werde.

---

## 2.

### Ueber das s. g. Erfrieren der Pflanzen bei Temperaturen über 0°.

Nachdem durch **Sachs** (Bot. Zeitung 1860, S. 123 ff.) nachgewiesen worden, daß es mit diesem angeblichen Erfrieren nichts ist, daß vielmehr das Absterben von Pflanzen aus warmen Gegenden bei niederen Temperaturgraden nur auf einem Verwelken der Blätter in Folge der nachlassenden Wurzelthätigkeit durch gestörte Diffusion beruht\*), können die nachfolgenden, zufällig liegen gebliebenen Beobachtungen nur noch in so ferne einiges Interesse für sich in Anspruch nehmen, daß sie an perennirenden, rein tropischen Pflanzen und zum Theil an Holzgewächsen angestellt wurden, während **Sachs** für seine Versuche den Kürbis, Tabak, die Bohne, also zarte Kräuter benutzte, welche unter gewöhnlichen Verhältnissen auch bei uns gedeihen. Im Uebrigen zeigen die Ergebnisse nichts, was den bei jenen Pflanzen gewonnenen Resultaten widerspräche.

Die Versuche wurden in der Weise ausgeführt, daß eine Anzahl tropischer Pflanzen, welche man gewöhnlich im warmen Raume (*Caldarium*) der Gewächshäuser bei durchschnittlich 12 Grad R. zu überwintern pflegt, mit dem Beginne des Winters in den kalten Raum (*Frigidarium*) gebracht wurden, wo sie zwar frostfrei bleiben, aber doch einer durchschnittlichen Temperatur von nur 5 bis 7° ausgesetzt sind.

Bei der ersten Versuchsreihe (vom 17. December 1857 an) fand diese Uebertragung in den kalten Raum statt, nachdem die Pflanzen bereits mehrere Wochen im geheizten Raume gestanden hatten; bei der zweiten Versuchsreihe (vom 10. Novbr. 1858) wurden die Pflanzen zu der Zeit, als das regelmäßige Heizen der Gewächshäuser in Gießen begann, sofort in das *Frigidarium* gebracht, ohne daß diese Abweichung in der Behandlung irgend eine merkbare Verschiedenheit in den Resultaten ergeben hätte.

#### Erster Winter.

*Amomum Cardamomum* L. 4 Heimath: Molucken. — Ende Januar befand sich die Pflanze noch ziemlich gut; am 22. Febr. waren die

---

\*) Vgl. Schumacher, Diffusion, S. 64, 220, 225.

Blätter hellgrün in's Weißliche verfärbt und offenbar leidend. Am 1. Juli fand sich, daß die Pflanze nicht wieder ausschlug; die alten Blätter waren abgestorben.

*Begonia maculata* Radd. — ♀ Brasilien. — Am 23. Januar waren die Blätter abgewelkt und verdorrt, die meisten abgefallen; die noch sitzenden hatten große schwarze Flecken. — Am 22. Febr. war die Pflanze ganz entblättert; wenige Tage später war es unzweifelhaft, daß sie abgestorben war, was auch das Unterbleiben eines neuen Ausschlagens im April bestätigte.

*Chloranthus elatior* G. Don. — ♀ India. — Am 23. Januar zeigte sich die Pflanze etwas leidend, indem einige Blätter große schwarze Flecken hatten; die Mehrzahl derselben war aber noch frisch grün. Aehnlich war das Aussehen gegen Ende des Februar. Anfangs Juli war die Pflanze grün, frisch und stark belaubt.

*Dorstenia fruticulosa* Schott. — ♀ Brasilien. — Am 23. Januar befand sich die Pflanze noch ziemlich wohl; am 22. Februar aber waren die Blätter verwelkt, mit Schimmel bedeckt. Anfangs Juli zeigte sich, daß die Pflanze nicht wieder ausschlug.

*Mimosa sensitiva* L. — ♀ Brasilien. — Am 23. Januar waren bereits alle Blätter abgewelkt und verdorrt; am 22. Februar war die Pflanze ganz entblättert. Mitte April ergab sich, daß sie todt war.

*Passiflora minima*. — ♀ Amer. calid. — Am 23. Januar waren die Blätter zwar noch grün, aber trauernd; am 22. Februar sämmtlich verwelkt. Wenige Tage darauf war die Pflanze gänzlich abgestorben.

*Peperomia incana* Dtr. — ♀ Brasilien. — Am 23. Januar waren alle Blätter abgewelkt und verdorrt, zum Theil auch verfärbt, schwarzfleckig. Am 22. Februar war die Pflanze entblättert, bald darauf völlig todt.

#### Zweiter Winter.

*Carica microcarpa* Jcq. — ♀ Amer. merid. —  $4\frac{1}{2}$  Fufs hohe Pflanze. In's Frigidarium am 10. November 1858. Am 26. November waren die Blätter bereits verschrumpft; am 19. Januar 1859 die stärkeren Zweige selbst morsch-faul, feucht. Am 25. Febr. waren alle Blätter abgefallen, Ende März zeigte sich, daß die ganze Pflanze todt und selbst der  $2\frac{1}{2}$  Zoll dicke Stamm morsch war.

*Chloranthus elatior* G. Don. — ♀ India. — Dieselbe Pflanze, welche vorigen Winter zum Versuche gedient hatte; 5 Fufs hoch, sehr kräftig. Am 25. Februar war dieselbe noch grün und frisch, ebenso Ende März, hatte also auch den zweiten Winter bei kühler Temperatur ohne allen Nachtheil überstanden.

*Lantana Sellowiana* Lk. — ♀ Brasilien. — 4 Fufs hohe Pflanze. Am 25. Februar zeigte sich, daß alle Blätter abgefallen waren; die Pflanze ging zu Grunde.

*Schaueria calicotricha* Ns. — ♀ Brasilien. — 4 Fufs hohe Pflanze. Am 19. Januar waren die Blätter sämmtlich (noch grün) vertrocknet,

verwelkt; am 25. Februar stand die Pflanze blattlos, der Stamm aber war noch grün und lebendig, ebenso Ende März.

*Urtica bicolor*. —  $\frac{1}{2}$  India orient. Pflanze  $2\frac{1}{2}$  Fufs hoch. — Am 25. Februar waren bereits alle Blätter verloren; am 24. März zeigte sich die Pflanze bis auf den Boden abgestorben, hatte aber neuen, reichlichen Wurzelausschlag gebildet, dessen Blätter bereits entfaltet waren.

Es mag hinzugefügt werden, dafs beide Winter im Freien ziemlich ungleich waren; der Winter (Decbr., Januar, Februar) hat in Giefsen im Durchschnitt eine Temperatur von  $-0,38^{\circ}$ . Im Winter  $18^{57}/_{59}$  betrug dieselbe  $-1,16^{\circ}$ ; im Winter  $18^{58}/_{59}$   $+1,26$ .

Was das geschilderte Absterben der Pflanzen unter den erwähnten Verhältnissen betrifft, so zeigt sich nirgends eine Aehnlichkeit mit dem Processe des Absterbens in Folge des eigentlichen Erfrierens bei einigen Graden unter Null \*). Der Tod beginnt stets an den Blättern, und zwar ganz allmählich — nicht wie dort plötzlich — aufzutreten, die charakteristische Verfärbung der Blätter und zarten Zweige in's Braunschwarze mit nachfolgendem raschem Austrocknen fehlt hier, dagegen geht die Erscheinung unter der Form des ganz gewöhnlichen Abwelkens vor sich, wobei dieselben allmählichen Gestaltveränderungen und öfter (nicht immer) auch Farbveränderungen stattfinden, wie bei einem jeden inmitten der vollsten Vegetation abgeschnittenen belaubten Zweige.

Im Uebrigen zeigen auch obige Versuche wieder, dafs das übliche Schliesen von dem Vaterlande einer Pflanze auf deren zweckmäfsigste Ueberwinterungsweise in den warmen oder kalten Abtheilungen unserer Gewächshäuser durchaus ungerechtfertigt ist, dafs vielmehr in jedem einzelnen Falle durch den Versuch entschieden werden mufs, ob dieselbe das Kalthaus erträgt, oder aber die weit kostspieligeren Ansprüche auf eine Beherbergung im Warmhause macht. Nach dem blofsen Ansehen, der Rigidität oder dem anscheinend zarten Bau des Gewächses kann man hier gerade so wenig schliesen, als bei unseren einheimischen Pflanzen, wo unter den zärtesten oder saftreichsten, sowie unter den auffallend derb gebauten eine gleich grofse Zahl vorkommt, welche den harten Frost ertragen, als solche, welche davon getödtet werden. Ich erinnere nur an *Ilex* und *Vinca*, *Stellaria media*, *Specularia Speculum*, *Linaria Cymbalaria*, *Saxifraga caespitosa* u. s. w. Es ist unzweifelhaft, dafs ein nicht unbedeutender Theil unserer dormaligen Warmhauspflanzen ebensogut im Frigidarium überwintert werden kann; wie man denn auch schon hier und da beginnt, die seither so sehr verzärtelten tropischen Orchideen bei kühleren Temperaturen zu conserviren. Es hat sich oben gezeigt, dafs *Chloranthus elatior* im Kalthause ganz vortrefflich sich erhielt; von *Urtica bicolor* gilt in minderem Grade dasselbe; bei *Schaueria* blieb wenigstens der Stamm lebendig.

---

\*) S. meine Pflanzenklimatologie, S. 312 ff.

## IV.

### Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamenflora des Großherzogthums Hessen und der angrenzenden Gebiete.

Vgl. zehnten Bericht, S. 61 u. ff.

---

## V.

### Pilze,

beobachtet vom Herrn Grafen **Friedrich zu Solms-Laubach**.

Das folgende Verzeichniss bildet die Fortsetzung des im letzten Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde gedruckten Verzeichnisses der von mir in dem Vereinsgebiet und hauptsächlich in der Laubacher Gegend gefundenen Pilze. Ich weifs, dafs dasselbe auf keinerlei Vollständigkeit Anspruch machen kann, da es in der Natur der Sache liegt, dafs die ungeheure Mannigfaltigkeit der Pilzvegetation einer Gegend nicht in einem kurzen Zeitraume gründlich durchforscht werden kann. Andernthails aber bietet das Feld so grofse Schwierigkeiten dar, dafs die Bestimmung oft auf die gröfsten Hindernisse stöfst. Zweifelhafte Sachen führe ich nicht gerne auf, und wenn andererseits manche selbst häufige Arten noch nicht aufgezählt sind, so ist dies eben ein Fehler, den ich in späteren Fortsetzungen dieses Verzeichnisses zu verbessern gedenke, da ich die Absicht habe, periodisch wiederkehrend meine Erfahrungen immer wieder mitzutheilen.

Wo bei den Pilzen kein Autor angegeben ist, sind die Benennungen jedesmal aus **Rabenhorst's** deutscher Kryptogamenflora entnommen.

*Uredo appendiculata* Pers. Auf Bohnenblättern. Schloßgarten bei Laubach. Sept. Auf *Ervum Lens*. Bei Laubach.

*U. muricella* Wallr. Auf Blättern von *Anthriscus silvestris*. Bei Laubach. Sept.

*U. Polygonorum* DC. Auf *Polygonum*-Blättern auf Aeckern bei Laubach. Sept.

*Accidium Cichoracearum*. Auf *Tragopogon* in den Obbornhofer Wiesen. Mai.

*A. Euphorbiae* Pers. Auf *Euphorbia Cyparissias*. Bei Lisberg, Ortenberg. Mai. Die Mutterpflanze wächst bei Laubach nicht.

*A. Valerianacearum* DC. Auf *Valeriana dioica*. Auf der obersten Heegbrücke bei Laubach.

*Puccinia arundinacea* Hedw. fil. Auf *Phragmites communis*. Bei Laubach. Sept.

*P. Bardanae* Corda. Auf Blättern von *Lappu major*. Schloßgarten in Laubach. Sept.

*P. Discoidearum* Link. Im Wickstätter Wald bei Assenheim auf *Pyrethrum corymbosum*. Juli.

*Podisoma fuscum* Dub. Auf *Juniperus Sabina*. Im Gederner Schlossgarten. Mai.

*P. Juniperi communis* Fr. Auf *Juniperus communis*. Im Gieser Wald. April.

*Depazea hederacola* Fries. Auf Blättern von *Hedera Helix*. Schlossgarten in Laubach.

*Hysterium pulicare*. Auf alter Birnbaumrinde bei Laubach.

*H. Rubi*. Auf dünnen Aesten von *Rubus fruticosus*. Bei Einartshausen im Walde. Oct.

*Rhytisma acerinum* Fries. Auf lebenden Ahornblättern überall bei Laubach. Sept.

*Polystigma rubrum* DC. Auf Blättern von *Prunus domestica* und *spinosa* um Laubach häufig. Sept.

*P. typhinum* DC. An Grashalmen auf Wiesen bei Laubach. Juli.

*Sphaeria Aquila* Fries. Auf abgestorbenen Aesten. Oberwald. Thiergarten bei Laubach. Sept.

*S. cohaerens* Pers. An Buchenzweigen und Strünken in den Laubacher Waldungen. Dec.

*S. concentrica* Bolt. An dünnen Buchenprügeln. Am Bürgelweg bei Laubach. Oct.

*S. deusta* Hoffm. Am Grunde alter morscher Stämme sehr häufig in den Laubacher Waldungen.

*S. Doliolum* Pers. An *Angelica*-Stengeln im Oberwald. Sept.

*S. Graminis* Pers. An Grasblättern um Laubach häufig. Besonders im Wald. Herbst.

*S. Granatum*. (*Cosmospora coccinea* Rbh. Fg. eur.) Auf alten Polyporen. Laubacher Waldungen. Herbst.

*S. hispida* Tode. Auf dürrer Holz. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*S. Laburni* Pers. Auf *Cytisus Laburnum*. Ortenberger Schlossgarten. Laubacher Schlossgarten.

*S. maura* Fries. (*S. miliaria*. Fr. u. Kze.) An Hainbuchenholz im Braunfelser Saupark.

*S. nummularia* DC. Auf Buchenzweigen. Kirchberg bei Laubach. Auerberg bei Schotten. Oct. An mehreren anderen Orten.

*S. scabrosa*. Am Wurzelende abgestorbener junger Buchen aus der Rinde hervorbrechend. Ramsberg, Thiergarten u. a. O. Laubach.

*S. spermoides* Hoffm. Auf altem Buchenholz. Thiergarten bei Laubach. Sept.

*S. Stigma*. Eine der gemeinsten *Sphaerien* bei Laubach, gewöhnlich auf Buchenholz, aber auch auf Eichen und Birkenzweigen von mir gefunden.

*S. verrucaeformis* Ehrh. An dünnen Schlehdornen. An der Helle bei Laubach.

*Hypoxyton carpophilum* Link. Auf Buchenperikarprien im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*H. vulgare* Link. An Bäumen und faulem Holz in den Laubacher Waldungen gemein.

*Sclerotium Pustula* DC. Auf altem dürrem Eichenlaub. Auerberg bei Schotten.

*Reticularia flavo-fusca* Fries. An einer Buche an der Zwillingseife bei Laubach. Aug.

*Licea sulfurea* Wallr. An abgestorbener Rinde von *Robinia*. Laubacher Schloßgarten. Dec.

*Scleroderma verrucosum* Pers. Im Buchwald. Kirchberg bei Laubach. Sept. Distrikt Lingelbach bei Gonterskirchen.

*S. vulgare* Fries. Im Buchenwald. Kirchberg bei Laubach. Auch auf Triften bei Laubach. Sept.

*Lycoperdon caelatum* Bull. Am Rothen Stahl bei Laubach. In Kiefernwald. Herbst.

*L. gemmatum* Batsch. *formae hirtum* Fries et *perlatum* Fries. In Wäldern bei Laubach. Sept.

*L. pistillare* Fries in *litt. nov. sp.* 1862. Auf Graswegen im Brühl bei Laubach. Sept.

*L. pyriforme* Schaeff. *form. tessellatum* Pers. Wurzel einer Eberesche an der Chaussée von Laubach nach Schotten. Herbst.

*Bovista plumbea* Pers. Triften bei Laubach. Herbst.

*Geaster fornicatus* Fries. In einem kleinen isolirten sterilen Fichtenwäldchen auf dem Ramsberg bei Laubach. Sept. 1862.

*Phallus impudicus* Linn. Im Buchenwald hin und wieder einzeln. Juli bis Sept. Massenhaft im Steinkopf bei Altenhain.

*Calocera viscosa*. Auf Fichtenstrünken im Oberwald. An Fichten bei Laubach. Sept.

*Clavaria abietina* Pers. In Fichtenwaldungen bei Laubach. Eulengraben, Buchwald u. s. w. Oct.

*C. byssiseda* Pers. Zwischen abgefallenen Zweigen, Bucheckern, Laub u. s. w. Im Thiergarten bei Laubach. Sept.

*C. cristata* Pers. Kirchberg bei Laubach. Oct.

*C. fistulosa* fl. dan. Im Buchenwald. Heinzeberg bei Laubach. Oct.

*C. pistillaris* Linn. Wintersberg bei Laubach. Thiergarten. Im Buchenwald. Sept.

*C. stricta* Pers. Im Schloßgarten in Laubach. In Bosquets. Sept.

*Geoglossum viride* Pers. An nackten Stellen im Buchenwald bei Laubach hin und wieder. Meist mit *Leotia lubrica*. Juli, Aug.

*Spathulea flavida* Fries. Im Buchenwald. Revier Ruppertsburg. Im Fichtenwald. Steinkopf bei Altenhain. Juli.

*Cenangium pulveraceum*. An abgestorbenen Schlehenzweigen. Bei Gonterskirchen.

*Tympanis Patella*. Auf dünnen Umbelliferenstengeln bei Laubach.

*Solenia ochracea* Hoffm. An Buchenholz. In den Laubacher Waldungen hin und wieder. Herbst.

*Ascobolus furfuraceus* Pers. Auf Kuhmist im Oberwald. Sept.

*Peziza aeruginosa* Pers. Auf Buchenholz. Das *Mycelium* sehr häufig, doch selten Becher hervorbringend!

*P. albo-violascens*. Auf dünnen Zweigen, z. B. von *Ampelopsis hederaea* in Laubach. Frühjahr.

*P. alutacea* Pers. In verschiedenen Formen an Waldwegen bei Laubach.

*P. aurantia* Oeder. Im Wald auf Kohlplätzen und Wegen gemein. Juli.

*P. caesia* Pers. An Bohlen einer Brunnenkammer bei Laubach. Oct.

*P. cerina* Pers. An Buchenästen bei Einartshausen. Oct.

*P. citrina* Batsch. Auf faulem Holz in den Laubacher Waldungen gemein. Herbst.

*P. coccinea* Jacq. An Zweigen in dem Distrikt Lingelbach bei Laubach. März.

*P. disciformis* Fr. Einmal am Judenrain bei Laubach. März 1863.

*P. flammea* Alb. u. Schw. An Schlehendornen bei Gonterskirchen.

*P. fructigena* Bull. Auf Zweigen in den Laubacher Waldungen gemein. Herbst. — Eine kleinere Form auf Haselnüssen und Eicheln bei Laubach.

*P. resinosa*. Auf Fichtenharz. Am Elsterberg bei Ruppertsburg. Herbst.

*P. rufo-olivacea*. Auf dünnen Zweigen von *Rubus*, *Crataegus* u. s. w. Ruppertsburg, Laubach. Frühjahr.

*P. serotina*. Auf Rinde einer alten Linde. Laubacher Schloßgarten.

*P. xanthomela* Pers. In einem Fichtenwald am Eulengraben bei Laubach. Oct. 1862. In wenigen Exemplaren.

*Leotia lubrica* Pers. An nackten Stellen im Buchenwalde hin und wieder bei Laubach. Meist in Gesellschaft von *Geoglossum viride*. Juli, August.

*Helvella crispa*. Im Buchenwald. Thiergarten bei Laubach. Aug.

*Thelephora calcea* Pers. *d. sambucina* Wallr. An alten Stämmen von *Sambucus nigra* das ganze Jahr. Schloßgarten in Laubach.

*T. caryophyllea* Pers. In einem dünnen Fichtenbestand. Auf Wegen. Merkbach bei Laubach. Juli.

*T. mesenterica* Pers. syn. An alten Baumstrünken im Kirchberg, Strickberg, Lingelbach bei Laubach. Sept.

*T. purpurea* Schumach. Häufig bei Laubach z. B. im Schloßgarten. Sept.

*T. sanguinolenta* Alb. u. Schw. An kranken Stämmen. Oberwald. Sept. An *Corylus Avellana* im Laub. Schloßgarten. Oct.

*Craterellus cornucopioides* Pers. Ueberall. Buchenwald. Juli. Aug.

*C. sinuosus* Fries. Im Buchenwald. Hubberg bei Ruppertsburg. Ramsberg, Thiergarten bei Laubach. Juli. Aug.

*Grandinia crustosa*. Im Oberwald. Sept.

*Radulum tomentosum* (*Hydnum farinaceum?*). Auf dünnen *Juniperus*-zweigen bei Gonterskirchen.

*Irpez deformis* Fries. An abgefallenen Eichenzweigen. Im Saupark bei Braunfels. Aug.

*Sistostrema confluens* Pers. In Fichtenbeständen im Distrikte Buchwald bei Laubach. Oct. Ramsberg bei Laubach. Kiefernwald. Nov.

*Hydnum Auriscalpium* Linn. Kiefernwald bei Otterbach. Sept.

*H. diversidens?* Fries. An Kirschbäumen im Arnsburger Garten. Das von mir als *Hericium Caput Medusae* im vorigen Bericht gegebene ist nach Fries *Hydnum Erinaceus* Bull.

*Fistulina hepatica* Fries. Im Eselskopf bei Laubach. Juli 1862. Kirchberg. Sept. 1862.

*Merulius Corium* Fries. Im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*M. fugax* Fries. An Buchenzweigen. Bei Rainrod. Nov. Bei Laubach. Jan.

*M. lacrymans* Schumach. Zerstörte im Juli 1862 den unteren Stock eines Hauses in Laubach und entwickelte Fructificationen.

*M. tremellosus* Schrad. Auf faulenden feuchtliegenden Bohlen beim Obernseener Hof. Juli. An ähnlichen Orten bei Laubach. Oct.

*Daedalea quercina* Pers. Am Gaulskopf bei Laubach. Oct.

*Trametes suaveolens* Fries epicr. An alten Weiden bei Berstadt. Oct.

*Polyporus betulinus* Fries. An Birken bei Laubach. Ramsberg.

*P. ciliatus*. Nur einmal in Menge im März 1863 auf dünnen Reisern im Roth bei Gonterskirchen gefunden.

*P. cristatus* Pers. Im Buchenwald. Revier Ruppertsburg. Juli.

*P. frondosus* Fries. An einer alten Eiche an der Forstwiese bei Laubach. Sept.

*P. fumosus*. Bei Laubach überall häufig. Herbst.

*P. hispidus* Fr. An Buchen. Wintersberg bei Laubach. Sept.

*P. marginatus* Pers. An einem alten Kirschbaum im Laubacher Schloßgarten. Oct.

*P. molluscus* Fr. An faulem Gartengeländer von Fichtenholz. Bei Laubach. Oct.

*P. perennis* Fries. Auf Kohlplätzen in der Steinbach bei Laubach.

*P. versicolor* Linn. An Buchen in den Laubacher Waldungen in allen Formen überall gemein das ganze Jahr hindurch.

*Boletus radicans* Pers. Im Oberwald. Sept.

*Lenzites sepiaria* Fries. An einem Steg von Kiefernholz. Schloßgarten Laubach. Sept.

*Schizophyllum commune* Fries. An einem Haselnußstrauch im Laubacher Schloßgarten. An einer Hainbuche im Saupark bei Braunfels. Herbst.

*Cantharellus cinereus* Fries. Buchenwald. Ramsberg, Thiergarten bei Laubach. Juli.

*C. crispus* Pers. An Kirschenästen. Laubacher Schloßgarten. Oct.

*C. retirugus*. Auf Moos und zwar stets *Grimmia apocarpa*. Steinbach bei Laubach, Heinzeberg, Ringelsberg. März.

*Gomphidius glutinosus* Fries. Kiefernwald bei Otterbach. Gaulskopf bei Laubach und an mehr Orten. Sept.

*Agaricus aeruginosus* Curt. Ueberall im Walde bei Laubach. Sept. bis November.

*A. alliaceus* Jacq. In den Laubacher Waldungen nicht selten. Z. B. Kirchberg. Im Oberwald. Sept.

*A. androsaceus* Linn. Sehr häufig auf Abfällen von Nadelholzbäumen bei Laubach. Herbst.

*A. clypeolarius* Bull. In den Laubacher Waldungen hin und wieder. November.

*A. corrugis* Pers. Auf Rasen an der hohen StraÙe bei Einartshausen. Oct.

*A. crocatus* Schrad. Im Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. decipiens* Pers. Im Oberwald auf Erde. Sept. In den Laubacher Waldungen.

*A. disseminatus* Pers. Auf Pappelstrünken. SchloÙgarten in Laubach den ganzen Sommer und Herbst über.

*A. epipterygius* Scop. Auf Wegen im Wald bei Einartshausen. Nov.

*A. fascicularis* Huds. Ueberall bei Laubach in den Wäldern. Im Juli 1862 im Hessenbrücker Braunkohlenbergwerk in den untersten Tiefen an Grubenholz von mir gefunden.

*A. fimetarius* Linn. Auf faulendem Stroh. Laubacher SchloÙgarten. Sommer.

*A. galericulatus* Scopol. In den Laubacher Waldungen und überall. September.

*A. geophyllus* Bull. In allen Farben häufig in den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. gibbus* Pers. Thiergarten bei Laubach. Buchenwald. Sept. Unter Fichten im Distrikt Buchwald bei Laubach.

*A. granulatus* Batsch. b) *Carcharias* Pers. c) *amianthinus* Scopol. Auf Triften und in den Nadelwäldern bei Laubach. Nov.

*A. insititius* Fries. Auf abgefallenen Buchenzweigen. Kochberg bei Laubach. Sept. Oct.

*A. laccatus* Scopol. a) *violaceus*. b) *farinaceus*. In beiden Formen häufig in den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. lacrymabundus* Bull. Im Thiergarten bei Laubach. Sept. An mehreren anderen Orten. Bis Nov.

*A. melleus* Vahl in Fl. dan. An Bäumen bei Laubach. Bei Ulrichstein. Herbst.

*A. metachrous* Fr. Kiefernwald bei Nonnenrod. Oct.

*A. miniatus* Fries. b) *turundus* Fries. Triften am Geiselstein. Sept.

*A. mucidus* Schrad. Kirchberg bei Laubach. Sept. Bei Einartshausen, bei Otterbach. Oct.

*A. nebularis* Batsch. Ramsberg bei Laubach. Sept.

*A. Oreades* Bolt. Auf Triften. An der alten Ziegelhütte bei Laubach. Sept.

*Agaricus peronatus* Bolt. In den Laubacher Waldungen nicht selten. September.

*A. plicatilis* Curt. Verschiedene Orte an Waldwegen bei Laubach. Sept. Auf Gartenerde im Schloßgarten. Oct.

*A. polygrammus* Bull. Am Ramsberg u. a. a. O. Bei Laubach. Nov.

*A. porreus* Fries. Im Distrikt Thiergarten bei Laubach. Buchenwald. Sept.

*A. pratensis* Pers. Triften im Vogelsberg. Sept. Wiesen um Laubach. Oct.

*A. purus* Pers. Im Oberwald. Sept. In den Laubacher Waldungen gemein.

*A. pyxidatus* Bull. An Wegrändern. Bei Nonnenrod. Im Imsenhau bei Laubach. Oct.

*A. rimosus* Bull. Im Oberwald. Sept.

*A. Rotula* Scopol. Waldungen bei Laubach nicht selten. An Bäumen im Schloßgarten.

*A. rutilans* Schaeff. In einem Kieferbestand bei Otterbach. Sept. Ramsberg bei Laubach. Nov.

*A. sanguineus* Wulf. Im Oberwald. Sept.

*A. scorodoni* Fries. In den Laubacher Waldungen. Sept.

*A. semiglobatus* Batsch. Triften im Vogelsberg. Sept.

*A. spadiceo-griseus* Schaeff. Auf Erde im Buchenwald. Kohlplätze u. s. w. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. squarrosus* Müller. An alten kranken Buchen. Kirchberg bei Laubach. Sept.

*A. stypticus* Bull. In den Laubacher Waldungen auf faulem Holz sehr gemein. Das ganze Jahr hindurch.

*A. tener* Schaeff. Kirchberg bei Laubach. Auf Erde im Laubacher Schloßgarten. Sept.

*A. terreus* Schaeff. Ramsberg bei Laubach. Sept.

*A. tremulus*. An einem Graben am Waldrand. Beim Flensunger Hof. Oct. Bei Ruppertsburg.

*A. variabilis* Pers. An dürren Salweidenzweigen in den Birken bei Laubach. An Buchenzweigen im Thiergarten bei Laubach. Juli. Sept. Hölzchen bei Ruppertsburg. Nov.

*A. vaginatus* Bull. In den Waldungen bei Laubach gemein. Sept.

*A. vellereus* Fries. In den Laubacher Waldungen. Oct.

---

Anm. *Uredo Sempervivi* habe ich hier noch nicht gefunden, ich habe aber aus Schlesien einige davon befallene Pflanzen von *Sempervivum soboliferum* mitgebracht, die hier angewachsen sind, und auf denen der Pilz reichlich fortvegetirt.

---

VI.

Flechtenflora von Frankfurt a. M.

Von den Herren H. Bagge und Metzler in Frankfurt\*).

Fam. 1. Usneaceae.

*Usnea barbata* a. *florida* L. Im Taunus häufig, seltener in der Ebene.

*U. ceratina* Ach. Im Frankfurter Wald häufig, aber selten fructificirend.

*Bryopogon jubatum* L. a. *prolixum* Körb. Par. Im Frankfurter Wald und Taunus nicht selten. *β. bicolor* Ehrh. Felsen im Taunus.

*Cornicularia aculeata* a. *campestris* Schaer. Im Taunus und in der Ebene häufig; bei Alzenau auf der Schäferhaide reich fructificirend.

Fam. 2. Cladoniaceae.

*Stereocaulon tomentosum* Fr. Hier und da in der Ebene und im Taunus.

*S. condensatum* Hoffm. Schäferhaide bei Alzenau.

*Cladonia alcicornis* Lightf. Auf dürrer Sandboden nicht selten.

*C. pyxidata* L. An Felsen im Taunus.

*C. gracilis* L. Auf der Schäferhaide bei Alzenau und im Taunus.

*C. cervicornis* Ach. Altkönig im Taunus.

*C. degenerans* Flk. Häufig.

*C. pityrea* Flk. Altkönig.

*C. cariosa* Flk. Am Damme der Main-Neckar-Bahn.

*C. fimbriata* L. Ueberall gemein.

*C. ochrochlora* Flk. Am Damm der Main-Neckar-Bahn.

*C. cornucopioides* L. Im Taunus auf der Erde und an Felsen.

*C. digitata* Hoffm. Im Taunus sowohl, als in der Ebene nicht selten.

*C. polydactyla* Flk. Hinter dem Forsthaus am Grund einer alten Kiefer.

*C. macilenta* Ehr. Im Taunus und in der Ebene ziemlich häufig.

*C. uncinata* Hoffm. Am Damm der Main-Neckar-Bahn.

*C. squamosa* Hoffm. Ueberall häufig.

*C. furcata* Schrb. Ebenso. — *C. pungens* Sm. Ebenso.

*C. rangiferina* L. Ebenso. — *C. stellata* Schaer. Hier und da.

*C. papillaria* Ehr. Auf dürrer Sand- und Haideboden nicht selten.

Fam. 3. Ramalineae.

*Evernia prunastri* a. *vulgaris* L. Ueberall häufig. Bei Alzenau mit Früchten.

*E. furfuracea*. In der Ebene sparsam. Im Taunus häufig, stets steril.

---

\*) Die aufgeführten Flechten sind sämmtlich von den Hrn. Verfassern aufgefunden worden, bis auf eine einzige, im Verzeichniss bemerkte Ausnahme, für welche aber ein authentisches Exemplar vorlag. Die seltneren Arten wurden größtentheils von H. Metzler entdeckt.

*Ramalina fraxinea* L. Ueberall häufig.

*R. calicaris* L. Hier und da, seltener als die vorhergehende.

*R. farinacea*. Allgemein verbreitet.

*R. pollinaria* Ach. Im Frankfurter Wald nicht selten, desgleichen im Taunus.

*Cetraria islandica* L. Gipfel des Altkönigs.

*C. fallax* Ach. Im Taunus bei Reiffenberg an Buchen.

*C. glauca* L. Mit der vorigen vermischt. Im Haidetränkthal, bei Alzenau.

#### Fam. 4. Anaptychieae.

*Anaptychia ciliaris* *a. vulgaris* Krb. *β. crinalis* Schleich. Häufig.

*Tornabenia chrysophthalma* L. An Apfelbäumen bei Frankfurt selten, dagegen häufig bei Hochstadt.

#### Fam. 5. Sphaerophoreae.

*Sphaerophorus coralloides* Prs. Gipfel des Feldbergs, Felsen über dem Haidetränkthal.

#### Fam. 6. Peltidiaceae.

*Nephroma laevigatum* Ach. *a. geminum* Krb. Im Taunus nicht selten.

*Peltigera aphthosa* L. Im Taunus und bei Alzenau.

*P. canina* L. Ueberall gemein.

*P. rufescens* Fr. Ueberall gemein.

*P. horizontalis*. Häufig im Taunus, seltener in der Ebene.

#### Fam. 7. Parmeliaceae.

*Sticta sylvatica* L. Im Taunus an Felsen steril.

*St. fuliginosa* L. Desgleichen.

*St. scrobiculata* Scop. Im Taunus, steril.

*St. pulmonaria* L. An alten Buchen, reichlich fructificirend auf dem Feldberg.

*Imbricaria perlata* L. An Buchen häufig, aber steril.

*I. tiliacea* Ehrh. An verschiedenen Bäumen ziemlich allgemein.

*I. revoluta* Flk. An alten Buchen im Frankfurter Wald.

*I. Borreri* Turn. An Buchen im Frankfurter Wald und an Kiefern bei Griesheim, steril.

*I. saxatilis* L. Ueberall gemein, Apothecien selten.

*β. omphalodes*. Am Brunhildisfelsen auf dem Feldberg.

*I. aleurites* Ach. An Kiefern im Isenburger Wald, bei Hanau mit Früchten.

*I. physodes* *a. vulgaris* L. Ueberall an Bäumen und Felsen, im Taunus mit Apothecien.

*I. Acetabulum* Neck. An Ahorn und alten Pappeln häufig.

*I. olivacea* L. An Buchen im Taunus, steril.

*I. aspera* Massal. In der Ebene überall verbreitet.

*I. stygia* L. *a. genuina*. Am Brunhildisfelsen auf dem Feldberg.

- I. Sprengelii* Flk. Auf Thonschiefer im Taunus überall.  
*I. caperata* Dill. Ueberall häufig.  
*I. conspersa* Ehrh. Im Taunus häufig, in der Ebene selten.  
*Parmelia stellaris* L. Ueberall gemein.  
*P. caesia* Hffm. Auf alten Planken und Sandsteinpfeilern.  
     *var. erosa* Borr. Königstein und Eppstein.  
*P. pulverulenta* Schrb. In verschiedenen Formen überall gemein.  
*P. obscura* Ehrh. Häufig, besonders an Weiden und Pappeln.  
*Physcia parietina* L. Ueberall gemein.  
*P. controversa* Massal. *a. stenophylla* Wallr. Am Grunde alter Pappeln und Buchen; in der Nähe der Stadt steril, bei Langen und Hausen mit Apothecien.

### Fam. 8. Umbilicarieae.

- Umbilicaria pustulata* Hoffm. Im Taunus hier und da, in schönen Exemplaren auf dem Rossert, steril.  
*Gyrophosa polyphylla* L. Auf dem Gipfel des Altkönigs und Feldbergs.  
*G. erosa* Web. Gipfel des Altkönigs.

### Fam. 9. Endocarpeae.

- Endocarpon minutum* L. *a. vulgare* und *β. complicatum*. An Felsen im Taunus; in der Ebene fehlend.  
*E. fluviatile* Web. In den Bächen des Taunus.

### Fam. 10. Lecanorineae.

- Pannaria rubiginosa* *β. conoplea* Ach. Auf Moosen an Felsen des Taunus.  
*P. lanuginosa* Ach. Desgleichen.  
*P. microphylla* Sw. Auf Thonschiefer im Taunus häufig.  
*P. brunnea* Sw. *β. coronata* im Taunus und in der Ebene häufig.  
*P. Schaererii* Mass. Auf Kalksteinen im Frankfurter Wald in der Nähe von Isenburg.  
*Amphiloma murorum* Hoffm. An Mauern und Felsen.  
*A. Callopismum* Ach. An den Umgebungsmauern von Flörsheim.  
*Placodium circinatum* Prs. Felsen im Taunus überall.  
*P. albescens* Hffm. An Mauern bei Frankfurt.  
*P. saxicolum* Poll. Auf Mauern, Felsen und alten Planken.  
*Psoroma lentigerum* Web. Auf Kalk, Bieberer Höhe bei Offenbach und in den Flörsheimer Steinbrüchen.  
*Acarospora smaragdula* Whlbg. Auf Felsen und Mauern gemein.  
*A. glebosa* Krb. Auf umherliegenden Steinen in der Nähe der Stadt, sehr selten.  
*A. Heppii* Nägeli. Auf Kalk bei Offenbach.  
*Candelaria vulgaris* Mass. An Kirsch- und Aepfelbäumen.  
*C. vitellina* Ehrh. An alten Planken, auf behauenen Sandstein und auf Felsen.

*Callopisma cerinum* Hdw. *α. Ehrharti* Schaer. Auf Weiden, Pappeln und alten Planken.

*C. luteo-album* Turn. *α. Persoonianum* Ach. Auf glatter Weiden- und Pappelrinde.

*β. lacteum* Mass. Auf Kalksteinen des Lerchenberges und den Flörsheimer Steinbrüchen.

*C. citrinum* Ach. An Gartenmauern und verschiedenen Bäumen.

*C. aurantiacum* Lightf. *β. flavovirescens* Hoffm. Auf Steinen und Felsen. *ζ. holocarpum* Ehrh. *η. rubescens* Ach. *β.* und *η.* auf Steinen und Felsen. *ζ.* auf alten Planken (nicht auf Bäumen).

*Lecania fuscella* Mass. Hier und da an alten Pappeln und Nussbäumen.

*L. Körberiana* Lahm. An einer Eiche im Wolfsgarten bei Langen und an einer andern im Frankfurter Wald.

*L. Nylanderiana* Mass. An einer Mauer des Königsteiner Schlosses und an einer anderen am Forsthaus bei Frankfurt.

*Rinodina metabolica* Ach. An verschiedenen Bäumen häufig.

*β. demissa* Flrk. *Psora demissa* Hpp. N. 655. An Mauern und zerstreuten Steinen hier und da.

*δ. maculiformis* Hpp. An alten Planken in der Gärtnerei.

*R. leprosa* Schaer. An Eichen im Schwanheimer Wald.

*R. atrocinerea* Dicks. Brücke unweit des Riedhofes.

*R. caesiella* Flk. Im Taunus hier und da.

*R. Bischoffii* Hpp. Auf Kalksteinen bei Offenbach und auf dem Sachsenhäuser Berg.

*Lecanora atra* Huds. Im Taunus auf Felsen gemein, aber nicht in der Ebene, auf Buchen hier und da im Frankfurter Wald.

*L. intumescens* Rebent. Auf Buchen im Taunus, aber nicht in der Ebene.

*L. subfusca* L. *α. vulgaris* Schaer. *β. distans* Ach. *γ. pinastri*. *δ. glabrata*. *η. geographica*. *ι. campestris*. Mehr oder weniger häufig auf Bäumen und Felsen.

*L. scrupulosa* Ach. An Weiden bei der Stadt, sehr selten.

*L. Hagenii* Ach. An alten Planken und Bäumen fast überall.

*L. piniperda* Krb. An Kiefern selten, sehr schön bei Alzenau.

*L. pallida* Schrb. *α. albella*. *β. angulosa*. Beide gemein.

*L. caesio-alba* Krb. An Mauern bei Enkheim, Hochstadt und am Seehof.

*L. Flotowiana* Sprg. Seckbacher Berg an Kalksteinen.

*L. badia* Prs. Gipfel des Feldberges, sehr sparsam.

*L. varia*. *β. sarcopis* Whlb. *γ. apochroa* Ach. *δ. symmicta* Ach. An alten Planken und Kiefernrinde.

*Zeora coarctata* Ach. *α. microphyllina*. *β. contigua*. Ueberall häufig.

*Z. sordida* Prs. An Felsen im Taunus gemein.

*Z. Trevisanii* Mass. (*sordida* Prs. v. *subcarnea* Ach. sec. Krb. Par.). Taunus bei Königstein, Epstein nicht selten.

*Z. sulphurea* Hffm. An Felsen bei Falkenstein und Königstein.

*Z. orosthea* Ach. Im ganzen Taunus häufig.

*Ochrolechia tartarea* L. Bei Eppstein und Königstein an Quarzfelsen.

*Haematomma coccineum* Dicks. Im Taunus häufig.

## Fam. 11. Urceolariaceae.

*Aspicilia calcarea* L. Auf Kalkstein bei Bergen, Offenbach u. s. w.

*A. mutabilis* Ach. Auf altem Holz in den Gärtnereien des Sachsenhäuser Berges.

*A. gibbosa* Ach. Ueberall gemein.

*A. cinerea* L. Desgleichen.

*A. epulotica* Ach. Auf Steinen im Schellbach (Taunus) unter Wasser.

*A. tenebrosa* Flot. *B. lecidina* Krb. Auf den Höhepunkten des Taunus.

*Phialopsis rubra* Hffm. Hier und da an alten Bäumen.

*Urceolaria scruposa* L. *a. vulgaris* Krb. Im ganzen Taunus überall. *β. bryophila*. In der Ebene und im Gebirg.

*Petractis exanthematica* Sm. Auf der Bieberer Höhe und im Frankfurter Wald bei Isenburg an Steinen.

*Gyalecta Flotowii* Krbr. Landwehr bei Frankfurt an *Carpinus Bet.*

*Secoliga abstrusa* Wllr. An Buchen beim Forsthaus und im Wolfsgarten bei Langen.

*Phlyctis agelaea* Ach. Ueberall gemein.

## Fam. 12. Lecideae.

*Diploicia caenescens* Dcks. An Schieferfelsen bei Falkenstein.

*Thalloidima vesiculare* Hffm. Auf Kalkboden bei Offenbach, Flörsheim u. s. w.

*Toninia aromatica* Turn. An einer Mauer des Hainer Weges.

*Psora ostreata* Hoffm. Am Grunde älterer Bäume überall, steril.

*Blastenia ferruginea* Huds. *a. genuina* Krb. Im Taunus selten.

*Bacidia rosella* Prs. An Eichen und Buchen im Frankfurter Wald nicht selten.

*B. polychroa* Th. Fries. Flora 1861, p. 413. — *Anzi exsicc.* 143. Hepp. Eur. 520: An *Acer campestre* bei Ginheim.

*B. rubella* Prs. *a. vulgaris* Krb. Ueberall gemein.

*B. atrogrisea* Delis. An Buchen im Frankfurter Wald häufig.

*B. coerulea* Krb. An Hainbuchen und *Sambuc. nigra* hier und da.

*B. Arnoldiana*. *a.* Krb. Am Schellbach im Taunus. *β. inundata* Krb. In der Nähe der Stadt an zerstreut liegenden Steinen.

*Biatorina pyracea* Mass. An Pappeln, aber nicht häufig. *β. saxicola* Hpp. (*Biatora irrubata* Ach. Flora 1861, p. 505). An der Mauer der Fasanerie bei Hanau.

*B. pineti* Schrd. Steril überall, mit Früchten bei Schwanheim und im Taunus an Kiefern.

*B. cyrtella* Ach. Ueberall gemein.

*B. proteiformis* Mass. *α. Rabenhorstii* Hpp. Mauern der Fasanerie bei Hanau.

*B. Lightfootii* Sm. Schwanheimer Wald, sehr selten.

*B. turicensis* Hpp. An alten Gartenmauern in der Nähe der Stadt.

*B. globulosa* Flk. An Eichen im Taunus häufig, in der Ebene selten.

*B. synothea* Ach. *β. chalybaea* Hpp. An Pappeln, Kirschbäumen und altem Holz.

*Biatora decolorans* Hffm. Auf dem Feldberg und auf der Försterwiese im Frankfurter Wald.

*B. viridescens* Schrd. *α. gelatinosa* Flk. An Waldwegen im Taunus selten.

*B. vernalis* L. Auf alten Moosrasen im Wald bei Hanau (*leg. Russ.*).

*B. rivulosa* Ach. *α. superficialis* Schaer. Im ganzen Taunus überall.

*β. Kochiana* Hpp. Auf dem Gipfel des Altkönigs.

*B. rupestris* Scop. *β. rufescens* Hffm. Auf Kalksteinen bei Bergen, Offenbach, Flörsheim u. s. w.

*B. polytropa* Ehrh. *α. vulgaris* Flot. Im Taunus auf Felsen häufig.

*B. Ehrhartiana* Ach. Auf alten Eichen überall gemein.

*B. micrococca* Krb. An jungen Kiefern und Birken bei Langen, Wiesbaden und Homburg.

*B. sylvana* Krb. An *Fraxinus excelsior* im Haidetränkthal.

*B. Decandollei* Hpp. An jungen Buchen an verschiedenen Standorten.

*B. uliginosa* Schrd. Im Taunus und in der Ebene überall häufig.

*B. fuliginea* Ach. An alten Planken am Forsthaus mit Früchten.

*B. flexuosa* Krb. Steril überall gemein, mit Früchten an alten Bäumen im Schwanheimer Wald und bei Alzenau.

*B. minuta* Schaer. An Eichen im Haidetränkthal.

*B. ambigua* Mass. An Bäumen im Haidetränkthal, sonst selten im Taunus.

*B. Metzleri* Krb. Auf Kalksteinen der Seckbacher Höhe.

*B. Nylanderii* Anzi. Catal. (*fuscescens* Nyl. lich. Paris exsicc. N. 133). Bei Alzenau an Kiefern.

*Bilimbia faginea* Krb. Ueberall häufig.

*B. effusa* Auersw. An *Acer campestre*. In der Hartig bei Hochstadt.

*B. hypnophila* (Ach.) Th. Fries Lich. Arch. p. 183. An Mauern und auf Moosrasen nicht selten.

*B. milliaria* Fr. An jungen Kiefern im Taunus und in der Ebene häufig. *γ. saprophila* Krb. Auf faulen Baumstrünken im Haidetränkthal.

*Strangospora pinicola* Krb. An alten Kiefern bei Alzenau.

*Diplotomma populorum* Mass. An verschiedenen Bäumen hier und da.

*D. alboatrum* Hffm. *α. corticolum* Ach. *β. epipolium* Ach. \*\* mu-

rorum Mass. Ueberall verbreitet. *δ. chlorophaenum* Hpp. An Thonschieferfelsen bei Königstein.

*Buellia discolor* Ach. Falkensteiner Wald an Thonschieferfelsen.

*B. coracina* Hffm. Auf dem Gipfel des Altkönigs, sehr schön.

*B. ocellata* Flk. *β. cinerea* Flotow. Im Taunus ziemlich verbreitet.

*B. stigmata* Ach. An Eisenbahndämmen auf zerstreuten Steinen.

*B. occulta* Krb. Bei Reiffenberg an Felsen.

*B. parasema. α. tersa* Ach. Im Taunus gemein an Birken und Buchen, im Frankfurter Wald selten.

*B. punctata* Flk. Auf Kiefern und altem Holz gemein.

*B. corrugata* Krb. An einer alten Eiche bei Homburg.

*B. Schaereri* De Not. Auf Kiefern bei Alzenau und Kelsterbach.

*Catillaria premnea* Fr. An einer Eiche im Haidetränkthal und an einer Buche bei der Sachsenhäuser Warte.

*C. chalybaea* Borr. An der Brücke, unweit des Riedhofes.

*C. concreta* Whlnbg. Auf dem Gipfel des Feldbergs.

*Lecidella ambigua* Ach. *β. variegata* Fr. Gipfel des Altkönigs.

*L. pruniosa* Ach. daselbst.

*L. goniophila* Flk. Hier und da zerstreut, nicht häufig.

*L. protrusa* Fr. Falkensteiner Wald an Thonschieferfelsen.

*L. sabuletorum* Schreb. *β. aequata* Flk. An Mauern, steinernen Pfosten und Platten u. s. w. häufig.

*L. enteroleuca* Ach. *β. rugulosa* Ach. sehr gemein. *δ. euphorea* Flk. In der Gärtnerei auf altem Holzwerk nicht selten.

*L. olivacea* Hffm. Gemein.

*Lecidea albo-coerulescens* Wulf. *α. vulgaris* Schaer. Bei Königstein.

*L. fumosa* Hoffm. Ueberall gemein. *α. ocellulata*. Im Heidetränkthal.

*L. contigua* Hffm. Im Taunus überall. *b) intermedia* Hpp. Eur. 704.

Am Damm der Main-Neckar-Eisenbahn.

*L. platycarpa* Ach. Im Taunus häufig in der thalluslosen Form.

*L. crustulata* Ach. Im Gebirg und in der Ebene überall häufig.

*L. erratica* Krb. Am Damm der Main-Neckar-Eisenbahn.

*Rhizocarpon Montagnei* Flot. Im Taunus hier und da.

*R. petraeum* Wulf. Im Gebirg gemein.

*R. viridi-atrum* Flk. Bei Eppstein, am Staufen und bei Usingen.

*R. geographicum* L. Ueberall im Gebirg gemein.

*Sarcogyne pruinosa* Sm. An Mauern und auf Kalksteinen häufig.

*Raphiospora atosanguinea* Schaer. *β. lecidina* Krb. Im Frankfurter Wald sehr selten und unter dem Gipfel des Feldbergs an Buchen.

*R. viridescens* Mass. In der Sandkaute bei Bockenheim sehr selten.

*Scoliciosporum holomelaenum* Flk. Im Taunus bei Königstein und Eppstein.

*S. molle* Borr. Im ganzen Frankfurter Wald häufig.

*S. lecideoides* Haysl. Alte Buchen im Wolfsgarten bei Langen.

*S. perpusillum* Lahm. An alten Kiefern bei Alzenau sehr selten.

*Arthrosporum Acclins* Flotow. Zwischen Bergen und Hochstadt an Pappeln sehr selten.

*Schismatomma dolosum* Whlnbg. An Tannen im Frankfurter Wald nicht selten, an Eichen an der Babenhäuser Landstrasse.

### Fam. 13. Baeomyceae.

*Sphyridium byssoides* L. Auf Felsen und an der Erde im Taunus gemein, in der Ebene selten.

*Baeomyces roseus* Pers. Im Taunus an der Erde häufig.

### Fam. 14. Graphideae.

*Lecanactis biformis* Flk. Die Spermogonienform im Frankfurter Wald nicht selten.

*L. illecebrosa* Dufour. An Eichen überall häufig.

*L. lyncea* Sm. An alten Eichen bei Frankfurt.

*Opegrapha plocina* Ach. An einem Thonschieferfelsen im Wald bei Falkenstein.

*O. saxatilis* DC. An einer Mauer der Saustiege im Frankfurter Wald.

*O. lithyrga* Ach. Im Wald bei Frankfurt an Thonschieferfelsen.

*O. varia* Prs. Ueberall gemein.

*O. bullata* Prs. Gemein, besonders auf Weisbuchen.

*O. atra* Prs. *α. vulgaris* Krb. Im Frankfurter Wald, nicht häufig.

*O. herpetica* Ach. *α. vulgaris* Krb. *β. subocellata* Flk. Ueberall häufig.

*Zwackhia involuta* Wallr. An Eichen und Weisbuchen, hier und da.

*Graphis scripta* L. *α. vulgaris* Krb. *β. serpentina* Ach. Ueberall gemein.

*Haszlińska gibberulosa* Ach. (Krb. Par.). An *Carpinus* bei Hochstadt und in der Landwehr bei Frankfurt.

*Arthonia gregaria* Weigel. Im Frankfurter Wald an Buchen sehr selten.

*A. vulgaris* Schaer. In den verschiedensten Formen überall gemein.

*A. minutula* Nyl. Nicht selten an Bäumen und Sträuchern.

*A. microscopica* Ehrh. Hpp. 560. Desgleichen.

*A. punctiformis* Ach. An jungen Zweigen verschiedener Bäume.

*A. impolita* Ehrh. Häufig an Eichen.

*Coniangium luridum* Ach. An halb abgestorbenen Eichen im Haide-tränktal und bei Homburg.

*C. Krempelhuberi* Krb. Unweit der Goldgrube an einer Pappel, sehr selten.

*Pachnolepia decussata* Flot. An Felsen bei Eppstein.

*Bactrospora dryina* Ach. An Eichen im Wolfsgarten bei Langen.

*Pragmopora amphibola* Mass. An jungen Kiefern nicht selten.

### Fam. 15. Calycieae.

*Calycium pusillum* Flk. — *C. curtum* Borr. — *C. lenticulare* Hffm. — *C. trachelinum* Ach. — *C. adpersum* Pres. — Sämmtlich im Frankfurter Wald in der Umgebung der Stadt und im Taunus mehr oder weniger häufig.

*Cyphelium melanophaeum* Ach. — *C. trichiale* Ach. — *C. stemoneum* Ach. — *C. chrysocephalum* Turn. — *C. chlorellum* Whlbg. Wie bei *Calycium*.

*Coniocybe furfuracea* L. *α. vulgaris* Schaer. *β. sulphurella* Whlbg. Wie bei *Calycium*.

### Fam. 16. Dacampieae.

*Endopyrenium rufescens* Ach. Im Taunus an Felsen und sonst an Mauern hier und da.

*E. Michelii* Mass. Auf der Bieberer Höhe und bei Enkheim an der Erde.

### Fam. 17. Pertusarieae.

*Pertusaria ocellata* Wllr. *β. corallina* Ach. Auf dem Gipfel des Altkönig häufig.

*P. communis* DC. Ueberall gemein.

*P. Wulfenii* DC. Im Frankfurter Wald an Buchen und Tannen, nicht häufig.

*P. lejoplaca* Ach. An Buchen häufig. *β. juglandis* Hpp. Im Haide-tränktal an Eichen und Kastanien.

*P. fallax*. An Eichen im Haidetränktal, sehr selten. *β. variolosa* Fr. Im Gebirg und in der Ebene nicht gar selten.

### Fam. 18. Verrucarieae.

*Stigmatomma cataleptum* Ach. An Thonschiefer unweit der Burg Falkenstein.

*Pyrenula nitida* Schröd. und *β. nitidella* Flk. An Buchen und Hainbuchen überall gemein.

*P. glabrata* Ach. An einer Hainbuche im Ginheimer Wäldchen.

*P. Coryli* Mass. Bei Enkheim auf *Corylus* sehr schön.

*Polyblastia fallaciosa* Stizenb. An Birken unweit des Forsthauses.

*Acrocordia gemmata* Ach. Ueberall gemein an verschiedenen Bäumen.

*Thelidium minutulum* Krb. Par. Auf Kalksteinen im Frankfurter Wald, aber sehr selten

*Sagelia macularis* Wllr. und *β. chlorotica* Ach. Im großen Tannenwald bei Homburg an zerstreuten Steinen und bei Epstein am Grauen Stein.

*S. aenea* Wallr. An Buchen im Frankfurter Wald hier und da.

*Verrucaria rupestris* Schröd. Auf Sand- und Kalksteinen, auf Brücken bei Offenbach, Lerchenberg u. s. w.

*V. fusco-atra* Wllr. Auf Kalk und im Taunus auf Thonschiefer häufig. — *Forma corticola*. Frankfurter Wald an alten Eichen sehr selten.

*V. viridula* Schröd. Auf Mauern bei Bockenheim.

*V. fuscella* Turn. *β. glaucina* Ach. An Kalkmauern in der Umgebung der Stadt.

*V. hydrela* K. Taunus, Heidetränkthal, unter Wasser in Gebirgsbächen.

*V. elaeina* Borr. Am Schellbach im Heidetränkthal.

*V. margacea* Whlnbg. In Taunusbächen bei Königstein und im Heidetränkthal.

*V. muralis* Ach. *α. vera* Krb. Auf Kalkmauern überall häufig.

*β. confluens* Mass. Auf Kalksteinen häufig.

*V. papillosa* Ach. Auf Kalksteinen in der Nähe der Stadt.

*Thrombium epigaeum* Pers. Schaer. Auf bloßer Erde, auf Lehmboden an Grabenrändern.

*Leptorhaphis oxyspora* (Nyl.) Krb. syst. An Birken gemein.

*L. Tremulae* Krb. An Weiden und jungen Pappeln nicht selten.

*Arthopyrenia analepta* Ach. An verschiedenen Bäumen im Frankfurter Wald nicht selten.

*A. punctiformis* Pres. emend. (*A. Persoonii* Mass., *Pyrenula punctiformis* Hpp.) An jungen Bäumen häufig.

*A. grisea* Schleich. An Birken im Frankfurter Wald.

*A. cerasi* Schrd. An jungen Kirschbäumen.

*A. Fumago* Wallr. An Pappeln und alten Linden in der Stadtpromenade.

## Fam. 19. Collemaeae.

*Collema cheileum* Ach. Auf Mauern in der Umgebung der Stadt steril. *β. Metzleri* Hpp. In den Flörsheimer Steinbrüchen und auf Steinen bei Bergen und Seckbach. *γ. byssinum* Hffm. (Krb. syst.) Bei Bockenheim in der Nähe des Bahnhofes.

*C. glaucescens* Hffm. Auf Lehmäckern unweit des neuen Irrenhauses und am Mainufer.

*C. pulposum* Bernh. Auf Mauern, im Wald u. s. w. häufig.

*C. microphyllum* Ach. An Pappeln bei Ginheim und Enkheim.

*Synechoblastus flaccidus* Ach. Auf Felsen im Taunus häufig, aber steril.

## Fam. 20. Leptogieae.

*Leptogium lacerum* Ach. Im Taunus häufig, steril.

*L. sinuatum* Huds. (Krb. syst. 418.) Felsen des Falkensteins.

*L. tenuissimum* Dicks. Auf Aeckern in der Nähe des neuen Irrenhauses.

*L. pusillum* Nyl. Kalksteine in den Hochstädter Weinbergen.

## Fam. 21. Lecothecicae.

*Lecothecium corallinoides* Hffm. Auf Kalksteinen häufig.

*Micaraea prasina* Fr. An Lärchen bei Homburg.

### Pseudolichenes.

*Celidium stictarum* Tulasne. Auf den Apothecien von *Stictapulmonacea*.

*Trichothecium gemmiferum* Tayl. Mass. Thonschiefer bei Königstein häufig.

*Tromera myriospora* Krmplh. p. 228. *a. xanthostigma* und *β. sarcogynoides*. Auf ausgeflossenen Harz auf Tannen unterhalb des Feldberggipfels und bei Homburg.

---

## VII.

### Beiträge zur Kryptogamenflora der Wetterau

von Herrn Dr. **Uloth** in Nauheim.

---

Die folgende Zusammenstellung der von mir in den letzten Jahren in der Wetterau aufgefundenen Lichenen und Laubmoose reiht sich einerseits an die von mir in der Flora von 1861 gegebenen „Beiträge zur Flora der Laubmoose und Flechten Kurhessens“ an, andererseits wird sie die in diesen Blättern bereits von Anderen gemachten Mittheilungen vervollständigen und ergänzen.

Die systematische Aufeinanderfolge der Gattungen ist dieselbe wie die in der oben erwähnten Arbeit.

Zur mikroskopischen Untersuchung und Messung der Sporen wurde ein Instrument von **Oberhäufser** mit eingelegtem Glasmikrometer benutzt.

Als Einheit für die Größenangaben ist 1 Mikromillimeter (mkm) = 0,001 Millimeter angenommen.

Die Citate beziehen sich auf folgende Schriften :

|                   |   |                                                            |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Körb. Syst.       | = | <b>Körber</b> , Systema lichenum.                          |
| Körb. Parerga     | = | <b>Körber</b> , Parerga lichenologica.                     |
| Hepp Eur. Fl.     | = | <b>Hepp</b> , die Flechten Europas mit Sporen-Abbildungen. |
| Rabenh. Cr.-Fl.   | = | <b>Rabenhorst</b> , Deutschlands Kryptogamenflora.         |
| Genth Cr.-Fl. N.  | = | <b>Genth</b> , Kryptogamenflora des Herzogthums Nassau.    |
| Schaer. Enum. cr. | = | <b>Schaerer</b> , Enumeratio critica lichenum europaeorum. |
| Schpr. Synops.    | = | <b>Schimper</b> , synopsis muscorum europaeorum.           |

#### 1. Flechten.

*Cornicularia aculeata* Ehrh. Körb. Syst. p. 8. Rabenh. Cr.-Fl. p. 118. Schaer. Enum. cr. p. 16. Genth Cr.-Fl. N. p. 330. Hepp Eur. Fl. p. 358. Auf Kiesboden an der Eisenbahnböschung bei Nauheim, bei N. Mörlen. Fehlt auf Lehm- und Thonboden.

*Stereocaulon corallinum* Fr. Körb. Syst. p. 11. Rabenh. Cr.-Fl. p. 112. Schaer. Enum. cr. p. 180. Genth Cr.-Fl. N. p. 408. Hepp Eur. Fl. Nr. 114. Vereinzelt auf dem Winterstein, Johannisberg, Hausberg.

*Cladonia cariosa* Flk. *Cl. degenerans*  $\beta$ . *symplicarp. f. cariosa* Körb. Syst. p. 21. *Cl. neglecta var. cylindrica f. cariosa* Schaer. Enum. cr. p. 193. *Cl. pyxidata B. neglecta f. cariosa* Rabenh. Cr.-Fl. p. 107. An Grabenrändern des Eisenbahndammes bei Nauheim.

*Cl. fimbriata* L. Körb. Syst. p. 22. Rabenh. Cr.-Fl. p. 107. Schaer. Enum. cr. p. 190. Genth Cr.-Fl. N. p. 402. Auf Kiesboden bei Nauheim, bei Usingen und am Winterstein.

*Cetraria saepincola* Ehrh. Körb. Syst. p. 47. Schaer. Enum. cr. p. 14. Rabenh. Cr.-Fl. p. 113. Auf *Prunus spinosa* am Goldstein bei Nauheim.

*Borreria chrysophthalma* Ach. Hepp Eur. Fl. Nr. 569. *Hagenia* Rabenh. Cr.-Fl. p. 115. *Physcia* Schaer. Enum. cr. p. 12. An alten Planken beim Bahnhof in Nauheim.

*Peltigera aphthosa* L. Körb. Syst. p. 58. Schaer. Enum. p. 19. Hepp Eur. Fl. Nr. 173. Rabenh. Cr.-Fl. p. 67. Genth Cr.-Fl. N. p. 317. An feuchten Grasplätzen am Johannisberg, Frauenwald, am Winterstein bei Nauheim, in Waldungen bei Lang-Göns und Grofsenlinden. Steril.

*P. venosa* L. Körb. Syst. p. 62. Schaer. Enum. cr. p. 19. Rabenh. Cr.-Fl. p. 66. Hepp Eur. Fl. Nr. 172. Genth Cr.-Fl. N. p. 321. In der s. g. Wisselsheimer Hohle, im Frauenwald und Stadtwald bei Nauheim.

*Lecanora atra* Huds. *a. vulgaris* Körb. Syst. p. 139. Hepp Eur. Fl. Nr. 182. Auf Orthocerasschiefer des Hausbergs, Spiriferensandstein bei Ziegenberg und Gransberg.

*L. scrupulosa* Ach. Körb. Syst. p. 144. Sporen farblos, 8 bis 10 mkm. lang,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal so lang als dick, 12 bis 24 in einem Schlauch. An Hollunderrinde am Marbacher Weg bei Marburg mit *Biatorina sambucina*; auf *Popul. nigra* im Park zu Nauheim mit *Lecania fuscella*.

*L. caesio-alba* Körb. Parerga p. 82. *L. Sommerfeltiana* Auct. Hepp Eur. Fl. Nr. 61. Sporen 1zellig, farblos, 9 bis 12 mkm. lang,  $2\frac{1}{2}$  bis 3 mal so lang als dick, zu 8 in einem Schlauch. Auf Kalkmörtel der Sandsteinmauern bei Nauheim.

*L. Flotoviana* Spr. Körb. Syst. p. 146. *Placod. saxicolum*  $\gamma$ . *albescens* Fw. Auf incrustirten Gradirreifeisern (s. g. Griessteinen) auf dem Salinenhof zu Nauheim.

*Ochrolechia pallescens* L. *a. parella* Körb. Syst. p. 149. Hepp Eur. Fl. Nr. 500. Genth Cr.-Fl. N. p. 359. Auf Spiriferensandstein bei Gransberg häufig, bei Ziegenberg, Oppershofen und Lang-Göns.

*Rinodina Conradi* Kbr. Sporen braun, 2 bis 4zellig, 28 bis 32 mkm. lang, 2 bis  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als dick, zu 8 in einem Schlauch. An abgestorbenen Grasblättern und Moosen am Fußweg von Nauheim nach Ober-Mörlen, oberhalb des Dorfes.

*Placodium saxicolum* Poll.  $\beta$ . *areolatum* Leighton. Lich. britann. exs. Nr. 81. Auf Dolerit bei Nordeck.

*P. albescens* (Hoffm.) Körb. Körb. Syst. p. 145. Hepp Eur. Fl. p. 180. Sporen 1zellig, farblos, 12 bis 14 mkm. lang,  $2\frac{1}{2}$  bis 3 mal so

lang als dick, zu 8 in einem Schlauch. Auf alten Dachziegeln nicht selten in der Wetterau.

*P. lentigerum* Fw. *Psoroma* Körb. Syst. p. 119. *Lecanora* Hepp Eur. Fl. Nr. 179. Genth Cr.-Fl. N. p. 356. Auf Kalkboden in der Luhr bei Offenbach, bei Kleinostheim im Spessart.

*P. crassum* Fw. *Psoroma* Körb. Syst. p. 119. *Lecanora* Hepp Eur. Fl. Nr. 59. Mit der vorigen bei Kleinostheim im Spessart.

*Zeora coarctata* Ach. *a. microphyllina* (genuina Krb.). Häufig auf Spiriferensandstein bei Ziegenberg, Oppershofen und Thonschiefer bei Lang-Göns.

*Myriospora glaucocarpa* Hepp Eur. Fl. Nr. 377. Körb. Parerga p. 57. Auf Spiriferensandstein bei Gransberg und Ziegenberg.

*Aspicilia Lundensis* Mass. Mem. 131. *A. calcarea* f. *Lundensis* (Fw.) Körb. Syst. p. 166. Sporen farblos, kugelig, 9 bis 12 mkm. im Durchmesser, zu 4 in einem Schlauch. Auf Thonschiefer der Eisenbahnböschung bei Lang-Göns unter *L. crustulata*.

*A. cinerea* L. Körb. Syst. p. 164. *Urceolaria* Schaer. Enum. cr. p. 86. Hepp Eur. Fl. Nr. 388. Sporen 13 bis 23 mkm. lang,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal so lang als dick, 8 in einem Schlauch. Auf Silicatsandstein bei Münzenberg und Quarzit des Taunus nicht selten.

*Secoliga geioica* Wahlb. Sporen farblos, 24 bis 29 mkm. lang, 2 mal so lang als dick, zu 8 in einem Schlauch. In den Löchern der alten Rodenbacher Steinbrüche bei Hanau.

*Pannaria triptophylla* Ach. Körb. Syst. p. 107. Hepp Eur. Fl. Nr. 610. *Biatora* Rabenh. Cr. Fl. p. 91. *Lecidea* Schaer. Enum. p. 98. Im Wald zwischen Usingen und Pfaffenwiesbach, bei Steinfurt und bei Lang-Göns.

*P. hypnorum* Körb. Syst. p. 108. *Amphiloma* Hepp Eur. Fl. Nr. 174. *Lecanora* Rabenh. Cr.-Fl. p. 44. Mit den vorigen am Waldrand des Wintersteins bei Nauheim.

*Diploicia canescens* Deks. Körb. Syst. p. 175. *Lecidea* Schaer. Enum. cr. p. 105. Rabenh. Cr.-Fl. p. 89. Auf Spiriferensandstein bei Ziegenberg und Oppershofen.

*Biatora flexuosa* Fr. Körb. Syst. p. 194. An der Rinde alter Tannen im Ockstädter Wald, auf Buchenrinde bei Hanau.

*B. trachona* Ach. *β. spermogonifera*. Körb. Syst. p. 197. Auf Quarzit des Johannisbergs und des Wintersteins bei Nauheim; auf feuchtem Sandstein des Dammelsbergs bei Marburg.

*B. rivulosa* Ach. *α. superficialis* Schaer. Körb. Syst. p. 196. Schaer. Enum. cr. p. 111. Hepp Eur. Fl. Nr. 491. Genth Cr.-Fl. N. p. 373. Sporen 1 zellig, farblos, ei- oder bohnenförmig, 10 bis 11 mkm. lang, 2 bis  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als dick, zu 8 in einem Schlauch. Auf Quarzit des Taunus häufig. — *β. Kochiana* Hepp Eur. Fl. Nr. 239. Körb. Syst. p. 196. Auf Quarzit des Feldbergs, des Altkühns und des Wintersteins, jedoch nicht häufig.

*B. conglomerata* Heyd. Körb. Syst. p. 204. Schaer. Enum. p. 140. Rabenh. p. 94. An Kirschbaumrinde in der Nähe des Bahnhofs bei Grofskarben.

*Biatorella Roussellii* (Dur. et Mtg.). Körb. Parerga p. 124. *Lecidea fossarum* Dyf. Nyl. Prodr. 116. Sporen farblos, 1zellig, sehr klein, in grofser Menge in einem Schlauch. Auf Lehmboden in der Nähe des Bahnhofs bei Nauheim.

*Biatorina sambucina* Körb. Parerga p. 137. *Biatora pusilla* Hepp. Auf Epheuranken an der Burg Friedberg und bei Ziegenberg; an Hollunderrinde bei Marburg mit *Bilimbia Naegeli* Hepp.

*B. cyrtella* Ach. Körb. Syst. p. 190. Schaer. Enum. cr. p. 138. Rabenh. p. 92. An Nufsbaumrinde bei Nauheim und an der Rinde junger Eichen bei Grofsenlinden.

*B. pyracea* Mass. Körb. Syst. p. 190. *Biatora* Hepp Eur. Fl. Nr. 500. An der Rinde junger Linden im Park zu Nauheim.

*B. lenticularis* Fr. Körb. Syst. p. 191, Parerga 144. *Biatora holomelaena* Naeg. Hepp Eur. Fl. Nr. 12. — + *erubescens* Kbr. Sporen 2zellig, farblos, 6 bis 10 mkm. lang, 2 bis 3 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Basalt der Burg Friedberg (häufig) und an der Schlossmauer bei Münzenberg.

*B. proteiformis*. *β. erysibe* Körb. Syst. p. 213, Parerga, *Putellaria* Hepp Eur. Fl. Nr. 409. Häufig auf Kalkmörtel an dem Thurm im Park, an Mauern auf dem Johannisberg und im Salinenhof zu Nauheim, an Mauern bei Langenselbold.

*B. turicensis* Hepp Eur. Fl. Nr. 8. Körb. Parerga p. 140. Sporen 2zellig, farblos, 10 bis 15 mkm. lang,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. An Basaltmauern bei Friedberg.

*B. synothea* Ach. *β. chalybaea* Hepp Eur. Fl. Nr. 15. Körb. Parerga p. 144. Sporen 2zellig, farblos, 8 mkm. lang, 2 bis 3 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Häufig an der glatten Rinde von *Ulmus americana*, *Populus nigra* in den Alleen und dem Park zu Nauheim, an der Rinde junger Eschen bei Friedberg.

*Bacidia rosella* Pers. Körb. Syst. p. 185. *Lecidea* Schaer. Enum. cr. p. 141. *Biatora* Rabenh. p. 94. Hepp Eur. Fl. Nr. 522. Auf Buchenrinde im Steinfurter Wald, im Nauheimer Stadtwald.

*B. rubella* Ehrh. *β. fallax* Körb. Parerga p. 131. Auf der Rinde von Ahorn am Winterstein.

*B. effusa* Sm. *Biatora* Hepp Eur. Fl. Nr. 24. *Bacidia anomala* Körb. Syst. p. 188. An der Rinde von Buchen im Wald zwischen Niederrad und Frankfurt a. M. häufig.

*Bilimbia Naegeli* Hepp Eur. Fl. Nr. 19. *B. faginea* Körb. Syst. p. 212. An der Rinde von Nufsbäumen im Park zu Nauheim und an Kirschbäumen auf den Teichinseln.

*Biatoridium resinae* Fr. *Tromera* Mass. *Peziza myriospora* Hepp Eur. Fl. Nr. 300. Sporen farblos, 1zellig, 2 mkm. im Durchmesser, zahlreich in einem Schlauch. Auf Tannenharz im Ockstädter Wald, im Burg-

wald bei Ernsthausen bei Marburg. *β. sarcogynoides* Mass. An demselben Standort mit der Hauptform.

*Lecidella ochracea* Hepp Eur. Fl. Nr. 263. Körb. Parerga p. 210. Sporen 1 zellig, farblos, 10 mkm. lang, 2 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Silicatsandstein bei Münzenberg vereinzelt.

*L. turgidula* Fr. Körb. Syst. p. 243. Hepp Eur. Fl. Nr. 269. Sporen 1 zellig, farblos, 12 mkm. lang,  $3\frac{1}{2}$  bis 4 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. An altem Bretterwerk bei Nauheim.

*Lecidea erratica* Körb. Parerga p. 223. Sporen 1 zellig, farblos, 6 bis 8 mkm. lang,  $1\frac{1}{2}$  bis 2 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Dachziegeln an den Gradirbauten bei Nauheim häufig.

*L. fumosa* Hoffm. *β. grisella* Schaer. Körb. Syst. p. 253. Hepp Eur. Fl. Nr. 131. Auf Quarzit des Wintersteins im Taunus.

*Myriosperma privigna* Ach. *Sarcogyne* Körb. Syst. p. 266. Auf Spiriferensandstein bei Ziegenberg und Oppershofen, auf Quarzit des Johannisbergs.

*Scoliosporum compactum* Körb. *β. saxicolum* Körb. Syst. p. 269. Auf Spiriferensandstein bei Gransberg.

*Sc. holomelaenum* Flk. Körb. Syst. p. 269. *Biat. streptospora* Näg. Hepp Eur. Fl. Nr. 523. Sporen mehrzellig, farblos, linksspiralig gewunden, zu 8 in einem Schlauch. Auf Basalt der Burg Friedberg.

*Arthrosporum accline* Fw. Körb. Syst. p. 270. *Biatora* Hepp Eur. Fl. Nr. 241. An der Rinde junger Acacien, Eschen und Ulmen im Park zu Nauheim.

*Duellia badia* Fr. Körb. Syst. p. 226. *Lecidea* Rabenh. Cr.-Fl. p. 88. Sporen 2 zellig, braun, 16 mkm. lang, 2 bis  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Spiriferensandstein bei Oppershofen.

*B. saxatilis* Schrad. Körb. Syst. p. 228, Parerga p. 188. *Lecidea* Hepp Eur. Fl. Nr. 145. Sporen 2 zellig, braun, 9 bis 11 mkm. lang, 2 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Spiriferensandstein bei Ziegenberg.

*Diplotomma populorum* Mass. Körb. Parerga p. 176. Hepp Eur. Fl. Nr. 470. An Pappel- und Nufsbäumen bei Nauheim.

*D. tegulare* Körb. Parerga p. 176. Sporen parenchymatisch, braun, 13 bis 15 mkm. lang, zu 8 in einem Schlauch. Auf Dachziegeln der Gradirbauten bei Nauheim.

*Calycium pusillum* Fw. Körb. Syst. p. 308. *C. nigrum* *γ. pusillum* Schaer. Enum. cr. p. 169. Hepp Eur. Fl. 338. Genth Cr.-Fl. N. p. 413. Auf Eschenrinde im Park zu Nauheim häufig.

*Coniocybe stilbea* Ach. *α. pallida* Körb. Syst. p. 319. Hepp Eur. Fl. Nr. 154. Genth Cr.-Fl. N. p. 412. Häufig an alten Rinden im Park des landgräfl. Schlosses zu Homburg.

*Verrucaria catalepta* Wigg. Körb. Parerga p. 368. Hepp Eur. Fl. Nr. 433. Sporen 1 zellig, farblos, 18 bis 24 mkm. lang, 2 mal so lang als dick, 8 Sporen in einem Schlauch. Auf Basalt der Burg Friedberg.

*Pragmopora Lecanactis* Mass. Körb. Parerga p. 279. *Peziza compressa* Autt. Sporen farblos, 4 bis 12 zellig, fingerförmig, zu 8 in einem Schlauch. Auf alten Balken an den Gradirbauten zu Nauheim.

*Collema cheileum* Ach. *a. verum*. Körb. Syst. p. 402. An feuchten Mauern auf dem Salinenhof zu Nauheim mit *Dermatocarp. Schaereri*.

*C. hyssinum* Flk. Schaer. Enum. cr. p. 259. Auf Lehm Boden des Johannisbergs bei Nauheim selten mit dem folgenden.

*Leptogium subtile* Schrad. Körb. Syst. p. 420. *Collema minutissimum* Schaer. Enum. cr. p. 250. Hepp Eur. Fl. Nr. 211. Auf Lehm Boden des Johannisbergs bei Nauheim.

## 2. Laubmoose.

*Ephemerum serratum* Hampe. Schpr. Synops. p. 3. *Phascum* Genth Cr.-Fl. N. p. 143. Auf Lehm Boden am Johannisberg und dem Goldstein bei Nauheim.

*Sphaerangium muticum* Schpr. Synops. p. 13. *Acaulon* C. Müll. D. Laubm. p. 100. *Phascum* Genth Cr.-Fl. N. p. 147. Auf Lehm Boden im Weinberg am Johannisberg, im Löw'schen Thal bei Wisselsheim.

*Phascum bryoides* L. Schpr. Synops. p. 15. C. Müll. D. L. p. 103. Genth Cr.-Fl. N. p. 15. In der ganzen Wetterau auf Lehm- und Thonboden häufig.

*P. curvicolium* Hdw. Schpr. Synops. p. 19. C. Müll. D. L. p. 102. Genth Cr.-Fl. N. p. 150. Am Fußweg von Nauheim nach Friedberg, im Chausseegraben zwischen Friedberg und Oberwöllstadt.

*Pleuridium nitidum* Hdw. Schpr. Synops. p. 23. *Astomum* C. Müll. D. L. p. 96. In der Umgegend von Nauheim nicht selten auf Lehm Boden.

*P. subulatum* Schpr. Synops. p. 24. *Astomum* C. Müll. D. L. p. 96. Genth Cr.-Fl. N. p. 146. An Kiesboden im Goldstein bei Nauheim.

*Weissia cirrhata* Hdw. Schpr. Synops. p. 56. C. Müll. D. L. p. 214. Genth Cr.-Fl. N. p. 166. Auf Silicatsandstein bei Münzenberg sehr häufig, auf Spiriferensandstein bei Ziegenberg und Gransberg, auf Quarzitblöcken des ganzen Taunus.

*Dicranella Schreberi* Schpr. Synops. p. 70. *Angstroemia* C. Müll. D. L. p. 245. *Dicranum* Genth Cr.-Fl. N. p. 192. Auf dem Eisenbahndamme bei Nauheim.

*D. curvata* Schpr. Synops. p. 75. C. Müll. D. L. p. 240. An feuchten Sandsteinfelsen am Kapplerberg bei Marburg.

*Dicranum longifolium* Hdw. Schmpr. Synops. p. 57. C. Müll. D. L. p. 225. Genth Cr.-Fl. N. p. 188. Auf Quarzit im Taunus häufig.

*D. palustre* Lpyl. Schpr. Synops. p. 91. Im Sumpf bei Münzenberg und bei Ockstadt, jedoch steril.

*D. spurium* Hedw. Schpr. Synops. p. 93. C. Müll. D. L. p. 217. Genth Cr.-Fl. N. p. 185. Auf dem Winterstein unterhalb der Felsen häufig.

*Campylopus flexuosus* Brid. Schpr. Synops. p. 97. C. Müll. D. L. p. 231. Auf Silicatsandstein bei Münzenberg.

*Fissidens exilis* Hdw. Schpr. Synops. p. 104. Auf feuchtem Lehm-  
boden in der Nähe des Wasserlochs und in dem Weinberg auf dem Jo-  
hannisberg bei Nauheim.

*Pottia cavifolia* Ehrh. Schpr. Synops. p. 122. C. Müll. D. L. p. 277.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 153. Auf Lehm Boden in der ganzen Wetterau häufig.

*P. minutula*. Schpr. Synops. p. 123. Auf Aeckern bei Kleinkarben.

*P. Heimii* Schpr. Synops. p. 125. C. Müll. D. L. p. 277. Genth  
Cr.-Fl. N. p. 155. Häufig an den Gradirbauten bei Nauheim, auf s. g.  
Salzwiesen bei Münzenberg, Schwalheim, Büdingen und Wisselsheim.

*Didymodon cylindricus* Br. et Schpr. Schpr. Synops. p. 132. Bei  
Münzenberg und bei Wehrheim im Taunus.

*Barbula rigida* Schultz. Schpr. Synops. p. 163. C. Müll. D. L.  
p. 292. Genth Cr.-Fl. N. p. 201. Häufig am Johannisberg und dem  
Salinenhof zu Nauheim.

*B. fallax* Hdw. Schpr. Synops. p. 169. C. Müll. D. L. p. 297.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 205. In Kalksteinbrüchen bei Lang-Göns.

*B. tortuosa* Web. et Mohr. Schpr. Synops. p. 179. C. Müll. D. L.  
p. 294. Genth Cr.-Fl. N. p. 207. An den Mauern der Burg Münzenberg  
und an der Stadtmauer zu Nauheim; an Felsen des Feldberg und Altkühn,  
jedoch stets steril.

*B. latifolia* Br. et Schpr. Schpr. Synops. p. 190. C. Müll. D. L.  
p. 302. Genth Cr.-Fl. N. p. 210. Am Grund alter Pappeln an der Wetter  
bei Wisselsheim und Rödgen, an Aepfelbäumen bei Schwalheim, bis jetzt  
nur bei Wisselsheim mit Früchten.

*Grimmia crinita* Brid. Schpr. Synops. p. 204, *Gümbelia* C. Müll.  
D. L. p. 345. An der Mauer des Friedhofes in Bockenheim häufig.

*G. trichophylla* Greville. Schpr. Synops. p. 213. C. Müll. D. L.  
p. 355. Genth Cr.-Fl. N. p. 174. Auf Silicatsandstein bei Münzenberg, auf  
Spiriferensandstein bei Ziegenberg und Gransberg. An allen Standorten  
in großer Menge und reichlich fructificirend.

*Ulot Ludwigii* Brid. Schpr. Synops. p. 254. C. Müll. D. L. p. 339.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 217. An jungen Buchen im Nauheimer Stadtwald,  
am Winterstein, an Weifstannen im Ockstädter Wald.

*U. Bruchii* Hornsch. Schpr. Synops. p. 257. C. Müll. D. L. p. 340.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 218. An der Rinde junger Buchen am Winterstein,  
im Steinfurter Wald und im Hangenstein bei Gießen.

*U. crispa* Brid. Schpr. Synops. p. 257. C. Müll. D. L. p. 339.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 219. An der Rinde junger Waldbäume in den Wal-  
dungen der Wetterau häufig.

*Orthotrichum fallax* Bruch. Schpr. Synops. p. 264. C. Müll. D. L.  
p. 328. Genth Cr.-Fl. N. p. 222. An Weidenbäumen am Teich bei Nau-  
heim und an der Usa zwischen Nauheim und Friedberg.

*O. fastigiatum* Bruch. Schpr. Synops. p. 266. C. Müll. D. L. p. 328.  
Genth Cr.-Fl. N. p. 222. An Pappeln im Parke zu Nauheim.

*O. leucomitrium* Bruch. Schpr. Synops. p. 276. C. Müll. D. L.  
p. 329. An Linden in Ziegenberg.

*Physcomitrium pyriforme* Brid. Schpr. Synops. p. 315. C. Müll. D. L. p. 133. *Gymnostom.* Genth Cr.-Fl. N. p. 157. Auf Lehm Boden in den Weifsdornhecken am Goldstein und am Johannisberg häufig.

*Enthostodon fasciculare* C. Müll. Schpr. Synops. p. 317. C. Müll. D. L. p. 135. *Gymnostom.* Genth Cr.-Fl. N. p. 157. Auf Erdhäufen zwischen Lollar und dem Staufenberg sehr häufig.

*Bryum pendulum* Schpr. Schpr. Synops. p. 349. *B. cernuum* Br. et Schpr. C. Müll. D. L. p. 185. Auf Sumpfwiesen bei Münzenberg.

*B. alpinum* L. Schpr. Synops. p. 366. C. Müll. D. L. p. 194. Am Brunhildefelsen auf dem Feldberg nicht selten, jedoch nur männl. Pflanzen.

*Bartramia Halleriana* Hdw. Schpr. Synops. p. 419. C. Müll. D. L. p. 261. Genth Cr.-Fl. N. p. 252. An Felsen des Taunus bei Wehrheim, des Feldbergs und Altkühns.

*Camptothecium nitens* Schpr. Synops. p. 530. *Hypn. nitens* C. Müll. D. L. p. 444. Genth Cr.-Fl. N. p. 291. Reichlich fructificirend im Sumpf bei Münzenberg.

*Brachythecium rivulare* Schpr. Schpr. Synops. p. 543. Im Sumpf bei Großenlinden.

*Eurhynchium piliferum* Schpr. Schpr. Synops. p. 557. *Hypn.* C. Müll. D. L. p. 438. Genth Cr.-Fl. N. p. 284. In Tannenpflanzungen in der Nähe des Münzenberger Schlosses, im Nauheimer Stadtwald.

*E. Stokesii* Schpr. Schpr. Synops. p. 563. *Hypn.* C. Müll. D. L. p. 470. Genth Cr.-Fl. N. p. 278. An dem Rand eines Grabens beim Ziegenberger Teich, fructificirend im Steinfurter Wald und im Nauheimer Stadtwald.

*Plagiothecium silesiacum* Br. et Schpr. Schpr. Synops. p. 581. *Hypn.* C. Müll. D. L. p. 417. Genth Cr.-Fl. N. 276. An feuchtliegenden Steinen unter Gebüsch auf dem Johannisberg bei Nauheim.

*P. sylvaticum* Br. et Schpr. Schpr. Synops. p. 585. *Hypn.* Genth Cr.-Fl. N. p. 276. An feuchten Felsen des Johannisbergs und des Wintersteins bei Nauheim.

*Hypnum polygamum* Schpr. Schpr. Synops. p. 604. Auf Sumpfwiesen bei Münzenberg.

*H. incurvatum* Schrad. Schpr. Synops. p. 616. C. Müll. D. L. p. 455. Genth Cr.-Fl. N. p. 300. Auf Basaltgeröll beim Münzenberger Schloß.

*H. arcuatum* Lindbg. Am Rand des Tannenwaldes in der Nähe des Großenlindener Sumpfes. Steril.

*Hylacomium brevirostre* Schpr. Schpr. Synops. p. 655. C. Müll. D. L. p. 473. Genth Cr.-Fl. N. p. 294. Häufig auf den Teichinseln bei Nauheim.

---

VIII.

Laubmoose gesammelt von Verschiedenen.

*Dicranella subulata* Schimp. Am Rande des Solmsbaches bei Braunfels Grf. **R. z. Solms** (Schimp. Flora 1864, S. 213).

*Archidium phascoides* Brid. Hangenstein bei Gießen. Prof. **H. Hoffm.**

*Grimmia pulvinata* var. *pilosissima*. Gedern im Vogelsberg. **H. Hoffm.**

*Heterocladium dimorphum* Br. u. Sch. Auf einem Hügel im Wismarer Wald bei Gießen. Oct. mit Früchten. Prof. **C. Heyer.**

*Hylocomium umbratum* Br. u. Sch. Häufig im Fernewald bei Gießen, im Vogelsberg. Prof. **C. Heyer.**

*Leptobryum pyriforme* Hedw. Kirchberg bei Laubach. Grf. **H. z. Solms.**

*Orthotrichum leucomitrium* Br. Braunfelder Burggarten. Grf. **R. z. Solms.**

*O. tenellum* Br. Laubach. Grf. **R. z. Solms.**

*O. Braunii* Br. u. Sch. An einer Weide an der Nidda bei Assenheim. Grf. **R. z. Solms.**

*Bryum inclinatum* Br. u. Sch. Münzenberger Salzwiesen. Grf. **R. z. Solms.**

*Fissidens incurvus* Schw. District Forstkopf und sonst bei Laubach. Grf. **H. z. Solms.**

*Phascum bryoides* Dickson. (Schimper syn. p. 18). Am 1. März 1864 auf einem chaussirten Wege bei Braunfels zwischen den kleinen Steinen. Grf. **R. z. Solms.**

*Hypnum crista castrensis* L. Kirchberg bei Laubach steril. Grf. **R. z. Solms.**

*Brachythecium rivulare* Br. u. Sch. (Sch. syn. p. 544). Am 15. September 1864 mit Früchten auf Steinen im Mettbach bei Braunfels. Bisher nur steril beobachtet. Grf. **R. z. Solms.**

*Eurhynchium praelongum* Br. u. Sch. var. *δ. abbreviatum* (Sch. syn. p. 560). Am 6. März 1864 im Dicken Berg bei Braunfels auf einzelnen Steinen im Walde. Grf. **R. z. Solms.**

*Hypnum chrysophyllum* Brid. (Sch. p. 102). Am 20. September 1864 auf Dolomit in der Meyenbach bei Burgsolms mit Früchten. Bisher nur steril gefunden. Grf. **R. z. Solms.**

*Hedwigia ciliata* Ehrh. Steinblöcke im Opperröder Wald. **Rofsmann.**

*Leucobryum glaucum* C. M. In der Lindner Mark bei Gießen mehrmals mit reichlichen Früchten gefunden. **Rofsmann.**

*Antitrichia curtipendula* Brid. Auf Felsblöcken im Opperröder Wald, steril; an Buchen hinter dem Forstgarten am Lumpenmannsbrunnen bei Gießen, hier auch mit Früchten beobachtet. **Rofsmann.**

IX.

Verzeichniss der von Dillenius (Catalogus plantarum sponte circa Gissam crescent. Francof. 1719 pag. 213 bis 230) in der Umgebung von Giessen beobachteten Laubmoose.

Mit Benutzung früherer Deutungen aufgestellt von Prof. J. Rofsmann.

(Namen und Reihenfolge wie im **Bauer'schen** Verzeichniss VI. Bericht, S. 61 u. ff.)

- 
1. *Sphagnum cymbifolium* Ehrh. (*Sph. caulif. et ramos. pal., molle cand., reflex. ram., fol. lat. Cat. 229*). Feuchte Wiesen um den Waldbrunnen. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 1.)
  2. *S. acutifolium* Ehrh. (*S. caulif. et ram. pal., molle cand., reflex. ram., fol. ang. Cat. 229*). Sumpfwiesen vor dem Philosophenwald. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 2.)

- 
3. *Pleuridium subulatum* Brid. (*Sphagn. acaul. trich. Cat. 229*.) Hier und da an moosigen Orten, reichlich unter Kiefern beim Philosophenwalde. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 10.) — Jetzt unter Kiefern im Philosophenwalde in Menge R.
  4. *Phascum cuspidatum* Schreb. (*Sph. acaul. fol. in bulb. form. congest., majus Cat. 230*). Hier und da in Gärten und Wäldern. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 11.)
  5. *P. muticum* Schreb. (*Sph. acaul. fol. in bulb. form. cong., minus Cat. 230*). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 12.)

- 
6. *Physcomitrium pyriforme* Brid. (*Bryum parvum erect. pirif. maj. cap., fol. Serp. pell. Cat. 223*). Im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 44, Fig. 6.)
  7. *Funaria hygrometrica* Hedw. (*Br. cap. reflex. pirif., calyptr. quadrang., fol. in bulb. form. cong. Cat. 227*). Stellenweise in Wäldern und Gärten. (Hist. musc. Tab. 52, Fig. 75.)

- 
8. *Pottia truncata* Br. (*Br. exig. erect. parv. subrotund. creberr. cap. rufis, fol. Serp. ang. pell. Cat. 223*). An sandigen Wegen. (Hist. musc. Tab. 45, Fig. 7 F—K.)

Var. *major* (*Gymnostomum intermedium* Turn.) (*Br. parv. erect. subrotund. maj. cap. subfusc., fol. Serp. pell. Cat. 223*). Im Schifftenberger Walde am Grunde von Bäumen. (Hist. musc. l. c. A—E.)

- 
9. *Barbula unguiculata* Hedw. (*Br. angust. virid. fol., cap. erect., brev. pedic. insident., calyptr. falc. vel avium unguic. refer. Cat. 225*).

Nur auf einer (schon zu **Dillen's** Zeiten abgerissenen) Mauer des Kirchhofes. (Hist. musc. Tab. 48, Fig. 47).

Var. (*Br. angust. pallid. fol., cap. erect., longior. pedic. insident., calypt. rectiore* Cat. 225). In Gärten. (Hist. musc. Tab. 48, Fig. 48.)

Var. (*Br. perang. fol. et caulic., fol. rariorib. cinct., capit. erect. e surcul. annotin. egred. Cat. 225*). In Wäldern auf lockerem sandigem Boden. (L. c. Fig. 49.)

10. *Barbula fallax* Schultz (*Br. perang. fol. et caulic., fol. crebrior. et circa extremit. magis congest., cap. erect. ad summit. mag. egred. Cat. 225*). An sandigen Wegen. (Hist. musc. Tab. 48, Fig. 46.)

11. *B. muralis* Hedw. (*Br. erect. cap. trich., fol. lat. congest., in pil. canesc. desinent. Cat. 224*). Auf Mauern und Felsen. (Hist. musc. Tab. 45, Fig. 14.)

12. *B. subulata* Brid. (*Br. erect. long. et acut. falc. cap., calyptr. subfusc., fol. Serp. pell. Cat. 223*). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. Tab. 45, Fig. 10.)

13. *B. ruralis* Hedw. (*Br. erect. falc. cap. trich. fol. lat., extant., in pil. canesc. desinent. Cat. 224*). Hier und da an Wegen, an Baumstämmen und auf Bauernhütten. (Hist. musc. Tab. 45, Fig. 12.)

- 
14. *Leucobryum glaucum* C. M. (*Br. trich. erect. cap., albid., frag. Cat. 225*). In Wäldern. (Hist. musc. Tab. 46, Fig. 20.)

- 
15. *Weisia viridula* Brid. (*Br. trich. exile, erect. cap. in pedic. breviss. Cat. 224*). Im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 48, Fig. 43.)

16. *W. cirrhata* Brid? (*Br. trich. exile, erect. cap. in pedic. long. rubr. Cat. 224 et Br. perangust. et breviss. fol., extremit. stellat. C. 226*). In Wäldern. (Hist. musc. Tab. 48, Fig. 42.)

- 
17. *Ceratodon purpureus* Brid. (*Br. perang. fol. et caulic., fol. crebrior. circa summitat. magis congest., cap. erect. e surcul. annotin. egred. pedic. purp. Cat. 226*). An Wegen und Mauern. (Hist. musc. Tab. 49, Fig. 51.)

Var. (*Br. parv. trich. ramos. erect., cap. subfuscis, in pedic. obscure rubr. Cat. 224*). In Gärten. (L. c. F. 50.)

Var. (*Br. trich. cap. erect., ped. longior. rectis flavo-rubent. Cat. 225*). In Wäldern. (L. c. Fig. 52.)

18. *Dicranum varium* Hedw. (*Br. trich. obscure viresc. cap. cern. Cat. 226*). In Gärten. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 59.)

19. *D. scoparium* Hedw. (*Br. erect. cap. angustifol., caule reclinat. Cat. 222*). In Wäldern. (Hist. musc. Tab. 46, Fig. 16 A, B, C.)

(Vielleicht gehört hierher auch : *Polytrich. minus fol. mollib. et pell. Cat. 222* : im Schiffenberger Walde unter anderen Moosen. L. c. *Var. H.*)

20. *Dicranodontium longirostre* Br. Sch. (*Br. trich. cap. erect., pedic. intort., tenuib., virent. Cat. 225*). Im Giefsener Walde unter *Polytrichum*. (Hist. musc. 373 : in Wäldern um Giefsen häufig, besonders im Giefsener Walde; Tab. 47, Fig. 33, A—E.). — Scheint jetzt ganz zu fehlen R.

---

21. *Hedwigia ciliata* Ehrh. (*Sphagn. caulif. et ramos., saxat., hirsut. incan., cap. virent. Cat. 229*). An Felsen um den Schiffenberg und beim Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 5.) — Beim Schiffenberg und im Hangenstein noch häufig R.
22. *Schistidium apocarpum* Br. Sch. (*Sphagn. caulif. et ramos. saxat., hirsut. virens, cap. obscure rubr. Cat. 229*). An Felsen um den Schiffenberg. (Hist. musc. Tab. 32, Fig. 4.) — Jetzt noch dort, aber auch sonst häufig R.
23. *Racomitrium canescens* Brid. (*Br. trich. erect. cap. lanuginos. Cat. 224*). Reichlich an sandigen Orten und auf trockenen Haiden. (Hist. musc. Tab. 47, Fig. 27.)
24. *Grimmia pulvinata* Hook. (*Br. trich. hirsut. canesc. cap. subrotund. reflex. in perbreuib. ped. Cat. 226 et Br. trich. hirsut. canesc., cap. subrot. erect. in ped. breviss. Cat. 224*). Auf Dächern und mit Erde bedeckten Felsen in Wäldern, p. 224 : auf Erde bedeckten Felsen. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 55, A—C die erstgenannte, D und E die zweite Form.)

---

25. *Encalypta vulgaris* Hedw. (*Br. erect. cap., calyptr. laxa conica, fol. Serp. pell. ang. Cat. 223*). An sandigen Wegen. (Hist. musc. Tab. 45, Fig. 8.)
26. *E. ciliata* Hedw. (*Br. erect. long. et obtus. cap., calyptr. lax. conic., fol. Serp. pell. lat. Cat. 223*). An Felsen im Hangenstein. (Hist. musc. 45, Fig. 9). — Hier noch, aber selten R.
27. *E. streptocarpa* Hedw. (*Hypn. sax. erect., ramul. teret., fol. subrot., satur. virent. Cat. 220*). An der nördlichen Kirchhofmauer. (Hist. musc. 335 : an der nördlichen aus Felsen errichteten Mauer des Giefsener Kirchhofs, ehe sie der Erweiterung wegen abgetragen wurde, sonst nirgends beobachtet, — aber nie mit Früchten; Tab. 43, Fig. 71.) — Vgl. VII. Bericht S. 53.

---

28. *Orthotrichum affine* Schrad. (u. *fastigiatum* Br.? nämlich die Abbildung in Hist. musc. Tab. 55, Fig. 9 besser zu letzterem passend) (*Polytrich. caps. subrot., ped. brevib. insident. calyptr. striat., ter-*

- restre minus ramos. et breve* Cat. 222). Um Wetzlar, — ferner *Polytr. caps. subrot., ped. brevib. insident., calyptr. striata, arbor. minus ramos. et brev.* Cat. 222). An Buchenstämmen im Giefsener Walde.
29. *O. crispum* Hedw. (*Polytr. min. fol. cap.* Cat. 222). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. 433 : in Wäldern; Tab. 55, Fig. 11.)
30. *O. leiocarpum* Br. (*Polytr. caps. subrot., ped. breviss. insident., calyptr. striata, arbor., ramos., maj.* Cat. 222). Am häufigsten an Hainbuchen. (Hist. musc. Tab. 55, Fig. 8.)
- 
31. *Bartramia pomiformis* Hedw. (*Br. trich. viresc., erect. maj. cap. maliform.* Cat. 224). Im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 44, Fig. 1.)  
— Jetzt da noch ziemlich häufig R.
32. *B. fontana* Sw. (*Hypn. pal. erect. trich., ramul. teret., elegant., majus cum varr. minore et minore ramul. copios.* Cat. 220). In Gräbchen um den Waldbrunnen. (Hist. musc. Tab. 44, Fig. 2.)
- 
33. *Bryum crudum* Schreb. (*Br. nitid. cap. reflex., calyptr. surs. vergente, praealt. pedic. e caulic. nov. egredient.* Cat. 227). An Felsen im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 51, Fig. 70, Var. D, E, F.)
34. *B. annotinum* Hedw. (*Br. nitid. fol. Serp. ang. minus et var. color. mutans* Cat. 228). Schattige Orte am Grundelbach. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 68.)  
Hierher auch als sterile Form : *Lichenastrum (forte) Serp. fol.* — im schattigen Buchwald bei Rödgen. (L. c. Var. F.)
35. *B. bimum* Schreb. (*Hypn. pal. erect. brev., fol. brev., tenuib., angust., minus conferes.* Cat. 220). Feuchte Wiesen jenseits des Grundelbachs. (Hist. musc. Tab. 51, Fig. 73.) Diese und die folgende Art nur mit Wahrscheinlichkeit unterschieden.
36. *B. pseudotriquetrum* Schwaegr. (*Br. nitid. fol. Serp. angust. maj.* Cat. 228). In Gräbchen um den Waldbrunnen (*aquae duct. fontis W.*) (Hist. musc. Tab. 51, Fig. 72.)
37. *B. capillare* Hedw. (*Br. capit. reflex., fol. lat., congest.* Cat. 227). Stellenweise in Wäldern und Gärten. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 67.)  
Größere Waldform (*Br. nitid. fol. Serp. pell., capit. reflex. e surcul. annot. et marcid. egred.* Cat. 227). Feuchtere Orte in Wäldern.
38. *B. caespitium* L. (*Br. trich. capit. reflex., pedic. ima mediat. rubr., summa luteo-virent.* Cat. 226). In Gärten. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 66.)
39. *B. argenteum* L. (*Br. capit. subrot. reflex., caulic. teret. argent.* Cat. 226). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 62.)  
*β. majus* (*B. julaceum* Schrad.) (*Br. trich. capit. reflex., viridiss., holoseri.* Cat. 226). An dem neuen Steinweg nach dem Nahrungsberg. (Hist. musc. Tab. 50, Fig. 63.)
-

40. *Mnium punctatum* Hedw. (*Br. nitid. fol. Serp. pelluc. rotund., capit. cern. majusc. e caulic. veter. egred. Cat. 227*). Im Hangenstein (Hist. musc. Tab. 53, Fig. 81, D—L.)
41. *M. undulatum* Hedw. (*Br. nitid. fol. oblong. undat., cap. cern., arbusc. referens Cat. 227*). In schattigen Wäldern am Grunde von Bäumen. (Hist. musc. Tab. 52, Fig. 76.)
42. *M. hornum* L. (*Br. nitid. fol. Serp. angust. med. Cat. 228*). An Gräben feuchter Wiesen vor dem Philosophenwalde. (Hist. musc. Tab. 51, Fig. 71 H.)
43. *M. serratum* Brid.? (*Br. erect. capit. oblong. majusc., minus rubent., fol. oblong. angust. nitid. pelluc., valde tenuib. et dilute virent., caulic. rubent. Cat. 223*). Im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 46, Fig. 17.)
44. *M. cuspidatum* Hedw. (*Br. nitid., fol. Serp. pelluc. oblong., capit. cern. majusc. e caulic. novis et virent. egred. Cat. 227*). Auf feuchten Wiesen, besonders denen, welche jenseits des Grundelbaches liegen. (Hist. musc. Tab. 53, Fig. 79, A—C.)

Hierher auch : *Br. nitid. fol. Serp. pell. subrot. elat. Cat. 228* : an Gräben (Hist. musc. l. c. Var. E), ferner ? *Br. nitid. fol. infer. Serp., superior. mag. angust. et oblong. Cat. 228* : am Grunde von Bäumen (l. c. Var. F), und *Lichenastr. Trichom. facie, majus Cat. 213* : auf feuchten Wiesen (l. c. Var. G—L), — letztere beide steril.

45. *Aulacomnion palustre* Schwäg. (*Hypn. pal. erect. brev., ramis long., fol. angust. Cat. 219*). Auf feuchten Wiesen um den Waldbrunnen. (Hist. musc. Tab. 31, Fig. 3.)

- 
46. *Catharinea undulata* Web. et Mohr (*Br. erect. capit. oblong., rubent., fol. oblong., angust. pelluc. Cat. 222*). In Wäldern. (Hist. musc. Tab. 46, Fig. 18.)
  47. *Polytrichum nanum* Hedw. (*Polytr. minus, capsul. (sub-)rotundis, calypt. quasi lacera coron. Cat. 221*). Unter Kiefern (in *Pinastretulo*) beim Philosophenwalde. (Hist. musc. Tab. 55, Fig. 6.)
  48. *P. juniperinum* Willd. (*Polytr. montan. et minus, caps. quadrang. Cat. 221*). Auf dem Tripp. (Hist. musc. Tab. 54, Fig. 2.)
  49. *P. commune* L. (*Polytr. vulg. et majus, caps. quadrang. Cat. 221*). In den meisten Wäldern. (Hist. musc. Tab. 54, Fig. 1.)\*)

- 
50. *Fontinalis antipyretica* L. (*Selago aquat. fol. pell. triang. acut. et complic. cinct. Cat. 230*). In Gräbchen auf den Wiesen vor dem

---

\*) Bei *P. piliferum* Schreb. sagt Dill. Hist. musc. S. 426 : nascitur locis montosis sicciorib., arenos., in Germania aequae ac Anglia. Sollte er es nicht vielleicht auch bei Giefsen noch beobachtet haben, wo es nicht selten vorkommt? Im Catal. ist es aber nicht angeführt.

nördlichen Thore, — nie mit Früchten beobachtet. (Hist. musc. Tab. 33, Fig. 1.)

51. *Anomodon viticulosus* Hook. (*Hypn. rep. trich. arbor. maj. cap. et surcul. erect., non ramos.* Cat. 216). In allen Wäldern. (Hist. musc. Tab. 39, Fig. 43.)
52. *A. curtipendulus* Hook. (*H. arb. rep., cap. reflex., brev. pedic. insident.* Cat. 220). An Bäumen in Wäldern. (Hist. musc. Tab. 43, Fig. 69.)
53. *Leskea complanata* Hedw. (*H. rep. filic. fol. ramos., ramul. appress. et mag. complanat.* Cat. 218.) An Hainbuchen. (Hist. musc. Tab. 34, Fig. 7.)
54. *L. sericea* Hedw. (*H. rep. trich. terrestre, luteo-virens., vulg. maj. cap. erect.* Cat. 215). Vorzugsweise an Mauern. (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 59.)
55. *L. polyantha* Hedw. (*H. rep. trich. terr. prior. virid. et minus, cap. cern., min. tumid.* Cat. 216). Im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 62.)
56. *L. paludosa* Schwägr.? (*H. rep. filicifol. ramos., ramul. surrect. et minus complanat.* Cat. 218). An Baumstämmen und feuchtem Gesträuch. (Hist. musc. Tab. 37, Fig. 27 Var. B.)
57. *L. polycarpa* Ehrh. (*H. rep. trich. arbor. med., capit. erect.* Cat. 216). An Eichen. (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 65.)
58. *L. attenuata* Hedw. (*H. rep. trich. arb. maj. caulic. ramos.* Cat. 216). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. 331 : an Baumstämmen im Hangenstein und andern Wäldern um Giefsen). (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 66.)
59. *Hypnum abietinum* L. (*H. rep. filic. trich. mont., ramul. teret., lulesc., non divis.* Cat. 218). Auf der Haardt und an Felsen beim Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 35, Fig. 17.)
60. *H. tamariscinum* Hedw. (*H. rep. filic. minus, luteo-virens* Cat. 217). An Baumstämmen und Stöcken im Hangenstein und der Lindner Mark. (Hist. musc. Tab. 35, Fig. 14.)
61. *H. Alopecurum* L. (*H. pal. erect. arbusc. refer., ramul. subrot.* Cat. 220). Auf feuchten Wiesen am Fürstenbrunnen und an feuchten Stellen im Schiftenberger Wald. (Hist. musc. Tab. 41, Fig. 49.)\*
62. *H. splendens* Hedw. (*H. rep. filic., veluti spicat.* Cat. 217). In Wäldern. (Hist. musc. Tab. 35, Fig. 13.)
63. *H. fluitans* L. (*H. erect. aut fluit. aequat., fol. oblong. perang. acut.* Cat. 219). In Wiesengrübchen. (Hist. musc. Tab. 38, Fig. 33.)
64. *H. rugosum* Ehrh. (*H. rep. crisp. lulesc. mont. et maj.* Cat. 217). Auf der Haardt. (Hist. musc. Tab. 37, Fig. 24.)

---

\*) Von *H. myurum* Poll. (Hist. musc. Tab. 41, Fig. 50) sagt Dill. Hist. musc. S. 317 : frequens in Germania non minus, quam in Anglia. Im Cat. fehlt es aber. — Ebenso *Leucodon sciuroides* Schw.

*Var. (H. rep. luteo-vir. pal., minus crisp. et brev. Cat. 217).*

Im Gießener Walde gegen den Schifftenberg. (L. c. Var. D.)

65. *H. cupressiforme* L. (*H. rep. crisp. cupressif. maj. Cat. 217*). An Bäumen sehr häufig. (Hist. musc. Tab. 37, Fig. 23 A.)

*Var. (H. rep. crisp. cupressif. minus, fol. minus confert. Cat. 217).* An Baumstämmen und Felsen im Schifftenberger Walde.

(L. c. Var. C.)

*Var. (H. rep. crisp. cupressif. minus, fol. mag. confert. Cat. 217).* Auf der Haardt und im Schifftenberger Walde. L. c.

Var. B.)

*Var. H. rep. trich. arb. capit. majusc. oblong. erect. Cat. 216).* An Bäumen. (L. c. Var. D.)

*Var. ? (H. arb. erect. fruticul. spec., ramul. compress. Cat. 220).* Am Grunde von Bäumen und an Sträuchern im Hangenstein. (L. c. Tab. 36, Fig. 22, C.)

66. *H. molluscum* Hedw. *var. (H. rep. filic. fol. in adunc. mucron. abeuntib. Cat. 217).* Im Schifftenberger Walde. (Hist. musc. Tab. 36, Fig. 22 A und B.)

67. *H. filicinum* L. *var. trichodes (H. rep. filic. trich. pal. Cat. 218).* Auf höher gelegenen Sumpfwiesen jenseits des Grundelbachs. (Hist. musc. Tab. 36, Fig. 21.)

68. *H. squarrosum* L. (*H. rep. triangul. reflex. fol. Cat. 219*). Auf allen Wiesen. (Hist. musc. Tab. 39, Fig. 38.)

69. *H. triquetrum* L. (*H. rep. triang. maj. fol. Cat. 219*). Reichlich in Wäldern. (Hist. musc. Tab. 38, Fig. 28.)

70. *H. praelongum* L. (*H. rep. fil. triang. fol. praelong. Cat. 219*). An Felsen und halbfaulem Holze. (Hist. musc. Tab. 35, Fig. 15 A.)

*Var. abbreviatum (H. rep. filic. triang. fol. brev. Cat. 219).* Am Grundelbach. (L. c. Var. B.)

71. *H. denticulatum* L. (*H. rep. filicif. non ramos., ped. et capit. long., fol. utring. duplic. Cat. 218*). Am Schindanger und auf den feuchten Wiesen jenseits des Grundelbaches neben *Aulacomnion androgynum* (s. Nr. 82). (Hist. musc. Tab. 34, Fig. 5.)

72. *H. rusciforme* Neck. (*H. fol. ruscif., caps. subrot.*). (Hist. musc. 298). In Gräbchen und zusammengeflossenem Schneewasser im Wismarer Walde. (Hist. musc. Tab. 38, Fig. 31.)

*Var. (H. rep. saxat. triang. angust. fol., praelong., ramul. spars. Cat. 219).* An Steinen in Quellen im Schifftenberger Walde. (Hist. musc. Tab. 39, Fig. 42.)

*Var. prolixum (H. pal. erect. praelong. minus ramos., latior. et triang. fol. Cat. 219).* In Wiesengräbchen, — nach Hist. musc. 299 besonders am Waldbrunnen. (L. c. Tab. 38, Fig. 32; Tab. 85, Fig. 20.)

73. *H. purum* L. (*H. terr. erect., ramul. teret., fol. inter rotund. et acut. med. mod. se habent. Cat. 220*). In Piceto und im Schifftenberger Walde auf Felsen. (Hist. musc. Tab. 40, Fig. 45.)

- Var. (*H. illecebrum* Brid., non L.) (*H. terr. erect., ramul. teret., fol. subrot. albo-virent. cinct. Cat. 220*). Im Schiftenberger Wald und sonst unter anderen Moosen auf der Erde. (L. c. Tab. 40, Fig. 46.)
74. *H. cuspidatum* L. (*H. rep. pal. fol. triang. per caul. expans., extremil. convolut. et acuminat. Cat. 219*). Auf moosigen Wiesen jenseits des Grundelbaches gegen Rödgen. (Hist. musc. Tab. 39, Fig. 34.)
75. *H. serpens* L. (*H. rep. trich. terr. minim., cap. majusc. oblong. erect. Cat. 216*). Ohne spec. Standort. (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 64.)  
Var. (*H. rep. trich. arbor. minus, cap. erect. Cat. 216*). An Bäumen.
76. *H. salebrosum* Hoffm.? (*H. rep. filic. pennat. Cat. 218*). In Wäldern an Steinen. (Hist. musc. Tab. 35, Fig. 16.)
77. *H. nitens* Schreb. (*H. pal. erect. trich., ramul. crebr. luteo et rufo-virent glabris Cat. 220*). Feuchte Wiesen beim Philosophenwalde und jenseits des Grundelbaches. (Hist. musc. Tab. 39, Fig. 37.)
78. *H. velutinum* L. (*H. rep. trich. terr. virid. minus, cap. tumid. cern. Cat. 216*). An Baumstämmen. (Hist. musc. Tab. 42, Fig. 61.)
79. *H. rutabulum* L. (*H. rep. triang. fol. angust. Cat. 219*). Am Grunde von Bäumen und an faulenden Stöcken. (Hist. musc. Tab. 38, Fig. 29 A.)  
Var.? *H. pal. erect. brev., fol. brev. ang. tenuib. confertis Cat. 219*. Feuchte Orte im Schiftenberger Walde. (L. c. Var. B, C.)
- 
80. *Neckera crispa* Hedw. (*H. rep. crisp. ramul. compress. filic. more dispos. Cat. 217*). An Steinen und Felsen im Hangenstein. (Hist. musc. Tab. 36, Fig. 12.) — Hier noch jetzt. R.
- 
81. *Fissidens bryoides* Hedw. (*H. rep. filicif. non ramos., ped. et cap. brev., fol. utring. simplicib. Cat. 218*). Auf dem höchsten Scheitel des Hangensteins. (Hist. musc. Tab. 34, Fig. 1.)
- 
- 82 (nach 45 einzureihen). *Aulacomnion androgynum* Schwägr. (*Mnium perang. et brev. fol. Cat. 214 u. app. 84 Tab. I, Fig. A, B, C, Hist. musc. XXXI, 1*). An den Stöcken abgehauener Sträucher auf den hochgelegenen feuchten und moosigen Wiesen, welche jenseits des Grundelbaches gegen Rödgen liegen.

## L i t t e r a t u r.

Prof. Hoffmann veröffentlichte in der botanischen Zeitung 1863 S. 73 u. ff. den Anfang einer Sylloge der Pilze aus der Mittelrheingegend, insbesondere dem Großherzogthum Hessen (200 Arten). Vgl. auch Nr. II dieses Berichtes.

**Ferd. Kretzer** publicirte „Einige Nachträge zu der Uebersicht der Gefäßkryptogamen der Wetterau des H. G. Ph. Rufs“ im III. Berichte des Offenbacher Vereins für Naturkunde.

In dem Jahresberichte der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau über die beiden Gesellschaftsjahre 1861 bis 1863 finden sich S. 116 u. ff. : „Nachträge von Fundorten, Arten und Unterarten zu der in unserer Festschrift 1858 (Naturhistorische Abhandlungen aus dem Gebiete der Wetterau. Eine Festgabe d. Wett. Ges. f. d. g. Naturkunde zu Hanau bei ihrer 50jährigen Jubelfeier am 11. Aug. 1858) gegebenen Uebersicht der Gefäßkryptogamen, Laub- und Lebermoose der Wetterau.“  
Von G. Ph. Rufs.

---

## V.

### Beiträge zur Geologie des hess. Odenwaldes,

mineralogische und geologische Beobachtungen in den Jahren 1857—1859  
von Herrn **P. Seibert** in Bensheim.

---

Der Theil des Odenwaldes, welcher in Folgendem näher beschrieben werden soll, ist die Section Erbach der Großherzoglich Hessischen Generalstabskarte.

Der östliche Theil des Gebietes wird von Sediment- und der westliche von krystallinischen Silicatgesteinen gebildet. Letztere sind zonenweise und in regelmässigem Wechsel angeordnet; sie lagern in parallelen zwischen 3 und 5 Uhr streichenden Bändern neben und hinter einander und sind oft so innig verwachsen, daß eine scharfe Grenze nicht gezogen werden kann. Wenn in Folgendem von verschiedenen Formationen als Granit-, Gneus-, Syenit-, Glimmerschieferformation u. s. w. die Rede ist, so hat dies keinen geologischen Sinn. Diese Formationen sind vielmehr als Glieder einer einzigen großen Gebirgsformation zu betrachten. Nicht ein Beispiel ist mir bekannt, wo man aus den Lagerungsverhältnissen auf verschiedene Zeiträume der Entstehung schließen könnte.

Wir unterscheiden :

#### **I. Krystallinische Gesteine.**

A. Lagerungsverhältnisse. B. Beschreibung.

##### **1. Krystallinische Schiefergesteine.**

- 1) Gneus,
- 2) Felsitschiefer,
- 3) Glimmerschiefer,
- 4) Granulitschiefer,

- 5) Quarzschiefer,
- 6) Syenit- und Grünschiefer,
- 7) Hornblendeschiefer,

## 2. Krystallinische Massengesteine.

- 1) Granit,
- 2) Granulit,
- 3) Felsit,
- 4) Syenit,
- 5) Hornblendefels,
- 6) Gangquarz,
- 7) Körniger Kalk.

## II. Sedimentgesteine.

### A. Permische Zeit.

Zechsteindolomit (Rauchkalk).

### B. Trias.

- 1) Buntsandstein,
- 2) Röth,
- 3) Muschelkalk.

### C. Diluvium.

Löfs, Lehm, Sand und Grand.

### D. Alluvium.

Torf, Sand, Thon.

## III. Eruptivgesteine.

Basalt.

### I. Die krystallinischen Gesteine.

#### A. Lagerungsverhältnisse.

Die krystallinischen Gesteine der vorliegenden Sectionskarte sind aus vier einfachen Mineralien zusammengesetzt, nämlich aus Quarz, welcher sich als Fett-, Milch- und Rosenquarz darstellt; aus Feldspath, der als Ortho- und Oligoklas, als Albit und Labrador auftritt; aus Glimmer, als Magnesia- und Kaliglimmer, und aus Hornblende. Diesen vier Hauptbestandtheilen sind verschiedene andere Mineralien als accessorische Bestandtheile beigemengt. Die krystallinischen Gesteine der Section Erbach sind in achtzehn nordöstlich streichenden Zonen gruppirt und zerfallen in zwei wesentlich von einander verschiedenen Gruppen, in die krystallinisch-körnigen und in die krystallinisch-schiefrigen Gesteine. Erstere nehmen  $\frac{2}{3}$ , letztere  $\frac{1}{3}$  der durch die Karte begrenzten Fläche ein. Die achtzehn Zonen setzen in die angrenzenden Sectionen fort und folgen in der Richtung von Nordwest nach Südost wie folgt aufeinander.

**1. Zone.** Nd. Beerbach, Forst Böll, Frankenhausen, Nd. Modau.

Syenit, Syenitschiefer (Grünschiefer) und Granulit in parallelen zwischen 3 und 5 Uhr streichenden und regelmässig wechselnden und regelmässig wechselnden Streifen angeordnet. Darin die magnetischen Lager des Frankensteiner Gabbros und Gabbroschiefers, sowie die Schwerspathputzen zwischen Frankenhausen und Nd. Modau.

**2. Zone.** Stettbach, Steigerts, Allertshofen, Hoxhohl, Webern, Hotte Kernbach, Ober- und Nd. Hausen, Higgelsbach, Großbieberau, Lichtenberg, Rodau, Rohrbach, Afsbach, Kleinbieberau, Herchenrode, Ernthofen, Ob. Modau, Neutsch, Ob. Beerbach, Tannenberg bei Jugenheim.

Granit, Granulit, Felsit, Felsitschiefer, Syenit und Syenitschiefer gleichfalls wie alle folgenden Streifen in regelmässigem Wechsel und in parallelen Bändern neben und hinter einander gelagert und zwischen 3 und 5 Uhr streichend. Darin das Kalkspathlager von Ernthofen, die Milchquarzausscheidungen zwischen Oberbeerbach und Steigerts, sowie auf der Neutscher Strafse zwischen Frankenhausen und dem Neutscher Hofe.

**3. Zone.** Hainzenklingerhof zwischen Stettbach und Balkhausen.

Syenitschiefer, Felsit, Felsitschiefer, Gneus. Darin das Amphibolitlager zwischen Balkhausen und Quatelbach am Nordabhang des Felsbergs.

**4. Zone.** Quatelbach, Staffel, Schmalbeerbach, Wurzelbach und Nordabhang des Felsbergs.

Gneus feinkörniger (schiefriger Granulit). Darin der Felsitschieferstreifen, welcher von Hoxhohl nach Schmalbeerbach in Stunde 3 und 5 streicht. Bänke, Schmitzen und Geoden von Granit, Granulit Syenit u. s. w.\*).

**5. Zone.** Teufelsberg bei Hochstetten, Südwestabhang des Felsbergs, Beedenkirchen, Hasenberg bei Brandau, Webern.

Syenit. Granulit in Schmitzen und Schnüren.

**6. Zone.** Elmshausen (Bergabhang der Striet zu), Lautern, Brandau, Webern.

Gneus und Syenit in regelmässigem Wechsel; Streichen hora

---

\*) Siehe Text zur Section Worms.

3 und 5. Gneus vorherrschend. Darin Schnüren und Geoden von Granulit und Felsit.

**7. Zone.** Hohberg bei Elmshausen (zum Theil), Haidebusch, Reichenbach, Bohl, nördliches Gadernheim bis zur Nähe des Lichte Brunnens.

Syenit. Schnüren, Streifen und Bänke von Felsit und Granulit. Darin ein Theil des Reichenbacher Quarzganges.

**8. Zone.** Bergrücken zwischen Wilmshausen und dem Schneckenberg, Knoder Kopf, Gronau (Eichelberg), Schannenbach, Knoden, Hohenstein, Raidelbach, Breitenwiesen, Glattbach, Winkel, Winterkasten, Laudenu, Erlau, Güttersbach, Wersau, Gadernheim, Lützelbach, Steinau, Mefsbach, Billings, Nonrod, Neunkirchen.

Syenit und Gneus in hora 3 und 5 streichenden Massen mit vielen untergeordneten porphyrtigen Granitstöcken. Lager von Felsit. Darin die Quarzgänge von Reichenbach und Knoden; das graphithaltige Syenitschieferlager von Laudenu.

**9. Zone.** Gronau.

Granit und Syenit in regelmäsigem Wechsel in hora 3 und 5 streichenden Massen. Streifen von Felsit und Granulit.

**10. Zone.** Glattbach, Kolmbach, Schleichhöhe.

Syenitschiefer. Syenit in Stöcken, Granulit in Schmitzen und Schnüren; Gneus in Streifen. Darin die graphithaltigen Quarzschieferlager von Gadernheim, Kolmbach, Glattbach, Neuthal und der Schleichhöhle bei Winterkasten.

**11. Zone.** Ob. Hambach, Lindenstein.

Gneus und Syenit in hora 3 und 5 streichenden Streifen mit regelmäsigem Wechsel. Gneus vorherrschend. Granulitstreifen, Hornblendefelseinlagerungen, Fettquarzausscheidungen. Darin das graphithaltige Quarzschieferlager in dem Fahrweg von Ob. Hambach nach Mittershausen.

**12. Zone.** Heiligenberg bei Gronau, Krehberg, Seidenbuch, Kaffersberg, Laudenu, Eberbach.

Syenit. Granulit in Schnüren; Gneus in Lagern bei Winkel und Eberbach. Stücke von Amphibolit bei Laudenu und im Heiligenberg.

**13. Zone.** Fischweiher, Görzklingen, Silbergrubenkopf, Kellersberg, Mittershausen, Scheuerberg, Seidenbach, Schlierbach.

Syenitschiefer, Glimmerschiefer, Gneus, Granit, Felsit, Syenit. — Granulit in Schnüren. Darin die graphithaltigen

Quarzschieferlager von Görzklingen, Mittershausen, Seiden- und Eulsbach.

**14. Zone.** Erlenbach, Eulsbach, Lindenfels, Kl. Gumpen, Reichelsheim.

Gneus; untergeordnete Granit- und Syenitstücke. Darin der Basaltgang von Eulsbach und das graphithaltige Quarzschieferlager zwischen Winterkasten und Kl. Gumpen; der Syenitschieferstreifen von Faustenbach.

**15. Zone.** Erbach, Ob. Laudenbach, Ob. Liebersbach, Kl. und Gr. Breitenbach, Bonsweiher, Juhhöhe, Sonderbach, Kirschhausen, Walderlenbach, Albersbach, Mittlechtern, Lautenweschnitz, Igelsbach, Mittershausen, Erlenbach, Linnenbach, Fürth, Ellenbach, Seehof, Gumpner Kreuz, Gr. Gumpen, Schmelz- und Klöfsbuckel, Leinberg und Frohnhofen.

Porphyrtiger Syenit. Schnüren und Schmitzen von Granulit (Leinberg, Linnebach u. s. w.); Lager und Stücke von Granit (Walderlenbach, Sonderbach u. s. w.), in hora 3 und 5 streichenden Streifen von dichtem, blauschwarzem, auch grauem dem Syenitschiefer ähnlichem Syenit. Darin die Quarzgänge von Ob. Liebersbach, Ob. Laudenbach, Bonsweiher, Erbach, Lautenweschnitz, Linnenbach, Ellenbach, Leinberg; der Basaltgang von Walderlenbach; Schwerspathputzen und Nester bei Linnenbach, Lautenweschnitz und Krumbach.

**16. Zone.** Zotzenbach, Minschbach, Steinbach, Fürth, Krumbach, Stotz, Brombach, Altlechtern, Ob. Scharbach, Tromm.

Granit und Granulit. Granit vorwaltend. Granulit in hora 3 und 5 streichenden Streifen. Granulit schiefrig und durch Eisenoxydul hell- bis schwarzgrün gefärbt (Leberbach).

**17. Zone.** Leberbach, Eselstein, Ob. Ostern.

Porphyrtiger Syenitschiefer, Syenit, Granulit in parallelen zwischen 3 und 5 Uhr streichenden Streifen. Darin der Schwerspathgang von Weschnitz.

**18. Zone.** Scharbach, Hammelbach, Weschnitz, Ostern, Rohrbach, Erzbach, Bakenrod, Frohnhofen, Pfaffenbeerfurt, Michelbach, fränk. Krumbach, Bierbach, Brensbach, Höllenbach, Hassenroth, Hummertroth, Mummernroth, Gumpersberg, Wallbach, Kilsbach, Nd. und Ob. Keinsbach, Böllstein.  
Hembach, Gersprenz, Kirchbeerfurt.

Schieferiger und körniger Gneus in Stunde 3 und 5 streichenden Massen und Lagern.

Darin : 1) Die in Stunde  $8\frac{1}{2}$  streichenden Schwerspathgänge von Ostern, Kirchbeurfurt, Nd.- und Ob. Keinsbach, Stierbach, Birket, Gumpersberg, Hummertroth u. s. w.

2) Die Schriftgranit- und Feldspathlager von Erzbach, Ostern, Bockenrod, Ob.- und Nd. Keinsbach, Böllstein, Hembach, Langenbrombach, Kirchbrombach, Wallbach, Birket, Gumpersberg, Hummertroth, Brensbach, Höllerbach u. s. w.

3) Die Syenitlager bei Wallbach, Rohrbach und in der Hirschet bei Ob. Keinsbach.

4) Die Hornblendeschieferlager von Mummernroth und Kilsbach; Hornblendefelsputzen bei Oberkeinsbach.

5) Die körnigen Kalkgeoden von Bier- und Höllerbach.

6) Die Quarzschieferlager von Michelbach, Scharbach und fränkisch Krumbach.

## B. Beschreibung der krystallinischen Gesteine.

### I. Die krystallinischen Schiefergesteine.

#### 1. Der Gneus.

Der Gneus ist die verbreitetste Felsart in der Section Erbach; er ist von verschiedener Varietät und zonenweise angeordnet. Ich unterscheide schiefrigen und körnigen Gneus. Ersterer besteht aus dünnen Schichtenblättern; letzterer aus dickern Schichtenbänken. Die Gneuszonen haben ein Hauptstreichen von Südwest nach Nordost.

#### A. Der schiefrige Gneus.

Der schiefrige Gneus findet seine größte Verbreitung im östlichen Theile unserer Karte. Als breiter Zug kommt er in Verbindung mit körnigem Gneuse vom Otzberg (Section Dieburg) herein und setzt das ganze zwischen der Gersprenz und Buntsandsteingrenze gelegene Gebiet von Hassenroth über Brensbach, Wersau, Bierbach, Krumbach, Michelbach, Pfaffenbeurfurth und Bockenrod zusammen. Bei Reichelsheim theilt sich diese große Gneuszone in zwei schmale Streifen, wovon der eine zwischen Syenit, Grünschiefer, Granit und Buntsandstein über Weschnitz, Hammelbach und Litzelbach fortsetzt und unterhalb Scharbach in den porphyrtartigen Granit der Tromm übergeht, während der andere Streifen sich über Lindenfels erstreckt und unterhalb Erlenbach zwischen Syenit, Grün- und Glimmerschiefer sein Ende erreicht. Der schiefrige Gneus besteht aus röthlichweißem bis blüthenweißem Orthoklas, grauem Fettquarz und schwarzem graubraunem Glimmer, welcher durch die Verwitterung zuweilen goldgelb wird; nur ganz untergeordnete Parthien haben silberweißen, durch Eisen häufig bunt gefärbten Kaliglimmer. So bei Ostern in der Umgebung der Schwerspathgänge. Orthoklas und Quarz sind in dünnen Lamellen zwischen die Glimmerblättchen vertheilt. Auf dem Querbruche zeigt sich deutlich die gebänderte Structur, während auf dem der Spaltungsfläche parallelen Hauptbruche das Gestein nur aus Glimmer

zu bestehen scheint. Der Orthoklas ist sehr häufig in zolllangen röthlichweißen Prismen ausgeschieden. So bei Erzbach, Bockenrod, Hutzwiese, Ob. Keinsbach, Wallbach und im Hauptfahrwege von Gumpersberg nach der Böllsteiner Höhe. Der schiefrige Gneus hat theils horizontale Lage oder ist nur schwach gegen den Horizont geneigt (Chaussee zwischen Kirchbeersfurt und Bockenrod), theils fällt er unter Winkeln von 30 bis 50 Grad nach Südost, Südwest und Nordwest ein. Besonders charakteristisch ist das geschilderte Gneusgebiet durch zahlreiche Gangbildungen von Schwerspath, sowie durch mächtige Ausscheidungen von Fettquarz und Schriftgranit. Die Fett- und Milchquarzlager sind 2 bis 5 Fufs breit. Besonders zeichnet sich der Kilzestein bei Obergersprenz und die Gegend von Annelsbach durch solche Lager aus. Der Schriftgranit bildet Stücke, lagerhafte Gänge und Schnüren im Gneuse, welche das Gebiet in grosser Anzahl durchschneiden und in hora 7 des Bergcompasses streichen. Milchquarz, Orthoklas und Glimmer sind in mächtigen linsen- und tafelförmigen Körpern zu Tage ausgeschieden; in der Tiefe fehlt der Glimmer meistens ganz und der Orthoklas ist von verzerrten Fettquarzkristallen durchdrungen, wodurch sehr oft und sehr schön der hebräische Stein gebildet wird. Diese Granitlager, welche zuweilen eine Mächtigkeit erreichen, die zwischen 1 und 6 Fufs schwankt, werden bei Böllstein, Hembach, Ob. Keinsbach, Gersprenz und Langenbrombach auf Feldspath betrieben. Sie sind die Fundstätte der im Gneuse eingeschlossenen Mineralien als Granat, Turmalin, Glimmer und Beryll, welche in schön ausgebildeten Krystallen sowohl im Orthoklas als im Milchquarz vorkommen. Die im schiefrigen Gneuse in Stunde 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> aufsitzenden Schwerspathgänge sind von nicht beträchtlicher Ausdehnung, erreichen eine Mächtigkeit von 3 bis 16 Fufs, setzen in der Regel nicht weit in die Tiefe, haben verwittertes, thoniges Saalband und werden bei Oberkeinsbach, Birket, Ostern und Weschnitz auf Schwerspath betrieben. Der Schwerspath ist durch Chaledon, Quarz, Eisen und Mangan unrein und verursacht dadurch den Grubenbesitzern im Handel oft empfindliche Verluste, da es bei der Verwendung desselben zu weißer Farbe auf möglichste Reinheit des Spathe ankommt.

In Drusenräumen finden sich häufig prachtvolle Schwerspathkrystalle von blauen, gelben, braunen, weißen und wasserhellen Farben\*).

Noch sind im schiefrigen Gneuse zu erwähnen: unbedeutende Hornblendefelsmassen bei Ob. Keinsbach; Syenitlager in der Hirschet bei Ob. Keinsbach, bei Rohr- und Wallbach; zwei Hornblendeschieferparthien bei Mummernroth und Kilsbach, sowie die körnigen Kalklager von Bier- und Höllerbach.

---

\*) Siehe meine Abhandlungen im 1855 Jahresbericht für Natur- und Heilkunde zu Gießen; im Notizblatt des Vereins für Erdkunde u. s. w. zu Darmstadt. I. Jahrgang 1858, S. 47.

*Erzlager im schiefrig-körnigen Gneusgebiete.*

Die im schiefrig-körnigen Gneuse auftretenden Erze beschränken sich auf Roth-, Gelb-, Braun- und Schwarzeisensteine, welche als secundäre Erzeugnisse zu betrachten und nicht bauwürdig sind. Man findet den Rotheisenstein als Eisenglanz und Eisenrahm bei Forstel und Böllstein, zwischen Birket und Mittelkinzig, bei Ob. Keinsbach, Erzbach und Scharbach; den Brauneisenstein zwischen Böllstein und der Spreng längs der Buntsandsteingrenze; den Schwarzeisenstein, stark manganhaltig, bei Langenbrombach und an den vier Stöcken bei Ob. Keinsbach; den Gelbeisenstein, gleichfalls als Eisenkiesel in mächtigen Blöcken bei Hummertroth, Ob. und Mittelkinzig, bei Langenbrombach und im großen Dinger bei Ob. Keinsbach. Die von Eisen und Mangan imprägnirten Quarzblöcke sind theils als Ausscheidungen im Gneuse zu betrachten; theils hängen dieselben innig mit dem Rauchkalke der Zechsteinformation zusammen und haben dann eine andere Entstehungsweise, von der weiter unten die Rede sein wird. Die Eisenkiesel enthalten zuweilen Prasem und in kleinen Drusen Ametyst und Umhüllungspseudomorphosen von Chalzedon nach Quarzformen.

B. Der körnige Gneus.

Der körnige Gneus besteht aus Orthoklas, Fettquarz und Glimmer. Der Glimmer ist Kaliglimmer von weißer, grauer und schwarzbrauner Farbe und in nicht zusammenhängenden Blättchen zwischen die Feldspath- und Quarzkörner vertheilt. Der Orthoklas ist grau, fleischroth, weiß, und die Ursache der in Farbe so mannigfach variirenden Gneuse. Ich unterscheide porphyartigen, fein- und grobkörnigen Gneus. Ausser dem schiefrig-körnigen Gneusterrain wird der ganze westliche Theil der Karte von der Bergstrasse bis zur Gersprenz von körnigem mit Granit und Syenit regelmässig wechselndem und zonenweise angeordnetem Gneuse gebildet.

Der porphyartige Gneus findet seine größte Verbreitung in der Neunkircher-Höhe und ihren Verzweigungen, wechselt da mit Syenit und enthält Hornblendefelslager, feinkörnige Gneusparthien und mächtig entwickelte porphyartige Granitmassen. Er beginnt bei Gadernheim und erstreckt sich über Brandau, Neunkirchen, Lützelbach, Steinau, Billings, Mefsbach, Erlau, Rodenstein bis Laudenu und Winterkasten. In einer feinkörnigen aus Quarz und röthlichweißem Feldspath gebildeten Grundmasse, in welcher graue bis schwarzbraune Glimmerblättchen in parallelen Streifen abgelagert sind, liegen oft zolllange, weiße und röthlichweiße Orthoklassäulen (wohl auch Oligoklas und Albit). Ferner beobachtet man diese Felsart am Schenkenberg bei Lindenfels, wo sie durch die Verwitterung in sphäroidischen Blöcken abgesondert ist; an der Jägershütte bei Knoden; auf dem Hohenstein am Quarzgange und zwischen Raidelbach und Lautern.

Der grobkörnige Gneus besteht aus fleischrothem bis weißem Orthoklas, rauchgrauem Fettquarz und schwarzbraunem Glimmer; er gehört

hauptsächlich der Zone Hochstetten in der Section Worms an und findet im Texte zu dieser Section seine nähere Beschreibung; nur ein kleines Stück setzt in die Section Erbach über.

Der klein- bis feinkörnige Gneus ist von der verschiedensten Färbung und die verbreiteste Gneusart im Odenwalde. Er bildet mit schiefrigem Gneuse das oben geschilderte Gneusgebiet (Zone 18) und wechselt mit Syenit in weit ausgedehnten in hora 3 und 5 streichenden Zonen, welche in die Section Worms übersetzen. Die Bergrücken zwischen dem Eselsberg bei Ob. Hambach und dem Weiler Fischweiher im Heppenheim Thale (Zone 11); das Hochstetter und Quatelbacher Thal von Hochstetten (Section Worms) bis Staffel, Wurzel- und Schmalbeerbach (Zone 4); das Reichenbacher Thal von Wilmshausen über Reichenbach bis Lautern und Brandau (Zone 6); das Gebirg von Gronau über den Eichelsberg bis Schannenbach (Zone 8); die Bergrücken von Wilmshausen, Hohenstein, Knoden, Glattbach und Winkel (Zone 8); das Gebirg von Kolmbach über Winterkasten, Laudenu, Eber- bis Gütersbach (Zone 8); der Bergrücken von Mittershausen über Erlenbach, Eulsbach, Lindenfels, Gumpen bis Reichelsheim und Michelbach stellen solche Gneuszonen mit wechselnden Syenitmassen dar. Die Ob. Hambacher Zone insbesondere, welche bis Heppenheim in die Section Worms hineinreicht, besteht aus einem röthlichen und röthlichweißen Gneus in welchem der Glimmer ohne alle Ordnung durch die Feldspath- und Quarzkörner vertheilt und zuweilen in kleinen Nestern ausgeschieden, nicht aber in parallelen Streifen abgelagert und in Handstücken vom Granite nicht zu unterscheiden ist. Nur am anstehenden Gesteine tritt die Gneusstructur hervor, da dasselbe in zwei bis sechs Fuß mächtigen unter Winkeln von 50 bis 60 Grad nach Südost einfallende Bänke abgetheilt ist, auf deren Querablösungen sich eine Menge zierlicher Mangan- und Eisendendriten als secundäre Ausscheidung wahrnehmen lassen. An eingeschlossenen einfachen Mineralien ist der körnige Gneus arm. Außer spärlichen Eisenglanzblättchen bei Winterkasten, nicht bauwürdigen Kupfererzen am Hohenstein bei Reichenbach, sind mir nur stark zersetzte in Brauneisenstein umgewandelte schwarzbraune Eisengranaten von Erbsen- bis Welschnußgröße bei Laudenu bekannt. Die Eisenerze, welche sich auf Schnüren beschränken, findet man bei Hambach, Gronau, Reichelsheim, Bierbach, fränkisch Krumbach u. s. w., sie sind Auslaugungen aus dem Gestein und verdienen kaum der Erwähnung, obgleich man vor drei Jahren Bergbau darauf versucht hat. Ebenso bildet Schwerspath unbedeutende Putzen und Nester auf dem Schneckenberg bei Gronau, bei Gadernheim, fr. Krumbach und Bierbach. Wichtiger sind die Quarzgänge von Reichenbach und Knoden, sowie die körnigen Kalklager von Bier- und Höllerbach, von welchen weiter unten die Rede sein wird.

## 2) Felsitschiefer.

Der Felsitschiefer ist ein dick- bis dünnstiefrißes weißes, graues, gelbliches oder röthliches Felsgestein, welches aus einem innigen Gemeng von Orthoklas und Quarz besteht. Er bildet in Stunde 3 und 5 streichende

Streifen im Granit bei Neutsch, Allertshofen und Hoxhohl; im Syenit vom Riegelhaus nach dem Röderhaus oberhalb Schmalbeerbach; im Granit und Felsit von Stettbach und Herchenrode. Der dem Grünschiefer bei Rodau eingelagerte Felsitschiefer ist grauweiß, feinblättrig, fühlt sich etwas fettig an, was von zersetztem Glimmer herrührt und wird als Wetzstein benützt. Auf der Spaltungsfläche bemerkt man Mangandendriten bei Neutsch und weiße und graue Kaliglimmerschüppchen bei Hoxhohl, Allertshofen und Rödershaus.

### 3) Syenitschiefer.

Der Syenitschiefer steht in demselben Verhältniß zu dem Syenit, wie der Gneus zum Granit; er ist ein dünngeschichteter, in Bänke zerklüfteter, zuweilen feinschiefriger Syenit und besteht aus grauer, schwarzer oder grüner Hornblende, aus Orthoklas und Albit. Dem Gefüge nach ist er fein- bis feinkörnig, dicht und porphyrtartig. Die dichte Varietät ist blauschwarz, manchen Phonolithen der Rhön nicht unähnlich und bildet theils schmale Zonen im Syenit des Frankensteins bei Nd. Beerbach und der Ruine Frankenstein; theils mächtig entwickelte in hora 3 und 5 streichende Lager im Gneus und Syenit der Kolmbacher-Höhe, welche sich in nordöstlicher Richtung bis zur Schleichhöhe erstrecken und in 1 bis 6 Fuß dicke unter Winkeln von 20 Grad nach Südwest einfallende Bänke abgetheilt sind. Diese Bänke lassen sich bis zu mehreren Linien dicken Platten spalten, welche beim Anschlagen hell klingen. Der Syenitschiefer des Frankensteins ist ein homogenes, schwarzes, aus Labrador, Hornblende und Magneteisen zusammengesetztes, durch Speckstein grün geflecktes Gestein, welches stark auf die Magnetnadel wirkt. Mit Granit bildet der Syenitschiefer mächtige Lager am Modaubache zwischen Hoxhohl und Herchenrode, welche in hora 3 des Bergcompasses streichen. Die feinkörnige Varietät ist von grüner und graublauer Farbe und in nordöstlich streichenden Streifen theils zwischen Granit und Syenit (Zone 2); theils zwischen Gneus, Syenit und Glimmerschiefer (Zone 14) eingelagert. In dem Syenitschiefer, welcher bei Grofsbieberau und zwischen den Hundert Morgen (Section Dieburg) und Hippelsbach ansteht, finden sich beide Varietäten vereinigt, welche oft so dünnschiefbrig sind, daß man sie in 3 bis 4 Linien dicke Blätter zerlegen kann. Der graublaue Syenitschiefer der Zone 14 stellt ein schmales Band dar, welches bei Fischweiher beginnt, über Kirschhausen, Mittershausen, Scheuerberg, Seidenbach fortsetzt und am Kaffersberg bei Lindenfels sein Ende erreicht. Er ist in 2 bis 3 Fuß dicke Bänke zerklüftet, welche bei Fischweiher, im Görzklinger Wiesengrunde unweit Kirschhausen, bei Mittershausen, Scheuerberg und Seidenbach unter Winkeln von 40 und 50 Grad nach Nordnordwest, bei Schlierbach dagegen, wo diese Bänke mit ziegelrothem feinkörnigem Granulit wechsellagern, nach Südost einfallen. Bei Fischweiher und Seidenbach ist der Syenitschiefer von Graphit imprägnirt; bei Quatelbach (Zone 3) und Fischweiher (Zone 12) bemerkt man Glimmerblättchen auf den Spaltungsflächen, und am Kellersberg bei Mittershausen und Fisch-

weiher führt er Arsenikkies und Kalkspath und ist zu Tage durch den Einfluß der Atmosphärien in grauen Thonschiefer umgewandelt. Der feinkörnige Syenitschiefer ist dem Syenit und Gneus in schmalen Streifen zwischen Kolmbach und Gadernheim eingelagert. Der porphyrtartige Syenitschiefer entspricht dem porphyrtartigen Gneuse der Neunkircherhöhe (S. 116). In einer feinkörnigen aus rüthlichweißem Orthoklas und grauweißem Albit gebildeten Grundmasse sind oft zolllange Orthoklassäulen ausgeschieden. Zwischen den Albit- und Orthoklaskörnern liegen schwarze Hornblende- und Glimmerblättchen in parallelen Zonen und in so großer Menge, daß das Gestein auf dem der Spaltungsfläche parallelen Hauptbruche nur aus Hornblende und Glimmer zu bestehen scheint. Dieses schöne, dick- bis dünnstiefrige Felsgestein ist in mehrere Fuß dicke Bänke zerklüftet, in welchen der Orthoklas zuweilen in größeren Massen ausgeschieden ist. Am Eselstein bei Weschnitz fallen diese grotesken Felsmassen unter Winkeln von 40 und 50 Grad nach Süd- und Nordwest. Der porphyrtartige Syenitschiefer bildet die Zone 16, beginnt unterhalb Altlechtern zwischen Granit und Gneus, durchsetzt bei Leberbach das Weschnitzthal und erreicht vor Unt. Ostern sein Ende; er wechsellagert mit Syenit und Granulit in Stunde 3 und 5 streichenden Lagern und Streifen.

#### 4) Glimmerschiefer.

Der Glimmerschiefer ist ein grauglänzendes, auch gelbliches, dünnstiefriges aus Fettquarzlamellen und silberweißen Kaliglimmerschüppchen bestehendes Felsgestein, welches oft so innig gemengt ist, daß es Thonschiefer nicht unähnlich sieht. Der Kellers- und Grätenberg bei Mittershausen und der Hügel in Scheuerberg bestehen fast ganz aus diesem Glimmerschiefer ähnlichem Thonschiefer. Die Glimmerschieferformation hat ein Hauptstreichen von Südwest nach Nordost und tritt in einem schmalen, zwischen Syenitschiefer, Syenit und Gneus abgelagerten über  $\frac{2}{4}$  Stunden langen Streifen auf, welcher bei Mittershausen beginnt, über Scheuerberg und Seidenbach fortsetzt und unterhalb Eulsbach sein Ende erreicht. Die ganze Ablagerung besteht aus wechselnden Schichten und Bänken von Granit, Felsit, Glimmerschiefer, Gneus, Quarzschiefer und Syenit, welche in hora 3 und 5 streichen und unter Winkeln von 40 bis 80 Grad nach Nordwest einfallen. Interessant ist das Vorkommen von erdigem, staubartigem Graphit, welcher hauptsächlich an den Quarzschiefer gebunden ist, und diesen theils imprägnirt, theils auf seiner Spaltungsfläche sich abgelagert hat; auch mit Thon gemengte Wulsten in demselben bildet. Außerdem kommt der Graphit im Glimmerschiefer selbst bei Mittershausen und Seidenbach und im Granit der Seidenbacherhöhe vor. Er scheint hier im Schachte nach Erlenbach zu eine kleine Mulde zu bilden, in welchem er den aus zersetztem Feldspath hervorgegangenen rothen eisen-schüssigen Thon imprägnirt hat. Der Graphit ist der Rückstand eines vormals bituminösen Schiefers und aus der Verwesung von Pflanzen hervorgegangen; er muß geschlämmt und durch Zusatz von Kienrufs oder

böhmischem Graphit geschwärzt und aufgebessert werden, kann in Qualität und Preis mit dem Passauer Graphit nicht concurriren und ist überhaupt nicht bauwürdig. An eingeschlossenen einfachen Mineralien ist die Glimmerschieferformation arm. Der Glimmerschiefer ähnliche Thonschiefer führt im Kellersberger Stollen bei Mittershausen Arsenikkies in Körnern; die Granitbank an der Oelmühle Glimmer in sechsseitigen Tafeln und rothe Granaten; der Felsit- oder Glimmerporphyr im Scheuerberger Stollen Schwefelkieskrystalle, und die Granitbank in der Nähe des Scheuerberger Stollen enthält Turmalin und Granat.

#### 5) Quarzschiefer.

Der Quarzschiefer ist rauchgrauer bis weißer Fettquarz, welcher in 2 Linien bis 1 Zoll dicken, schiefrigen, oft knotig welligen Schichten abgesondert und meistens von Graphit imprägnirt ist. Er bildet sehr mächtig entwickelte Lager im Syenitschiefer von Kirschhausen; im Glimmerschiefer des Kellerbergs bei Mittershausen und Seidenbach; im Syenit und Gneusgebirg zu Neuthal, Glattbach, Kolmbach, Gadernheim, Neunkirchen, Winterkasten, Laudeau und Gumpen; im Gneus zu Michelbach und zwischen Litzel- und Scharbach. Bei Michelbach ist das Lager über 30 Fufs breit und seine Schichten sind durch dünne Lamellen weißen Glimmers getrennt und nicht von Graphit imprägnirt. Zwischen Litzel- und Scharbach ist der Quarzschiefer durch Eisenglanz blauschwarz gefärbt und enthält in kleinen Drusen zuweilen Krystalle von diesem Mineral. Die Quarzschieferlager fallen unter Winkeln von 30 und 40 Grad theils nach Nordwest, theils nach Südost.

#### 6) Granulitschiefer.

Dem Granite bei Leberbach im Weschnitzthale sind dünnschiefrige Bänke eines hell- bis schwarzgrünen Gesteins eingelagert, welches nur aus Orthoklas besteht, und eine schiefrige durch Eisenoxydul gefärbte Varietät des Granulites ist, von welchem weiter unten die Rede sein wird.

#### 7) Hornblendeschiefer\*).

Dieses klein- bis feinkörnige Gestein besteht wesentlich aus blaugrauer oder dunkelgrüner faseriger auch blätteriger Hornblende, welcher Albit und hellgrüner Epidot beigemengt ist. Der Albit, wohl auch Orthoklas, ist oft in röthlichweißen, 2 Linien breiten Streifen ausgeschieden, welche mit 3 bis 4 Linien breiten blaugrauen Hornblendestreifen wechselagern und so dem Schiefer ein gebändertes Aussehen verleihen. Quarz in Körnern und Lamellen tritt nur da auf, wo der Schiefer mit dem Nebengestein in Contact tritt. Der Hornblendeschiefer ist in zwei nordöstlich

---

\*) Da das Gestein hauptsächlich aus Feldspath, Hornblende und Quarz besteht, so gehört es zum Syenitschiefer.

in Stunde 3 und 5 streichenden Zonen dem schiefrig-körnigen Gneuse bei Kilsbach und Mummernroth eingelagert.

## II. *Krystallinische Massengesteine.*

### 1) Der Granit.

Der Granit unseres Gebietes ist zusammengesetzt aus Feldspath, Quarz und Glimmer. Der Quarz ist Fettquarz und graulichweifs, zuweilen rauchgrau, seltener milchweifs oder granatroth, und findet sich in krystallinischen Körnern, bisweilen auch in dünnen die Feldspathmasse parallel durchschneidenden Lamellen. Der Feldspath ist vorwaltend Orthoklas, häufig begleitet von Oligoklas, welcher bei einigen Granitvarietäten den Orthoklas an Quantität überragt. Der Orthoklas ist fleischroth, weifs, blaßröthlich, grau und krystallinisch spätig oder körnig, zuweilen in klinorhombischen Säulen ausgeschieden. Der Oligoklas ist blüthenweifs mit Perlmutterglanz, oder blaßröthlich, zuweilen fein parallel gestreift und hüllt den Orthoklas als dünne Schale ein. Der Glimmer kommt in zwei Formen, als Kali- und Magnesiaglimmer, vor und bildet Schuppen oder Blättchen, welche in den grobkörnigen Graniten oft zu 12 Zoll grofsen Platten anwachsen (Ob. Keinsbach und Langenbrombach). Der Granit ist theils in drei nordöstlich streichenden Zügen angeordnet, theils bildet er Lager und Stücke in den verschiedenen Zonen. Der erste Zug tritt bei Zotzenbach und Tromm aus der Section Hirschhorn in unser Gebiet herein, setzt den ganzen Wagenberg zusammen, erstreckt sich über Steinbach, den Erzberg, und erreicht mit dem Stotz vor Unt. Ostern sein Ende. Der Granit dieses Zuges wechsellagert mit Granulit und Granulitschiefer in Stunde 3 und 5 streichenden Streifen (Leberbach). Der zweite Zug, in welchem der Granit mit Syenit wechsellagert, bildet die Zone Gronau (9) und setzt in die Section Worms über. Der dritte Zug endlich nimmt an der Zusammensetzung der Zone (2) Ob. Beerbach, Neutsch, Ob. Modau u. s. w. wesentlichen Antheil. Der Granit dieses Zuges befindet sich in regelmäfsigem Wechsel mit Syenit, Syenitschiefer, Granulit, Felsit und Felsitschiefer; theils ist er innig mit Grünschiefer und Syenit verwachsen. So bei Hoxhohl und längs des Bergrückens von Schmalbeerbach bis Ernstshofen. Dem Gneus und Syenit eingelagerte Granit-Massen sieht man in der Zone 8 bei Knoden, Breitenwiesen, Neunkirchen, Laudenaus, Mefsbach, Lützelbach, Steinau, Hollerheck u. s. w. Dem Syenit untergeordnete Granitstücke bemerkt man bei Ob. Laudenaus, Juhöhe, Erbach, Gr. Breitenbach, Sonderbach, Walderlenbach u. s. w. (Zone 15). Endlich durchsetzen in hora 7 streichende Granitlager den schiefrig-körnigen Gneus der Zone 18 bei Weschnitz, Ostern, Erzbach, Rohrbach, Bockenrod, Hutzwiese, Ob. Keinsbach, Hembach, Böllstein, Hummerroth, Wallbach, Brensbach, Mummernroth u. s. w. Ich unterscheide :

- 1) fein- bis feinkörnigen Granit;
- 2) grobkörnigen Granit;
- 3) porphyrtigen Granit.

a) Fein- bis feinkörniger Granit.

Der fein- bis feinkörnige Granit ist ein inniges Gemeng von Orthoklas, Quarz und Kaliglimmer. Der Oligoklas ist theils selten, theils steht er dem Orthoklas an Quantität nicht nach. Der Granit führt in letzterem Falle Zirkon und schwarzen Magnesiaglimmer. So bei Mittershausen, wo er dem Glimmerschiefer eingelagert ist. Eine graue bis grauweiße feinkörnige Granitvarietät bildet mächtig entwickelte Lager und Stöcke im porphyritartigen Syenit der Zone 16 bei Walderlenbach, auf dem Salzkopf bei Sonderbach, an der Juhhöhe, bei Erbach und Bonsweier.

Vorwiegend ziegelrothen Albit und grünen Glimmer führend, bildet der feinkörnige Granit dem körnigen Gneuse entsprechende, mit Syenitschiefer einlagerte, in Winkeln von 30 und 40 Grad nach Südost einfallende Bänke zwischen Winkel und Schlierbach. — Der feinkörnige Granit der Zone 2 ist röthlichweiß und sehr glimmerreich bei Allertshofen und Hoxhohl, blaßröthlich und glimmerarm bei Herchenrode; rauchgrau und den Glimmer sehr spärlich in einzelnen mikroskopischen Schüppchen führend in den Steinbrüchen um Neutsch (Granulit).

b) Grobkörniger Granit.

Die einzelnen Mineralspecies als Orthoklas, Milch- oder Fettquarz und Kaliglimmer sind in größeren Körpern, welche zuweilen einen Durchmesser von 1 bis 10 und mehr Zoll erreichen, mit einander verwachsen und lassen sich durch einen Hammerschlag leicht trennen. Hierher gehören die im schiefrig-körnigen Gneusgebiete (Zone 18) in Stunde 7 aufsetzenden Granitlager. Der Kaliglimmer, mattweiß, auch rauchgrau, bildet oft 5 bis 10 Zoll lange Platten oder auch regelmäßige sechseckige Tafeln von  $\frac{1}{2}$  bis 2 Zoll Durchmesser; oder er fehlt ganz und ist nur an einzelnen Stellen in Blättchen ausgeschieden. Der Quarz tritt dann in dünnen Lamellen oder in verzerrten Krystallen in den Feldspath herein, und es entsteht sogenannter Schriftgranit oder hebräischer Stein. Aehnlichen Lagern begegnet man im Glimmerschiefer am Silbergrubenkopf und an der Oelmühle bei Mittershausen; im porphyritartigen Granit der Neunkircherhöhe bei Webern und zwischen Lützelbach und Neunkirchen.

Der grobkörnige Granit von Lützelbach ist zusammengesetzt aus fleischrothem Orthoklas, rauchgrauen Fettquarzkörnern in großer Menge und innig mit dem Feldspath verwachsen; aus silberweißem durch Granat rothgefleckten und in größeren und kleineren Gruppen an einzelnen Stellen ausgeschiedenen Glimmerblättchen; aus schwarzem Turmalin in Körnern und Krystallen, welche weniger gleichmäßig vertheilt, aber oft in größeren Gruppen beisammen sind \*).

Der grobkörnige, dem Glimmerschiefer an der Oelmühle bei Mittershausen in einer drei bis fünf Zoll breiten Bank eingelagerte Granit ist

---

\*) Gehört zum Granulit.

gleichmäfsig gemengt, und der röthlichweisse Kaliglimmer zuweilen in fünf Linien breiten Tafeln ausgeschieden.

### c) Porphyrtiger Granit.

Der porphyrtige Granit ist die verbreitetste Granitart im Odenwalde. In einer klein- bis feinkörnigen Grundmasse liegen oft zolllange Feldspathkrystalle ohne Regel nach allen Richtungen zerstreut. Die Grundmasse ist theils aus Orthoklas, Kaliglimmer und Fettquarz; theils aus Oligoklas, Magnesiaglimmer und Fettquarz gebildet. Die gröfsern ausgeschiedenen Feldspathkrystalle gehören gleichfalls diesen zwei Arten von Feldspath an. Der porphyrtige Granit der 16. Zone ist theils weifsgrau, theils fleischroth. Die weisse Varietät enthält den Oligoklas in grofser Menge und hüllt den Orthoklas als dünne Schale ein; der Glimmer ist schwärzlichgrüner perlmutterglänzender Magnesiaglimmer. In dieser Grundmasse, welche vielen Splen führt, ist der Oligoklas in zolllangen, blüthenweissen Prismen ausgeschieden (Brombach, Wagenberg, Weg von Fürth nach der Schardte und Scharbach). Die rothe Varietät ist aus Orthoklas, Kaliglimmer und Fettquarz zusammengesetzt, und der Kaliglimmer zuweilen von grüner Farbe und dann in grofser Menge vorhanden (Stotz), der röthlichweisse Orthoklas gleichfalls in zolllangen Prismen ausgeschieden (Tromm, Wagenberg), welche bei Steinbach lose im Granitkrus liegen. Der porphyrtige Granit von Lichtenberg, Knoden und Breitenwiesen ist röthlichweifs) der zwischen Billings, Kl. Bieberau und Assbach ist graulichweifs mit weifsgrauen sechsseitigen Oligoklassäulen, schwarzer stänglicher Hornblende und Titanitkrystallen. Der porphyrtige Granit von Ernsthofen, Ob. Modau und Kl. Bieberau (Zone 2) ist blaßröthlich, enthält den Quarz spärlich in rundlichen Körnern und den schwarzbraunen Kaliglimmer zuweilen in sechsseitigen Täfelchen in den Orthoklassäulen eingebettet.

### Einfache Mineralien im Granit.

1) Granat, rothbraun, auch kirschroth; erbsen- bis kirschgrofs (Langenbrombach). Ob. Keinsbach, Mittershausen.

2) Turmalin, gemeiner, schwarz, mit Endflächen 2 Zoll lang,  $\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser. Elmshausen, Ob. Keinsbach, Langenbrombach, Hummertroth. In Körnern, auch stängelig — Neunkirchen.

3) Kaliglimmer in fußlangen Platten, mattweifs und rauchgrau. Ob. Keinsbach und Langenbrombach; in sechsseitigen Täfelchen von  $\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser — Ob. Keinsbach an der Kapelle und Mittershausen an der Oelmühle.

4) Gemeiner Beryll. Ob. Keinsbach, apfelgrün; die 3 Zoll langen Säulen vertical gestreift; auch strohgelbe  $\frac{1}{2}$  Zoll lange sechsseitige Säulen — Hirschet bei Ob. Keinsbach.

5) Splen. Mikroskopische, rothbraune Krystalle. Brombach, Kl. Bieberau nach Billings.

6) Schwefeleisen in Körnern und Blättchen. Neutsch und Hoxhohl.

7) Hornblende in Plättchen, Körnern und Stängelchen. Hollerheck in der Neunkircherhöhe, Kl. Biebrau, Assbach, auf dem Wege zwischen Webern und Billings.

7) Milchquarz. Ausscheidung in Geschieben und Blöcken. Ob. Beerbach, Fußspfad nach Steigerts; Neutscherstrasse von Neutsch nach dem Neutscher Hof; Langenbrombach, Böllstein.

8) Schwerspath, amorpher Gang in Granulit auf dem Kirchberg bei Nd. Modau; streicht in hora 10, ist 3 bis 6 Fuß mächtig, 20 Fuß tief und geht in Gangquarz über.

9) Rother Eisenkiesel. Fahrnbach.

10) Kalkspath. Ausscheidung in weissen und fleischrothen mächtigen Blöcken. Porcellanmühle zwischen Hoxhohl und Ernstshofen.

## 2) Granulit.

Der Granulit ist ein mannigfach modificirtes weisses, licht- bis rauchgraues und röthliches, klein- bis grobkrörniges Gestein, das aus Orthoklas und Fettquarz besteht und Granat theils gar nicht, theils in mikroskopischen Körnern und verflochtenen rothen Flecken und Punkten führt; in der Section Worms gesellt sich dem Orthoklas Oligoklas und Albit bei. Der Quarz ist zuweilen durch Epidot und Aphrosiderit grün gefärbt. So in den Granulitstreifen der Zone 1 bei Seeheim, Nd. Beerbach und Forst Böll, sowie in scheibenförmigen Granulitgeoden auf dem Gänseberg bei Fürth und Ellenbach (Zone 14). Die grobkrörnige Varietät enthält den Orthoklas in faustgrossen Massen, während der Fettquarz nicht zu solcher Grösse anwächst. Dies ist der Fall in den Granulitstreifen der Zone 1 und 16, in den Granulitschnüren der Zonen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 bei Beedenkirchen, Reichenbach, Seidenbuch, Seidenbach, Gronau u. s. w. Zuweilen nimmt der Feldspath überhand und verdrängt den Quarz. Das so nur aus Orthoklas bestehende Gestein bildet scheibenförmige Geoden und Wulste in einem grünlichen faserigen Amphibolgestein zu Neuthal bei Lindenfels; man sieht es an den Wänden des Stollens, welcher zum Behufe des Graphitbergbaues angelegt worden ist und auch zu Tage anstehen. Diese Granulitvarietät wechsellagert in Bändern mit Granit (Zone 15) bei Leberbach im Weschnitzthale, hat schiefrige Structur und ist durch Eisenoxydul hell- bis schwarzgrün gefärbt. Die feinkörnige Varietät, welche lichtgrau bis bläsröthlich ist, enthält mikroskopische Flitter von grauem Kaliglimmer und zerflossene rothe Granatflecken in den zwischen Syenitschiefer und Syenit gelagerten Streifen von Nd. Modau und Herchenrode; er bricht in  $\frac{1}{4}$  Zoll dicke Platten. Der rauchgraue Granulit in den Steinbrüchen um Neutsch führt Schwefeleisen und dunklen Glimmer in Punkten und Schüppchen. Die feinkörnigen Granulitgeoden in dem Syenite der Zone 14 bei Fürth, Fahrn- und Linnenbach, Ellenbach, Gumpen, Krum- und Rimbach, Breitenbach, Liebersbach, Juhöhe u. s. w.

sind röthlichweiss und blafs-röthlich und führen keine Granaten. Der Granulit ist nie massig abgesondert, sondern entspricht durch seine Parallelstructur dem körnigen und schiefrigen Gneuse. Als zufällige Beimengungen bemerkt man Epidot in kleinen Krystallen bei Seeheim; grüne Hornblendesplitterchen in dem an ziegelrothem Albit reichen Granulitlager bei Schlierbach (Fahrweg von Schlierbach nach Winkel); braune und weisse Kaliglimmerschüppchen bei Leberbach und Neuthal, zwischen Zotzen- und Minschbach.

### 3) Felsit.

Der Felsit wechsellagert mit Granit und Syenitschiefer in hora 3 und 5 streichenden Streifen bei Ob. Beerbach, Stettbach, Steigerts, Neutsch, Ob. Modau, Rohrbach und Herchenrode (Zone 2); er bildet Bänke und Lager im Glimmerschiefer von Mittershausen (Zone 12), im Granit und Syenit von Gronau auf dem Geis- und Schneckenberg (Zone 8) und im Syenit und Gneus bei Wilmshausen (Zone 7). Die Grundmasse ist braun, röthlich, grau und lila, krytokrystallinisch, oft glasis, durchscheinend, von muschelrig splittrigem Bruche, jaspisartig und aus Orthoklas und Fettquarz zusammengesetzt. In dieser Grundmasse liegen Krystalle von braunem, tombakbraunem Kaliglimmer am Schnecken- und Geisberg bei Gronau, am Hohberg bei Elmshausen und im Fahrwege von der Oelmühle bei Mittershausen nach Scheuerberg; Hornblendeschnitzchen bei Mittershausen. Als zufällige Beimengungen sieht man Schwefelkieskrystalle bei Mittershausen, weisse Glimmersplitterchen bei Steigerts, Eisenrahm und Eisenglanz bei Gronau und zierliche Mangandendriten auf den Ablösungsflächen am Hohlberg. Der Felsit ist dem Granulit sehr ähnlich und hat gleichfalls Parallelstructur. Ihm ist zwischen Hoxhohl und Ernstshofen ein Kalkspathlager eingebettet, welches mit dem an Mangandendriten reich verzierten Felsit in Schnüren und Gängchen von  $\frac{1}{2}$  Zoll bis 3 Fufs Breite wechsellagert. Das Kalkspathlager streicht in hora 6 bis 7 und hat eine Mächtigkeit von 30 Fufs; sein Tiefstes ist noch nicht erschürft. Der Kalkspath ist weiss, halbdurchsichtig, von vorzüglicher Reinheit, krystallinisch blätterig, aus rhombischen Tafeln von  $\frac{1}{4}$  bis 1 Zoll Durchmesser zusammengesetzt und scheint primitiven Ursprungs zu sein \*).

### 4) Syenit.

Der Syenit, welcher durch seine dunkle Farbe stark aus dem Gebirge hervortritt, ist dem Granit und Granulit nahe verwandt und unterscheidet sich von diesen Massengesteinen nur durch die Entwicklung von Hornblende in der granitischen Masse. Er ist in fünf nordöstlich streichenden Zügen angeordnet und tritt in zwei wesentlich von einander verschiedenen Varietäten auf. Der erste Zug ist über eine grosse Fläche

---

\*) Siehe meine Abhandl. Notizblatt 1861.

verbreitet; er beginnt im Süden der Karte bei Zotzen- und Oberliebersbach und setzt das ganze zwischen Ob. Laudenbach, Erbach, Kirschhausen, Mittershausen, Erlenbach, Faustenbach und Gr., Ob.- und Kleingumpen einerseits, Frohnhofen, Fahrnbach, Lützelrimbach und Minschbach andernseits gelegene Gebiet zusammen. Der Syenit dieses Zuges ist durch blüthenweise, parallel gestreifte Zwillingskrystalle von Oligoklas, welche in einer aus weißem Orthoklas, grau- bis rosenrothem Fettquarz und schwarzer Hornblende gebildeten feinkörnigen Grundmasse liegen, porphyrtartig. Der weiße Feldspath nimmt blaßröthliche Farbe an in den Steinbrüchen bei Rimbach und Gr. Breitenbach, bei Krumbach und auf der Küfershöhe und dem Klösbuckel rechts von Gr. Gumpen. Als accessorische Beimengungen enthält der porphyrtartige Syenit schwarzen Magnesiasglimmer oft in großer Menge und mikroskopische Titanitkrystalle. Eine besondere porphyrtartige Syenitvarietät ohne Titanit- und Magnesiasglimmereinschlüsse findet man in Unterraidelbach als Lager im Gneus, sowie in dem Wiesenthälchen hinter der Schönberger Kirche an den zwei Weihern und dem Königsplatz; hier als Uebergang von porphyrtartigem Granit.

Der zweite Hauptzug beginnt bei Seeheim (Section Worms), setzt den ganzen Frankenstein zusammen und erstreckt sich über Nd. Beerbach, Frankenhausen und Nd. Modau und reicht weiter in die Section Dieburg hinein. Er enthält Zonen von Granit, Granulit und Syenitschiefer, welche in Stunde 3 und 5 des Bergcompasses streichen. Der Syenit dieses Zuges, welcher fein-, klein- bis grobkörnig ist, führt keinen Quarz und besteht nur aus Hornblende und Feldspath. Der Feldspath ist theils Albit, theils Labrador, und die Hornblende von grauer, schwarzer und grünlicher Farbe. Als zufällige Beimengungen bemerkt man Glimmerblättchen in sechsseitigen Täfelchen und Schwefelkies in mikroskopischen Körnern. Die grobkörnige Varietät führt Magnetiseisenkörnchen in großer Menge, und ist polarisch magnetisch (zweithöchster Punkt des Frankensteins südlich des sogenannten Magnetsteins).

Der dritte Zug bildet die Zone 5, setzt oberhalb der Striet bei Elmshausen aus der Section Worms in die Section Erbach über, erstreckt sich über das Felsenmeer, Beedenkirchen und erreicht vor Webern sein Ende. Der Syenit dieses Zuges ist quarzfrei oder enthält ihn nur in mikroskopischen Körnern und besteht aus grünlichweißem Albit und dunkelgrauer bis schwarzer Hornblende. Braune und schwarze Glimmerblättchen, sowie Schwefeleisenkörnchen sind keine Seltenheit in ihm; er ist theils fein- bis feinkörnig, theils grobkörnig und in ellipsoïdischen Blöcken abgesondert; Schnüren und Streifen von Granulit durchsetzen ihn bei Reichenbach, Beedenkirchen und am Knorrberg bei Lautern.

Der Syenit des vierten Zuges, welcher die Zone 7 darstellt, tritt bei Wilmshausen in die Section Erbach herein, setzt die Höhen rechts von Elmshausen, Reichenbach und Lautern zusammen und erreicht vor Brandau und in der Nähe des Lichte Brunnen in der Neunkircherhöhe sein Ende; er ist gleichfalls aus grünlichweißem Albit und Hornblende zusammengesetzt, quarzfrei und führt Glimmerblättchen und Schwefeleisen-

körnchen; sein Gefüge ist fein- bis feinkörnig; seine Absonderung zuweilen in Bänke, welche dem körnigen Gneuse entsprechen.

Der fünfte Hauptzug bildet die Zone 12; er beginnt bei Ob. Hambach und setzt das Gebirg zwischen Seidenbach und Seidenbuch, zwischen Kaffersberg, Winterkasten, Laudenau und Eberbach zusammen. Der Syenit dieses Zuges besteht auch aus Albit und Hornblende; letztere ist oft in rechteckigen Säulen oder in größeren dickfaserigen, rabenschwarzen Parthien ausgeschieden. So bei Seidenbach, Winterkasten, Laudenau und Kaffersberg. Er führt außer Schwefeleisen und Glimmer, Granaten und ist fein- bis grobkörnig.

Zwischen diesen fünf Zügen bilden quarzfreier Syenit, Granit, Gneus und Syenitschiefer in buntem Wechsel die schon beim Gneus und Granit geschilderten Zonen 2, 3, 6, 8, 10, 11. — Das aus porphyrtartigem Syenit bestehende Gebiet birgt Lager von Granulit, Granit und Syenit, welche in hora 3 und 4 des Bergcompasses streichen. Der Syenit entspricht dem Syenitschiefer der Zone 13; er ist ein graues oder schwarzes homogenes dem Basalte ähnliches Felsgestein, welches strahligen, grünen, glasglänzenden Epidot führt bei Walderlen- und Igelsbach und oft eine ungewöhnliche Menge schwarze und graue Glimmerblättchen enthält. So bei Ob. Laudenbach, Bonsweiher, Sonderbach und Kirschhausen. Besonders interessant ist das porphyrtartige Syenitgebiet durch viele Gangbildungen von Quarz, welche Kupfer- und Bleierze führen und in hora 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 9, 10 des Bergcompasses streichen. Man sieht die Quarzgänge bei Ob. Liebers-, Ob. Lauden- und Erbach; bei Bonsweiher, Lautenweschnitz, Linnen- und Ellenbach und auf dem Leinberg bei Reichelsheim. In Verbindung mit Granit, Syenitschiefer, Granulit und Felsit setzt der quarzfreie, fein- bis grobkörnige Syenit das Gebiet zwischen Ob. Beerbach, Neutsch, Ob. Modau, Ernsthofen, Assbach, Rohrbach, Gr. Bieberau, Hippelsbach, Nd- und Oberhausen, Lichtenberg, Rodau, Kl. Bieberau und Herchenrode zusammen. Er bildet endlich mit Gneus wechsellagernde Massen in den Zonen 8 bei Ob. Hambach und 11 bei Gadernheim, Neunkirchen, Steinau, Mefsbach, Wersau, sowie untergeordnete Lager in den Zonen 13 bei Seidenbach, 14 bei Schlierbach und Kl. Gumpen, 17 bei Leberbach und 18 bei Rohrbach, Wallbach und in der Hirschet an den sogenannten vier Stöcken oberhalb Ob. Keinsbach.

#### Einfache Mineralien im Syenit.

- 1) Epidot, strahlige Aggregate. Walderlenbach.
- 2) Granat in großer Menge; erbsen- bis flintenkugelförmig, Krystallflächen verflochten. Gadernheim an der Ziegelhütte.
- 3) Schwefelkies in mikroskopischen Körnern. Frankenstein, Felsberg, Neunkircherhöhe.
- 4) Malachit, Lasur, Kalkspath und Eisenrahm, als Ausscheidung auf den Ablösungsflächen. Lochmühle bei Weschnitz.
- 5) Kalkspath in Schnüren und Blöcken. Ernsthofen.

6) Hornblende in zolllangen Krystallen. Gronau, Wilmshausen, Seidenbuch.

7) Orthoklas in kleinern und größern Schnüren mit Fettquarz verwachsen. Gronau, Frankenstein, Seidenbuch.

8) Schwerspath in Putzen und Nester. Gadernheim, Erlenbach, Linnenbach, Lautenweschnitz, Nd. Modau.

9) Faserkalk. Zersetzungsproduct von Labrador. Nd. Beerbach.

10) Titanit. Mikroskopische Krystalle im Syenit der Zone 15.

Granit und Syenit bilden meistens rundliche Massen mit sanften Abhängen, flachen Thälern und kuppelförmigen Erhebungen, ihre Absonderung ist durchschnittlich kugelig schalenförmig. Man bemerkt jedoch am Frankenstein, im Reichenbacher Thale und in der Neunkircherhöhe den Syenit, — in der Zone 18 im Weschnitzthale den Granit in parallele dem körnigen Gneus ähnliche Bänke abgetheilt. Die feinkörnigen und die feinkörnig porphyrtartigen Syenite verwittern leichter als die feinkörnigen und sind in Folge dessen oft mit fußhohem Grus bedeckt, aus welchem die festeren Massen als rundliche, wollsackförmige Blöcke herausstehen, die dann, sobald der Grus durch die atmosphärischen Wasser oder auch durch kleine in ihnen quellenden Bäche fortgeführt ist, Felsenmeere bilden. Das Gebirg von Gronau und Schandenbach, der Wagenberg und insbesondere die Neunkircherhöhe mit ihren Verzweigungen bergen solche Felsenmeere. Das interessanteste Felsenmeer im Odenwalde ist das Syenitfelsenmeer am Südwestabhange des Felsbergs bei Reichenbach\*).

#### 6) Hornblendefels.

Der Hornblendefels oder Amphibolit ist ein grünes, graues oder schwarzes, körniges oder faseriges Gestein, welches aus Hornblende besteht (zuweilen ist etwas weißer oder grünlichweißes Albit beigemengt); er bildet Lager und Stöcke im Syenit und Gneus. So zwischen Balkhausen und Quatelbach, bei Ob. Hambach, im Heiligenberg bei Gronau; bei Glattbach, Winterkasten, Laudenau, Reichelsheim, Ob. Keinsbach, Eberbach, Gadernheim, Reichenbach im Saalband des Quarzganges; zwischen Beedenkirchen und Brandau; auf der Neutscher Strafe oberhalb Staffel. Der Neuthaler Graphitstollen steht in einem grünlich-faserigen, von rothen Granulitscheiben durchflochtenen Hornblendefels. Der Amphibolit führt zuweilen Schwefelkies und Glimmer.

#### 7) Gangquarz.

Der Gangquarz unterscheidet sich von dem Fett-, Milch- und Rosenquarz durch seine krystallinisch-körnig-blätterige Structur, sowie durch sein gangförmiges Auftreten. Die Quarzgänge sind von verschiedener Mächtigkeit, welche zwischen 3 und 20 Fuß schwankt, ragen hoch aus dem Nebengesteine hervor und sind in Bänke zerklüftet. Da wo die

---

\*) Die verschiedenen, oft ganz widernatürlichen Erklärungstheorien über die Entstehung des Reichenbacher Syenitfelsenmeeres findet man zusammengestellt in einer Brochüre von Dr. C. Fuhlrott. Elberfeld, 1858. Gedruckt bei Sam. Lucas.

Atmosphärlilien auf die Klüfte einwirken konnten, sind die Gänge über Tag bedeutend niedriger geworden, indem die Bänke zusammenstürzten, welche nun als riesige Blöcke die Gehänge der Bergrücken zieren. Diese Blöcke sind Abwürfe — Findlinge. Oder die Gänge sind von der Oberfläche ganz verschwunden und werden zuerst unter Grus wieder anstehend gefunden. Der Gangquarz ist weiß oder durch Eisenoxyd und Eisenoxydhydrat gelb, roth, braun; durch kohlensaures Kupferoxyd grün und blau und durch Mangan schwarz gefärbt. Die Bänke sind 2 bis 4 Fufs mächtig, und auf den Ablösungsflächen bemerkt man eine Menge Quarzkrystalle von weissen, gelben, rothen, braunen und schwarzen Farben. Die Abwürfe enthalten zuweilen fingerbreite Schnüren von Kupferglanz, Rothkupfererz, sowie kleine Quarzdrusen, welche mit Lasur, Malachit, Grün- und Gelbbleierz überrindet sind. Die Quarzgänge streichen in hora 8, 9, 10 und finden sich bei Reichenbach, Knoden, Reichelsheim, Ellenbach, Linnenbach, Lautenweschnitz, Bonsweiher, Juhhöhe, Erbach, Ob. Laudенbach und Ob. Liebersbach. Die Saalbänder haben verwittertes Gebirg, indem der Feldspath des Syenites und Gneuses zu Kaolin zersetzt ist. Bei Reichenbach und Reichelsheim wird Bergbau auf diese Erde betrieben. Sie ist größtentheils durch Eisenoxyd gelb gefärbt und liefert geschlämmt circa 22 Procent reine kiesel-saure Thonerde. Die Grubenbesitzer machen viel Verlust mit sich führende Geschäfte; denn die Erde ist nicht nachhaltig vorhanden. Unter den Odenwälder Quarzgängen ist der Reichenbacher Quarzgang der mächtigste und wichtigste. Er beginnt im Teufelsberg oberhalb Elmshausen, steht hier 12 Fufs aus dem Syenite, ist 11 bis 14 Fufs mächtig und erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis vor Reichenbach. Der grofse und kleine Borstein bilden in dieser Linie 70 Fufs über das Nebengestein hervorragende, über 20 Fufs mächtige Felsen, deren Abwürfe den ganzen Abhang in das Reichenbacherthal übersäet haben. Der Gang verschwindet in Reichenbach, während er das Thal durchsetzt, kommt aber wieder am Hohenstein als 80 Fufs hoher, in Bänke zerklüfteter Fels zu Tag; er setzt in südöstlicher Richtung, sich nur unbedeutend über Tag erhebend, bis zum Katzenstein fort, welchen er bis 16 Fufs Höhe zusammensetzt, macht hier einen stumpfen Winkel und setzt ganz unscheinbar und nur in einzelnen Blöcken sichtbar werdend durch Raidelbach bis zur Kolmbacherhöhe, wo er sein Ende erreicht. Die Bänke des Borsteins fallen unter Winkeln von 40 und 50 Grad nach Südost, während die des Hohensteins unter gleichen Winkel nach Nordwest einfallen. Die Saalbänder, welche aus wechsellagernden Massen von Syenit und Gneus bestehen, führen, wie der Gang selbst, Kupfer- und Bleierze.

#### Einfache Mineralien des Reichenbacher Quarzganges.

- 1) Pyrolusit, kleine spiefsförmige Krystalle.
- 2) Psilomelan, trauben- und nierenförmige Gestalten von dichter Zusammensetzung.

3) Bleiglanz, amorph, eingesprengt in die Gangmasse bis zu 10 Loth Gewicht; silberhaltig.

4) Pyromorphit, gelb und grün als Umhüllungspseudomorphose über Quarzkrystallen.

5) Kohlensaures Bleioxyd oder Weißbleierz in mikroskopischen Krystallen.

6) Molybdänsaures Bleioxyd, gelb in mikroskopischen Krystallen.

7) Brauneisenstein, bildet 2 bis 3 Zoll breite Schnüren im Hangenden des Ganges, welche im Stollen sichtbar werden.

8) Gediengen Kupfer, erbsengroße Körner und  $\frac{1}{4}$  Zoll dicke Platten bis zu 20 Loth Gewicht; zellige und zerfressene Gestalten auf zersetztem Syenit in beiden Saalbändern.

9) Kupferroth, carminroth in  $\frac{1}{4}$  Zoll breiten Schnüren im Ganggestein.

10) Kupfergrün, theils als Ueberzug in Quarzdrusen, theils derb im Gneus.

11) Kupferblau, derb, vergesellschaftet mit Kupfergrün im Gneus.

12) Kupferglanz, derbe Massen, schwärzlich-bleigrau im Ganggestein, eingesprengt in Quarz.

13) Malachit, dunkelgrün, faserig; auch haarförmige Krystalle in Quarzdrusen.

14) Kupferlasur, derb; auch mikroskopische Säulchen.

15) Kupferkies, mikroskopische, nicht vollständig ausgebildete Quadratoctaëder.

16) Ziegelerz, zinnoberroth, in den Saalbändern, wo er den zersetzten Gneus und Syenit imprägnirt hat, als Ueberzug von gediengen Kupfer. Das Ziegelerz ist aus der Zersetzung von Schwefelkupfer hervorgegangen.

### 8) Körniger Kalk.

Der körnige Kalk ist ein umgewandelter sedimentärer Kalkstein. Das unwandelnde Princip war hier das durchsickernde kohlensäurehaltige Wasser. Der körnige Kalk bildet Nieren im Gneuse bei Bier- und Höllerbach; er ist in 2 bis 3 Fuß dicke Bänke zerklüftet, weiß, blau und roth, dicht- bis fein- und grobkörnig und führt Granat, Arsenikeisen, Tremolit, Buntkupfererz, Malachit und Lasur, Magnetkies und Graphit in dünnen Blättchen und Körnern. Die Kalknieren sind vom Gneuse umschlossen und erscheinen nur da am Tage, wo derselbe durch die Atmosphärien in Grus aufgelöst und durch die Regenwasser fortgeführt worden ist. Das krystallinische Silicatgestein des Odenwaldes war vormals mehrere hundert Fuß höher als es jetzt ist, und die nun in mauerartigen Felsen über dieses Gestein herausragenden Gang- und Lagermassen, wie Kalk, Quarz u. s. w. waren ehemals von dem Silicatgestein ganz oder theilweise bedeckt. Ausführlicher werden wir uns im Texte zur Section Worms über die körnigen Kalklager aussprechen.

## II. Sedimentgesteine.

### A. Permische System.

Die ältesten sedimentären Ablagerungen unserer Gegend gehören der Zechsteinformation oder der permischen Zeit an. In einem schmalen Bande treten die letzten Reste des Zechsteinmeeres längs der Buntsandsteingrenze von Hummertroth über Kinzig, Birket, Kirchbrombach, Ob. Keinsbach, Rohr- und Erzbach bis Weschnitz und Kocherbach unter dem Buntsandstein hervor. Es sind dies dünngeschichtete, rauchgraue, dolomitische Kalksteine, welche, wie ich vermüthe, in zusammenhängenden Lagern auftreten. Ihre Decke ist ein oft mehrere Fufs mächtiger rother oder schwarzer Thon, in welchem sich Roth-, Braun- und Gelbeisensteine in fufsdicken Bohnen von 80 Procent (Forstel) Eisengehalt finden, die aber ihres spärlichen Auftretens halber nicht bauwürdig sind. Ich halte diese Thone für das unterste Glied der Buntsandsteinformation, abgesetzt in einem Sumpfe, während der allmäligen Versandung des Zechsteinmeeres aus welcher sich der Buntsandstein erzeugte. Durch Steinbruchbau sind die Kalksteinlager aufgeschlossen bei Hummertroth, Kinzig, Kirchbrombach, Ob. Keinsbach, Erzbach und Weschnitz. Sie erreichen eine Mächtigkeit, welche zwischen 6 und 30 Fufs schwankt. Die Kalksteine zählen zum Rauchkalk des Zechsteins, fallen nach Südost unter Winkeln von 2 bis 10 Grad unter den Buntsandstein ein, ruhen auf schiefrig-körnigem Gneuse und haben weissen und rothen Sand zur Unterlage. Auf den Schichtflächen beobachtet man eine zahllose Menge, zuweilen prachtvoll gruppirter Mangandendriten und in den Steinbrüchen von Weschnitz viel ascheartiges Manganoxydhydrat. Mit dem Zechsteindolomit stehen Eisenkiesel im Zusammenhange, welche oft vielen Schwerspath, Eisenrahm, Eisenglanz, Eisenocker führen und Bivalvenabdrücke enthalten. So bei Hummertroth, Ob. Kinzig, Kirchbrombach, Ob. Keinsbach und Rohrbach.

**Wifsmann**, auf dessen Abhandlung\*) über das Zechsteinvorkommen im Odenwalde, mich Herr Dr. **Volger** von Frankfurt zuerst aufmerksam gemacht hat, spricht sich über die Bildung der petrefactenführenden Eisenkiesel also aus :

„Es seien zur Zeit der Bildung des Zechstein-Dolomits in jenen Gegenden auf Klüften der Erdkruste heifse Quellen aufgestiegen, welche mit Kieselerde, mit Eisen und Mangan in nicht weiter bestimmbarem Zustande und dann auch, so schwer auflöslich er immerhin sein mag, mit schwefelsaurem Baryt überladen waren, und diese Stoffe anfangs in die Klüfte als Gänge absetzten, dann aber über deren Mündung mehr oder weniger horizontal ausbreiteten, wo dann zufällig aus dem sie bedeckenden Meere Conchylien in sie hinabfielen.“

---

\*) Beiträge zur Geologie des Odenwaldes insbesondere der dasigen Zechsteinformation von **H. L. Wifsmann**. Jahrb. für Mineralogie von **Leonhard**, Bd. X (1839), S. 418.

Da wo sich die Wege von Hummertroth nach Gumpersberg und Höllerbach kreuzen, ist der Zechsteindolomit porös, zellig, schwammig, sehr leicht, mit Bitterspath, Kalkspath und Schwerspath erfüllt, durch Eisenoocker gelb und abfärbend; die Zellen sind mit Eisenglanz- und Eisenrahmlamellen ausgekleidet und enthalten Steinkerne von *Schizodus Schlotheimii*. Der Rauchkalk von Ob. Kinzig birgt an der Ziegelhütte prachtvolle Schwerspathkrystalle, und in einem Schachte zu Mittelkinzig fanden sich in den schwerspathreichen Eisenkieseln, Kupferglanz und Kupfergrün in derben Stücken.

Der Zechsteindolomit zeigt sich ausserdem in größern und kleinern Geschieben auf dem Felde bei Birket, Hembach, Langenbrombach, zwischen Stierbach und Büllstein, bei Rohrbach und der Alma bei Weschnitz. Er führt allerwärts Styloliten und Stinkstein, ist aber sonst arm an Thierversteinerungen. Der Rauchkalk wird durch Steinbruchbau gewonnen und gibt gebrannt einen vorzüglichen hydraulischen Mörtel. Ganz getrennt von dem bisher geschilderten Zechsteinvorkommen, finden wir den Zechsteindolomit an der Grenze einer kleineren Buntsandsteinparthie, welche durch Hebung des Gneuses von dem großen Sandsteingebiete im Osten der Section getrennt wurde, zwischen Hippelsbach und den Hundert Morgen, zwischen der Kohlbachermühle und Mummernroth. Der Zechsteindolomit, welcher zwischen Hippelsbach und den Hundert Morgen in Rollstücken auf dem Felde gefunden wird, ist roth und zellig und auf Syenitschiefer abgesetzt; zwischen Mummernroth und der Kohlbacher Mühle dagegen ruht er in Bänken auf schiefrig-körnigen Gneuse. Seine Decke ist ein leichter gelber oder schwarzer kalkiger Lehm von 1 bis 6 Fuß Mächtigkeit; unter ihm liegt der für den Zechstein so charakteristische rothe Thon und unter diesem steht der Zechstein als grauer, gerötheter Dolomit an. Er enthält größere und kleinere Geschiebe von Fettquarz, welche in den Kalkteig eingebacken sind, Karneol und in kleinen Drusen Bitter- und Kalkspath-Rhomböeder. Schwerspath, sowie Mangandendriten sind ziemlich häufig im Dolomite, dessen Bänke an der Kohlbachermühle unter Winkeln von 10 Grad nach Nordwest einfallen. Bei Mummernroth ist die Decke des Zechsteindolomites ein schwärzlicher Thon und die dünngeschichteten Kalke führen gleichfalls Fettquarzgeschiebe und fallen unter Winkeln von 2 Grad nach Nordwest unter den Buntsandstein ein.

## B. Triasformation.

Von den drei Hauptgliedern der Trias als Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper sind in unserer Section nur die beiden ersteren auf kleinem Raume vertreten; der Keuper fehlt ganz.

### 1) Die Buntsandsteinformation.

Der bunte Sandstein nimmt die ganze östliche Fläche der Section ein und ruht theils auf den krystallinischen Schiefen, theils auf dem Rauchkalk der Zechsteinformation. Eine vielfach gekrümmte Linie von Kocherbach im Süden über Oberscharbach, Litzelbach, Hammelbach,

Weschnitz, Erzbach, Rohrbach, Geiswiese, Ob. Keinsbach, Langen- und Kirchbrombach, Birket, Ob. Kinzig, Forstel und Annelsbach bis Pfirsbach im Norden der Section macht die Grenze zwischen dem Buntsandsteine und den krystallinischen Gesteinen. Zwischen Hammelbach und Ob. Keinsbach greift der bunte Sandstein über die metamorphischen Schiefer herauf und steigt zu einer steilen, mehrere hundert Fuß hohen Terasse an. Auf den Strecken zwischen Pfirsbach und Langenbrombach einerseits, Kocher- und Litzelbach andernseits lagert er sich dem Gneuse an und nimmt dann ein niedrigeres Niveau ein. Der Buntsandstein erreicht eine Mächtigkeit von zwei- bis dreihundert Meter; er hat in den Steinbrüchen von Hammelbach, Erbach, Steinbach, Steinbuch und der Spreng horizontale Lage oder ist nur schwach gegen den Horizont geneigt und ist in 2 bis 15 Fuß dicke Bänke abgetheilt, welche durch  $\frac{1}{2}$  bis 5 Zoll breite braunrothe Thonbänder getrennt sind. Die Bänke sind durch Querabsonderung wieder in Pfeiler oder unregelmäßig geformte Blöcke zerlegt. Der bunte Sandstein besteht aus mikroskopischen, röthlich durchscheinenden Quarzkörnern, welche durch thoniges oder kieseliges Cement verkittet oder ohne Cement durch einen Krystallisationsproceß aneinander gereiht sind. Die letzte Varietät ist in den sogenannten Findlingen vertreten und das Korn von Mohnsamen-Größe. Sie werden vorzugsweise zu Mühlsteinen verwendet, wovon allein Zell jährlich eine große Anzahl nach allen Gegenden Deutschlands versendet. Die Farbe des Buntsandsteins ist hellroth, welche den Einflüssen der Atmosphärien ausgesetzt, nach und nach in ein dunkles Braunroth übergeht; häufig wechseln hellere und dunklere Streifen darin. Die färbende Substanz ist Eisenoxyd; wird dasselbe fortgeführt, so bleiben weißgraue Flecken und Streifen. Der bunte Sandstein umschließt in Höhlungen häufig leberbraune Thongallen und enthält zuweilen eine große Menge weiße und graue Kaliglimmerschüppchen; er ist aus dem Detritus der krystallinischen Gesteine hervorgegangen, und man findet in ihm weder fossile Pflanzen- noch Thierreste; er ist eine Landformation — ein Küsten-, Wüsten- und Dünengebilde. Das unterste Glied des Buntsandsteins ist ein rother, eisenschüssiger Thon, welcher die Decke des Zechstein-Dolomites bildet oder auf den krystallinischen Gesteinen abgelagert erscheint. Man beobachtet den rothen Thon längs der Buntsandsteingrenze, wo er zugleich durch Steinbruchbau und Bergbau aufgeschlossen ist und eine Mächtigkeit von 1 bis 6 Fuß hat. Das oberste Glied ist gleichfalls ein rother Thon oder Letten, welcher in der Section Erbach nur auf einer kleinen Strecke bei Steinbach dem Muschelkalke als Unterlage dient und als Röth den ganzen östlichen Flügel der Muschelkalkmulde über Michelstadt begleitet. Diese Thone enthalten Braun-, Gelb- und Schwarzeisensteine meist als zerfressener Eisenkiesel in kleinern und größern stockförmigen Massen bei Langenbrombach, Rehbach, Asselbron, an den vier Stücken, bei Weschnitz und Kirchbrombach. Man hat seit mehreren Jahren Bergbau auf diese Eisensteine forcirt, damit aber wenig Glück gemacht, weil der Eisenstein zu wenig procenthaltig ist. Das Buntsandsteingebiet ist durch eine Menge kleiner Thälchen, welche in das

lange, allmählig ansteigende Mümmingthal einmünden, nach allen Richtungen zerrissen. Die geraden, langgezogenen und abgerundeten Berg Rücken ermüden das Auge durch ihre Einförmigkeit. Nirgends gewahrt hervorstehende Felsklippen mit ihren bizarren Gestalten, wie solche das krystallinische Gestein im Westen der Karte aufzuweisen hat; wohl aber sieht man häufig übereinander gestürzte abgerundete, plattenförmige Sandsteinblöcke von ungewöhnlicher Härte. Die oben genannten Steinbrüche liefern das Material zu Monumenten und architectonischen Zwecken aller Art. Die Sandsteinparzelle von der Kohlbachermühle und den Hundert Morgen ist durch Hebung der krystallinischen Gesteine von dem oben geschilderten Sandsteingebiete getrennt und ruht zwischen Gr. Bieberau, Hippelsbach und der Kohlbachermühle auf Syenit und Syenitschiefer, während seine ganze Ostseite schiefrig-körnigen Gneus zur Unterlage hat.

## 2) Die Muschelkalkformation.

Am östlichen Rande unserer Section begegnen wir bei dem Dorfe Steinbach einer Parthie Muschelkalk, welche in die Section Michelstadt fortsetzt und die niedern Hügel um Michelstadt, Stockheim, Dorferbach und Erbach zusammensetzt. Die Ablagerung fand statt in einer Bucht jenes Weltmeeres, welches von Südost über die Buntsandsteinformation hereinbrach und das grofse Muschelkalkland Badens, Würtembergs und Frankens schuf. Diese Bucht wurde durch spätere Hebung des Buntsandsteins oder durch Senkung ihrer Sohle von dem Oceane getrennt, so dafs jetzt der Muschelkalk eine ganz abgeschlossene Mulde bildet, deren Längsachse von Steinbach bis Erbach  $\frac{3}{4}$  Stunden beträgt und von Südost nach Nordwest streicht. Der nordwestliche Flügel der Mulde ist in der Richtung der Längsachse unter Winkeln von 10 bis 20 Grad nach Ostsüdost geneigt. In den Steinbrüchen zu Michelstadt und Dorferbach dagegen bemerkt man horizontale Lage. Der Muschelkalk ruht unmittelbar auf dem Röth als der obersten Lage des Buntsandsteins, welcher zugleich als rother, eisenschüssiger Thon den ganzen östlichen Flügel der Mulde begleitet. Die Anhydritgruppe mit ihren Steinsalzlagern fehlt und ist weder durch Mergel noch durch Wellenkalk vertreten. Die ganze Ablagerung bildet sonach den Hauptmuschelkalk und führt eine grofse Menge versteinerner, jetzt im Mittelmeer und im indischen Ocean in ähnlichen Arten noch lebenden Radiaten, Brachyopoden, Conchiferen und Gasteropoden und ist somit eine reine Meeresbildung. Der Hauptmuschelkalk besteht aus dünngeschichteten, compacten, rauchgrauen Kalksteinen von muscheligem Bruche, welche durch Mergelblätter, die wulstförmige Erhöhungen — versteinerten Muscheln, Schnecken u. s. w. ähnlich, auf den Schichtflächen erzeugen, getrennt sind. Diese dünngeschichteten Lager bilden zusammen 3 bis 4 Fufs dicke Bänke, wechsellagern mit Bänken eines krystallinischen, rauchgrauen Kalksteins, zwischen welchen sich 5 Zoll breite Conglomeratbänder, bestehend aus Thon und Kalksteinbrocken, abgesetzt haben. Der Muschelkalk liegt meistens zu Tag und ist nur im westlichen und südlichen Theile der Mulde von Diluvialmassen als Sand, Löss und

rundgeriebenen Sandsteinbrocken (Bierkeller zwischen Erbach und Stockheim) bedeckt. Der Muschelkalk erreicht eine Mächtigkeit von hundert und mehr Metern, wird theils als Chausseestein benützt, theils gebrannt und gibt dann mit Quarzsand vermischte einen vorzüglichen Mörtel. Bei Steinbach finden sich rundliche Knollen von thonigem Sphärosiderit in ihm, auf den vormals Bergbau betrieben wurde, der aber bald wieder, wegen nicht bauwürdiger Mächtigkeit des Eisensteins, aufgegeben werden mußte.

Ich habe in dem Muschelkalk folgende Petrefacten gefunden :

1) Stielstücke von *Encrinus liliformis* v. **Schloth.** (Steinbruch von Michelstadt).

2) *Terebratula vulgaris* v. **Schloth.** (Steinbruch bei Michelstadt).

3) *Lima lineata* **Desh.** (Dorferbach und Michelstadt).

4) *Lima striata* **Desh.** (Dorferbach, Michelstadt, Steinbach).

5) *Pecten laevigatus* v. **Schloth.** (Michelstadt).

6) *Ostrea placunoides* **Schübler.** Steinbach und Michelstadt).

7) *Avicula socialis* v. **Schloth.** (Steinbach).

8) *Turbonilla dubia* **Bronn** (Steinbach).

9) *Turbo gregarius* v. **Schloth.** (Steinbach).

10) *Dentalium laeve* v. **Schloth.** (Dorferbach).

Nach einer Mittheilung des Herrn Apotheker Dr. **Luck** zu Michelstadt, sollen weiter vorkommen :

11) *Pentacrinus dubius* **Goldf.**

12) *Spirifer fragilis* v. **Schloth.**

13) *Myophoria vulgaris* v. **Schloth.**

14) *Culina Schlotheimii* **Quenst.**

15) *Placodus gigas* **Ag.** — Zähne.

### C. Diluvium.

Ablagerungen aus der Zeit des *Elephas primigenius*.

#### 1) Löss.

Der Löss ist eine gelblich-weiße, kalkige, sandige, erdige, sich zart anfühlende, lockere Masse, welche bei 15 Fuß Tiefe oft so hart wird, daß man nur mit dem Bickel Stücke lostrennen kann. Er löst sich in Salzsäure unter starkem Brausen und läßt einen gelblichen Quarzschlamm zurück, der getrocknet zu feinem Staube wird. Der Löss ist aus der Zersetzung der krystallinischen Gesteine hervorgegangen, entweder an Ort und Stelle, oder die atmosphärischen Wasser haben die Quarz-, Feldspath- und Glimmerkörperchen von der Höhe der Berge an die Abhänge oder in die Thalsole herabgeführt, wo sie, zersetzend über Rasenboden, in sehr langen Zeiträumen so mächtige Ablagerungen gebildet haben. Der Löss ist keine unter Wasser abgesetzte Formation, sondern eine Landformation; denn man findet in ihm nur Landschnecken und Landthiere. Er schließt häufig knollige und nierenförmige, kalkmergelige Concretionen ein, die sich zuweilen über Pflanzenwurzeln gebildet haben, unter dem Namen

Löfskindel bekannt sind und an manchen Orten durch Aufnahme von Quarzsand in dünnschiefrige, kalkige Sandsteine übergehen, welche man Löffsandsteine nennen könnte. So bei Zell und unterhalb der Hubenheck zwischen Bensheim und Heppenheim (Section Worms). Die Löffsablagerungen dauern noch fort und erreichen eine Mächtigkeit von 5 bis 40 Fufs. Man beobachtet sie im Buntsandsteingebiete bei Litzelbach, Wahlen, Grasellenbach, Hüttenthal, Güttersbach, Hiltersklingen, Mosau, Erbach, Kirchbrombach, Forstel, Mömlingkrumbach, Annelsbach, Höchst und zwischen der Kolmbachermühle und Ob. Klingen; im Gebiete der krystallinischen Gesteine bei Brensbach, Hippelsbach, Wersau, Gr. Bieberau, Nd. Hausen, Rodau, Rohrbach, Kl. Bieberau, Ernsthofen, fränkisch Crumbach, Reichelsheim, zwischen Crumbach, Fürth, Rim- und Zotzenbach; bei Lörzenbach, Erbach, Kirschhausen, Erlenbach, Gronau, Wilmshausen, Reichenbach, Ernsthofen, Brandau und Niederbeerbach. Der angeschwemmte und auf Rasenboden abgesetzte Löffs geht häufig in grauen Letten oder gelben Lehm über und wird dann zur Ziegel- und Backsteinfabrikation benützt. — Bei Nd. Beerbach findet sich unter Löffs ein ziemlich mächtiges Kalksteinlager, welches dem Diluvium angehört. Der Kalk ist den Löffsmännchen ähnlich und umschließt kleinere und gröfsere abgerundete, auch eckige Körner von Syenit, Syonitschiefer, Feldspath und Fettquarz.

Petrefacten im Löffs :

a) Mollusken.

*Helix pulchella*,  
*H. sericea*,  
*H. strigella*,  
*H. nemoralis*,  
*H. costata*,  
*H. hispida*,

*Helix candidula*,  
*Pupa muscorum*,  
*P. Pygmaea*,  
*P. frumentum*,  
*Clausilia similis*,  
*Achantina avicula*.

b) Wirbelthiere.

Knochenreste von :

- 1) *Cervus primigenius* — Fürth,
- 2) *Ursus spelaeus* — Fürth.

D. Alluvium.

Zu dem Alluvium rechne ich die schwachen Torflager bei Beedenkirchen und Grasellenbach.

Mineralquellen.

Es ist mir in der ganzen Section Erbach nur eine einzige Mineralquelle bekannt, nämlich bei Reichenbach. Diese Quelle hat ihren Sitz im Liegenden des Quarzanges in Gneus und ist von einer mehrere Fufs dicken Thonschicht bedeckt. Das Wasser hat eine constante Wärme von 15 Grad Reaumur. Nach einer chemischen Untersuchung des Herrn Medicinalrath Dr. Winkler zu Darmstadt, gehört die Quelle zu den sogenannten weichen Wassern und enthält nach der qualitativen Analyse : „Wenig in Kohlen-

säure gelösten kohlensauren Kalk (sogenannten neutralen kohlensauren Kalk); sehr wenig Chlorkalium; kaum eine Spur von schwefelsauren Salzen.

### III. Eruptivgesteine.

#### Der Basalt.

Die Eruptivgesteine unseres Gebietes beschränken sich auf die Gruppe der Basalte und zwar auf den Basalt selbst. Die Basaltlava erscheint als Spaltenausfüllung in den krystallinischen Gesteinen, oder sie hat dieselben überfließend durchsetzt. Der Basalt ist von schwarzblauer, homogener Grundmasse, in welcher körnige Parthien von grünem und honiggelbem Olivin liegen. Labrador und Augit sind auch hier, wie anderwärts, die wesentlichen Bestandtheile der Basaltlava denen allerlei Zersetzungsproducte wie kohlensaurer Kalk, wasserhaltige Zeolithe und Magnet Eisen beigemengt sind. Die Zeit der Eruption ist wohl schwer zu ermitteln. Jedenfalls aber stehen die Basaltausbrüche mit denen bei Gr. Biebau, Otzberg, Rofsdorf und Mefel (Section Dieburg), vielleicht selbst mit denen der Wetterau und des Vogelsbergs im Zusammenhange und dürfte sonach die Eruption in die Tertiärzeit fallen. — Auf der Nordseite der Neunkircherhöhe im Hauptfahrwege von Webern nach Lützelbach, ganz in der Nähe des erstgenannten Dorfes, durchbricht Kugelbasalt feinkörnigen Syenitschiefer. Gleichfalls durchsetzt Kugelbasalt den Glimmerschiefer in der Nähe des Fahrwegs von Eulsbach nach der Seidenbacherhöhe. An beiden Stellen ist der Basalt nicht aufgeschlossen und läßt somit keine gründliche Beobachtung zu. Ein bedeutenderes Vorkommen von Basalt findet man zwischen Walderlenbach und Mittlechtern. Die Basaltlava bildet hier einen über 20 Fuß breiten Gang in porphyrtigem Syenit, ist kugel- und plattenförmig abgesondert und enthält in ihrer schwarzblauen Grundmasse als Zersetzungsproduct eine Menge weiße und rosenrothe Flecken, welche zu der Familie der Zeolithe zählen. Der Syenit ist in den Saalbändern bis zu 2 Zoll Durchmesser vergrößert.

#### Einfache Mineralien.

1) Olivin in Körnern, gelb und grün. Webern, Eulsbach und Mittlechtern.

2) Hornblende, schwarz, in mikroskopischen Individuen. Mittlechtern.

3) Stilbit, amorph, weiß und rosenroth, in kleinern und größern Flecken. Mittlechtern.

4) Tachylit, mikroskopische, flachmuschelige Aggregate. Mittlechtern.

5) Speckstein, pistaziengrün. Mittlechtern.

6) Bol, gelblich. Mittlechtern.

7) Labradorit, krystallinisch-blättrige Individuen, rauchgrau, glasglänzend mit lebhafter Farbenwandlung in blauen, grünen, gelben, rothen und braunen Farben — parallel gestreift. Mittlechtern.

# Vegetationszeiten im Jahre

Mitgetheilt von Herrn

| N a m e n                                        | 1 8 6 2.  |         |            |          |           |           |          |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------|-----------|-----------|----------|
|                                                  | 1.        | 2.      | 3.         | 4.       | 5.        | 6.        | 7.       |
|                                                  | B. O. s.  | a. Bel. | e. B.      | V. B.    | e. Fr. r. | a. Fr. r. | a. L. V. |
| <i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rofskastanie     | B 6. IV   | 20. IV  | 3. V       | 6. V     | 0         | 0         | 22. X    |
| <i>Castanea vulgaris</i> , zahme Kastanie        | A —       | —       | 14. VI     | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B 12. IV  | 12. V   | 7. VII     | —        | 0         | 0         | 15. X    |
| <i>Catalpa syringaeifolia</i> , Trompetenbaum    | B 7. V    | 9. V    | 21. VII    | 28. VII  | 0         | 0         | 4. X     |
|                                                  | A —       | —       | 25. III u. | —        | —         | —         | —        |
| <i>Colchicum autumnale</i> , Zeitlose            | B 20. III | —       | 19. VII    | 22. VIII | 6. VI     | —         | —        |
|                                                  |           |         | 4. VIII    |          |           |           |          |
| <i>Dianthus Carthusianorum</i> , Karthäusernelke | B 13. III | —       | 9. V       | 12. VI   | 3. VIII   | 6. VIII   | 14. VIII |
| <i>Lilium candidum</i> , weiße Lilie             | A —       | —       | 9. VI      | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B —       | 8. IV   | 20. VI     | 22. VI   | 0         | 0         | —        |
| <i>Persica vulgaris</i> , Pfirsich               | A —       | —       | 28. III    | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B 8. IV   | 17. IV  | 5. IV      | 8. IV    | 0         | 0         | 1. XI    |
| <i>Prunus Avium</i> , Süßkirsche                 | A —       | —       | —          | —        | 6. V      | —         | —        |
|                                                  | B 8. IV   | 14. IV  | 7. IV      | 9. IV    | 15. VI    | 28. VI    | 1. XI    |
| <i>Pyrus communis</i> , Birnbaum                 | A —       | —       | 9. IV      | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B 8. IV   | 21. IV  | 11. IV     | 19. IV   | 26. VIII  | 16. IX    | 3. X     |
| <i>Pyrus Malus</i> , Apfelbaum                   | A —       | —       | 18. IV     | 27. IV   | —         | —         | —        |
|                                                  | B 10. IV  | 3. V    | 26. IV     | 3. V     | 3. IX     | 17. IX    | 4. XI    |
| <i>Ribes Grossularia</i> , Stachelbeerstrauch    | A 12. III | —       | 3. IV      | —        | —         | 6. VII    | —        |
|                                                  | B 13. III | 2. IV   | 4. IV      | 8. IV    | 10. IV    | —         | 1. XI    |
| <i>Ribes rubrum</i> , Johannisbeerstrauch        | A —       | —       | —          | —        | 1. VI     | —         | —        |
|                                                  | B 21. III | 10. IV  | 6. IV      | 9. IV    | 7. VI     | 24. VI    | 18. IX   |
| <i>Sambucus nigra</i> , Hollunder                | A 14. III | —       | —          | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B 20. III | 10. IV  | 11. V      | 26. V    | 28. VII   | 15. VIII  | 7. IX    |
| <i>Syringa vulgaris</i> , Syringe                | A 21. III | —       | 20. IV     | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B 26. III | 6. IV   | 5. V       | 0        | 0         | 0         | 30. IX   |
| <i>Tilia parvifolia</i> , Winterlinde            | A —       | —       | 15. VI     | 23. VI   | —         | —         | —        |
|                                                  | B 13. IV  | 26. IV  | 15. VI     | 23. VI   | 20. IX    | 2. X      | 19. IX   |
| <i>Triticum vulgare hib.</i> , Weizen            | A —       | —       | —          | —        | —         | —         | —        |
|                                                  | B —       | —       | 3. VI      | 8. VI    | 18. VII   | 6. VIII   | 6. VIII  |
| <i>Vitis vinifera</i> , Weinstock                | A —       | —       | 24. V      | —        | 31. VII   | —         | —        |
|                                                  | B 21. IV  | 11. V   | 4. VI      | 10. VI   | 26. VIII  | 20. IX    | 27. X    |
| Letzter Frühlingsfrost oder Reif . . . . .       | 16. IV    | —       | —          | —        | —         | —         | —        |
| Erster Herbstfrost oder Reif . . . . .           | 23. IX    | —       | —          | —        | —         | —         | —        |

Anmerkung. Vgl. den 9. Bericht S. 74. — Zeichen und Abkürzungen : 1. (B. O. s.) erstes Sichtbarwerden der Blattoberfläche. 2. (a. Bel.) allgemeine Belaubung. 3. (e. B.) erste Blüthe offen. 4. (V. B.) Vollblüthe. 5. (e. Fr. r.) erste normale Frucht reif. 6. (a. Fr. r.) allgemeine Fruchtreife. 7. (a. L. V.) allgemeine Laubverfärbung. 8. (a. L. F.) allgemeiner Laubfall. — A an beliebigen Stellen in und um Gießen; B an denselben Exemplaren oder Beeten wie bisher. — Beobachter : Prof. H. Hoffmann, Univ.-Gärtner W. Weifs und J. F. Müller.

# 1862 und 1863 in Giessen.

Prof. H. Hoffmann.

| 1862.          | 1 8 6 3.       |               |                     |                 |                 |                 |                 |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 8.<br>a. L. F. | 1.<br>B. O. s. | 2.<br>a. Bel. | 3.<br>e. B.         | 4.<br>V. B.     | 5.<br>e. Fr. r. | 6.<br>a. Fr. r. | 7.<br>a. L. V.  | 8.<br>a. L. F. |
| 5. XI<br>—     | 10. IV<br>—    | 16. IV<br>—   | 6. V<br>23. VI      | 12. V<br>30. VI | 23. IX<br>—     | 12. X<br>—      | 17. X<br>17. X  | 24. X<br>—     |
| 4. XI          | 27. IV         | 14. V         | 29. VI              | 23. VII         | 24. IX          | 27. IX          | 17. X           | 24. X          |
| 1. XI<br>—     | 12. V<br>—     | 28. V<br>—    | 30. VII<br>17. VIII | 9. VIII<br>—    | 0<br>—          | 0<br>—          | 6. X<br>20. VII | 25. X<br>—     |
| —              | 18. II         | 14. IV        | 3. IX               | 17. IX          | 21. VI          | —               | —               | —              |
| —              | 13. III        | 14. V         | 12. VI              | 27. VI          | 3. IX           | —               | —               | —              |
| —              | —              | —             | 30. VI              | —               | —               | —               | —               | —              |
| —              | —              | 14. IV        | 4. VII              | 6. VII          | 0               | 0               | —               | —              |
| —              | 14. IV         | —             | 1. IV               | —               | 10. IX          | —               | —               | —              |
| 10. XI         | 16. IV         | 2. V          | 14. IV              | 17. IV          | 5. X            | —               | —               | 9. XI          |
| —              | —              | —             | 14. IV              | 22. IV          | 3. VI           | —               | —               | —              |
| 7. XI          | 10. IV         | 29. IV        | 19. IV              | 22. IV          | 30. VI          | 14. VII         | 30. X           | 5. XI          |
| —              | 14. IV         | —             | 15. IV              | 25. IV          | 1. VIII         | —               | —               | —              |
| 18. X          | 16. IV         | 2. V          | 19. IV              | 25. IV          | 19. IX          | 24. IX          | 4. X            | 13. X          |
| —              | 14. IV         | —             | 18. IV              | 8. V            | —               | 4. X            | —               | —              |
| 10. XI         | 19. IV         | —             | 6. V                | 11. V           | —               | 4. X            | 30. X           | 9. XI          |
| —              | 25. II         | 9. IV         | —                   | —               | —               | 26. VII         | —               | —              |
| —              | 9. III         | 9. IV         | —                   | 19. IV          | 2. VII          | —               | 4. XI           | 7. XI          |
| —              | —              | —             | —                   | —               | 21. VI          | —               | —               | —              |
| —              | 26. III        | 9. IV         | —                   | 20. IV          | 30. VI          | —               | —               | —              |
| —              | 13. II         | —             | 10. V               | 11. VI          | 3. VIII         | 3. IX           | —               | —              |
| 6. X           | 5. III         | 19. IV        | 19. V               | 11. VI          | 13. VIII        | 16. IX          | 26. VIII        | 13. X          |
| —              | —              | —             | 27. IV              | 12. V           | —               | —               | —               | —              |
| 10. XI         | 29. III        | 19. IV        | 8. V                | 11. V           | —               | —               | 29. X           | 31. X          |
| —              | —              | —             | —                   | —               | —               | —               | —               | 16. X          |
| 18. X          | 19. IV         | 29. IV        | 29. VI              | 3. VII          | —               | —               | 27. IX          | 13. X          |
| —              | —              | —             | —                   | 25. VI          | —               | 2. VIII         | —               | —              |
| —              | —              | —             | 17. VI              | 25. VI          | 16. VII         | 30. VII         | 30. VII         | —              |
| —              | —              | —             | 21. VI              | —               | —               | —               | —               | —              |
| 10. XI         | 27. IV         | 17. V         | 25. VI              | 30. VI          | —               | 11. IX          | 14. X           | 30. X          |
| —              | —              | —             | —                   | —               | —               | —               | —               | —              |
| —              | 2. VI!         | —             | —                   | —               | —               | —               | —               | —              |
| —              | 25. X          | —             | —                   | —               | —               | —               | —               | —              |

# VII.

## Meteorologische Beiträge.

### I.

### Meteorologische Beobachtungen

Von dem Großh. Salinen-  
Zusammengestellt vom Großh.

|                                                                        | Januar          | Februar         | März          | April          | Mai            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| I. Thermometer nach Réaum.                                             |                 |                 |               |                |                |
| Mittel der Beobachtungen                                               |                 |                 |               |                |                |
| um 7 Uhr Morgens                                                       | 1,13            | — 1,00          | 2,03          | 4,29           | 8,76           |
| um 12 Uhr Mittags                                                      | 2,97            | 3,71            | 6,07          | 11,05          | 13,83          |
| um 9 Uhr Abends                                                        | 1,38            | 0,52            | 2,73          | 5,55           | 8,76           |
| Mittel aus sämtlichen Beobachtungen                                    | 1,82            | 1,08            | 3,61          | 6,96           | 10,45          |
| Höchstes Mittel eines Tages                                            | 5,30<br>(31.)   | 4,87<br>(7.)    | 7,53<br>(26.) | 10,70<br>(16.) | 15,87<br>(18.) |
| Niedrigstes „ „ „                                                      | — 2,63<br>(16.) | — 2,20<br>(15.) | 0,03<br>(1.)  | 2,47<br>(1.)   | 7,43<br>(1.)   |
| Höchster zu den oben angegebenen Stunden beobachteter Thermometerstand | 6,0<br>(31.)    | 5,9<br>(4.)     | 11,2<br>(26.) | 15,8<br>(6.)   | 20,0<br>(17.)  |
| Tiefster zu den oben angegebenen Stunden beobachteter Thermometerstand | — 4,7<br>(16.)  | — 6,2<br>(22.)  | — 2,2<br>(1.) | — 1,1<br>(2.)  | 4,9<br>(1.)    |
| Größter Unterschied der Thermometerstände                              | 10,7            | 12,1            | 13,4          | 16,9           | 15,1           |
| Anzahl der Tage, an welchen die mittlere Temperatur 0 oder unter 0 war | 5               | 9               | —             | —              | —              |
| Anzahl der Tage, an welchen die Temperatur auf 0 oder unter 0 sank     | 11              | 20              | 9             | 3              | —              |
| Anzahl der Tage an welchen die Temperatur auf 20° und darüber stieg    | —               | —               | —             | —              | 1              |

I.

zu Salzhausen im Jahr 1863.

Inspector Herrn **Tasche**.

Obersteiger Herrn **Plock**.

| Jun   | Juli         | August | September | October | November | December | Jahr   |
|-------|--------------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 12,05 | 11,53        | 12,17  | 7,48      | 5,68    | 1,08     | 1,40     | 5,55   |
| 16,37 | 16,74        | 18,70  | 13,25     | 10,92   | 4,34     | 2,72     | 10,05  |
| 10,50 | 10,89        | 12,92  | 8,41      | 6,58    | 1,90     | 1,46     | 5,96   |
| 12,97 | 13,05        | 14,59  | 9,71      | 7,72    | 2,44     | 1,86     | 7,19   |
| 17,30 | 16,57        | 19,80  | 13,57     | 11,43   | 9,23     | 6,70     | 19,80  |
| (25.) | (2.)         | (10.)  | (14.)     | (15.)   | (5.)     | (12.)    |        |
| 9,73  | 9,03         | 9,30   | 5,70      | 2,50    | — 3,83   | 3,66     | — 2,20 |
| (14.) | (17.)        | (22.)  | (27.)     | (25.)   | (30.)    | (1.)     |        |
| 22,8  | 20,7         | 25,0   | 20,0      | 16,0    | 10,3     | 6,9      | 25,0   |
| (25.) | (29.)        | (10.)  | (1.)      | (15.)   | (5.)     | (12.)    |        |
| 7,0   | 7,0          | 7,0    | 3,5       | — 1,5   | — 6,2    | — 6,0    | — 6,2  |
| (2.)  | (17. u. 31.) | (22.)  | (27.)     | (25.)   | (31.)    | (1.)     |        |
| 15,8  | 13,7         | 18,0   | 16,5      | 17,5    | 16,5     | 12,9     | 31,2   |
| —     | —            | —      | —         | —       | 7        | 6        | 27     |
| —     | —            | —      | —         | 1       | 11       | 11       | 66     |
| 5     | 1            | 14     | 1         | —       | —        | —        | 22     |

|                                                                                                                                                                                      | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| II. Winde bei zweimaligertäglicher Beobachtung.                                                                                                                                      |         |         |         |         |         |
| Anzahl der Beobachtungen                                                                                                                                                             | 62      | 56      | 62      | 60      | 62      |
| Anzahl der Nordwinde                                                                                                                                                                 | 2       | 3       | 1       | 1       | —       |
| " " Nordostwinde                                                                                                                                                                     | 2       | —       | 5       | —       | 14      |
| " " Ostwinde                                                                                                                                                                         | 4       | —       | 2       | 3       | 7       |
| " " Südostwinde                                                                                                                                                                      | 7       | 10      | 7       | 9       | 5       |
| " " Südwinde                                                                                                                                                                         | 6       | 2       | 7       | 5       | 2       |
| " " Südwestwinde                                                                                                                                                                     | 27      | 28      | 23      | 18      | 19      |
| " " Westwinde                                                                                                                                                                        | 13      | 9       | 16      | 20      | 8       |
| " " Nordwestwinde                                                                                                                                                                    | 1       | 4       | 1       | 4       | 7       |
| Wenn die Anzahl der Beobachtung = 100 gesetzt wird, so verhalten sich die vorstehenden 8 Winde der Reihe nach wie die Zahlen<br>1,5 : 5,9 : 4,0 : 12,0 :<br>9,3 : 41,0 : 18,2 : 8,1. |         |         |         |         |         |
| III. Niederschläge und Witterung.                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |
| Anzahl der Tage mit                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| Regen                                                                                                                                                                                | 9       | 4       | 9       | 6       | 8       |
| Schnee                                                                                                                                                                               | 2       | 2       | 2       | 1       | —       |
| Schnee und Regen                                                                                                                                                                     | —       | —       | 1       | 1       | —       |
| Gewitter                                                                                                                                                                             | 1       | —       | —       | —       | —       |
| Hagel und Schlossen                                                                                                                                                                  | —       | —       | —       | —       | —       |
| Nebel                                                                                                                                                                                | —       | —       | —       | —       | 1       |
| Stürmen                                                                                                                                                                              | 2       | —       | —       | —       | —       |
| Heitere Tage                                                                                                                                                                         | 7       | 15      | 8       | 17      | 13      |
| Trübe und bedeckte Tage                                                                                                                                                              | 21      | 7       | 16      | 3       | 12      |
| Gemischte Tage                                                                                                                                                                       | 3       | 6       | 7       | 10      | 6       |
| III. Gröfse des Niederschlags durch den Regenmesser bestimmt in Par. Zollen.                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Höhe des Niederschlags                                                                                                                                                               | 1,31450 | 0,48995 | 0,83411 | 0,75285 | 1,17588 |
| Reducirt in Darmst. Zollen                                                                                                                                                           | —       | —       | —       | —       | —       |
| Auf Schnee kommen in Par. Zollen von dem gesammten Niederschlag circa                                                                                                                | 0,27485 | 0,31070 | 0,02390 | —       | —       |

| Juni    | Juli    | August  | September | October | November | December | Jahr     |
|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| 60      | 62      | 62      | 60        | 62      | 60       | 62       | 730      |
| —       | —       | 2       | 1         | —       | 1        | —        | 11       |
| —       | 7       | 1       | —         | 1       | 5        | 8        | 43       |
| 4       | 5       | 2       | —         | —       | 2        | —        | 29       |
| 6       | 9       | 6       | —         | 15      | 9        | 5        | 88       |
| 18      | 3       | 6       | 4         | 3       | 9        | 3        | 68       |
| 1       | 12      | 30      | 44        | 39      | 26       | 32       | 299      |
| 5       | 21      | 15      | 10        | 2       | 5        | 9        | 133      |
| 26      | 5       | —       | 1         | 2       | 3        | 5        | 59       |
| 11      | 8       | 14      | 14        | 6       | 6        | 10       | 105      |
| —       | —       | —       | —         | —       | —        | 1        | 8        |
| —       | —       | —       | —         | —       | —        | 2        | 4        |
| 3       | 2       | 5       | 1         | —       | —        | 1        | 13       |
| —       | —       | —       | —         | —       | —        | 1        | 1        |
| —       | —       | —       | 1         | 2       | 1        | 1        | 6        |
| —       | —       | —       | 1         | 1       | 1        | 4        | 9        |
| 11      | 21      | 18      | 14        | 15      | 8        | 7        | 154      |
| 8       | 7       | 7       | 8         | 12      | 19       | 22       | 142      |
| 11      | 3       | 6       | 8         | 4       | 3        | 2        | 69       |
| 2,62661 | 1,11374 | 1,80445 | 2,97555   | 1,12808 | 1,12330  | 1,45312  | 16,79214 |
| —       | —       | —       | —         | —       | —        | —        | 18,182   |
| —       | —       | —       | —         | —       | —        | —        | 0,60945  |

II.

Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen

Mitgetheilt von Herrn

1862.

| Zeit  | Lufttemperatur im Schatten            |                                       |                      |        |                         | Atmo-<br>sphär.<br>Nieder-<br>schlag<br>(Regen u.<br>Schnee) in<br>Par. Zol-<br>len (an . .<br>Tagen) | Schneedecke um 12<br>Uhr an . . Tagen | Schneefall an . .<br>Tagen | Höhe der Schneedecke,<br>höchste (Par. Zoll) um<br>9 Uhr V. M. |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       | Maxi-<br>mum<br>des<br>Monats<br>° R. | Mini-<br>mum<br>des<br>Monats<br>° R. | Mittel der täglichen |        |                         |                                                                                                       |                                       |                            |                                                                |
|       |                                       |                                       | Maxima               | Minima | Maxima<br>und<br>Minima |                                                                                                       |                                       |                            |                                                                |
| Jan.  | + 8,0                                 | — 14,2                                | + 0,6                | — 3,6  | — 1,5                   | 2,58<br>(18)                                                                                          | 11                                    | 8                          | 2,8                                                            |
| Febr. | + 7,0                                 | — 11,0                                | + 2,3                | — 1,0  | + 0,7                   | 1,37<br>(11)                                                                                          | 0                                     | 4                          | 0,0                                                            |
| März  | + 13,2                                | — 13,5                                | + 7,8                | + 0,6  | + 4,2                   | 1,63<br>(10)                                                                                          | 3                                     | 4                          | 2,0                                                            |
| April | + 20,0                                | — 4,0                                 | + 11,8               | + 3,7  | + 7,7                   | 1,59<br>(11)                                                                                          | 0                                     | 4                          | 0,0                                                            |
| Mai   | + 18,5                                | + 4,2                                 | + 15,7               | + 7,8  | + 11,8                  | 3,84<br>(12)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Juni  | + 22,0                                | + 5,0                                 | + 15,3               | + 8,4  | + 11,8                  | 3,34<br>(18)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Juli  | + 22,2                                | + 4,3                                 | + 17,2               | + 9,5  | + 13,3                  | 8,28 !<br>(20)                                                                                        | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Aug.  | + 19,8                                | + 4,9                                 | + 17,0               | + 9,1  | + 13,1                  | 1,06<br>(10)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Sept. | + 19,8                                | 0,0                                   | + 15,4               | + 7,4  | + 11,4                  | 0,63<br>(10)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Oct.  | + 18,0                                | + 0,2                                 | + 11,7               | + 5,1  | + 8,4                   | 2,35<br>(16)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Nov.  | + 10,0                                | — 9,6                                 | + 4,8                | + 1,5  | + 3,2                   | 0,97<br>(15)                                                                                          | 2                                     | 3                          | 1,0                                                            |
| Dec.  | + 6,5                                 | — 9,0                                 | + 3,5                | — 0,7  | + 1,4                   | 2,47<br>(19)                                                                                          | 2                                     | 10                         | 0,4                                                            |
|       |                                       |                                       |                      |        |                         | Summe                                                                                                 | Summe                                 | Summe                      | Maxi-<br>mum                                                   |
| Jahr  | + 15,4                                | — 3,5                                 | + 10,3               | + 3,9  | + 7,1                   | 30,01<br>(170)                                                                                        | 18                                    | 33                         | 2,8                                                            |

II.

im botanischen Garten zu Gießen.

Prof. H. Hoffmann.

1863.

| Zeit             | Lufttemperatur im Schatten            |                                       |                      |        |                         | Atmo-<br>sphär.<br>Nieder-<br>schlag<br>(Regen u.<br>Schnee) in<br>Par. Zol-<br>len (an . .<br>Tagen) | Schneedecke um 12<br>Uhr an . . Tagen | Schneefall an . .<br>Tagen | Höhe der Schneedecke,<br>höchste (Par. Zoll) um<br>9 Uhr V. M. |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Maxi-<br>mum<br>des<br>Monats<br>° R. | Mini-<br>mum<br>des<br>Monats<br>° R. | Mittel der täglichen |        | Maxima<br>und<br>Minima |                                                                                                       |                                       |                            |                                                                |
|                  |                                       |                                       | Maxima               | Minima |                         |                                                                                                       |                                       |                            |                                                                |
| Jan.             | + 7,5                                 | — 3,0                                 | + 3,9                | + 0,3  | + 2,11                  | 1,87<br>(14)                                                                                          | 0                                     | 8                          | 2,5                                                            |
| Febr.            | + 7,0                                 | — 6,2                                 | + 5,0                | — 1,4  | + 2,22                  | 0,63<br>(8)                                                                                           | 0                                     | 3                          | 0,0                                                            |
| März             | + 12,2                                | — 3,4                                 | + 6,8                | + 0,8  | + 3,79                  | 1,32<br>(16)                                                                                          | 0                                     | 7                          | 0,0                                                            |
| April            | + 15,2                                | — 2,3                                 | + 11,8               | + 0,5  | + 6,13                  | 0,99<br>(11)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Mai              | + 20,3                                | — 0,2                                 | + 14,3               | + 6,0  | + 10,14                 | 1,36<br>(12)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Juni             | + 22,0                                | + 2,6                                 | + 16,6               | + 8,4  | + 12,50                 | 3,13<br>(17)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Juli             | + 22,0                                | + 3,5                                 | + 17,4               | + 7,8  | + 12,59                 | 0,88<br>(10)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Aug.             | + 25,3                                | + 3,0                                 | + 18,9               | + 9,8  | + 14,36                 | 2,03<br>(12)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Sept.            | + 17,0                                | + 2,8                                 | + 13,1               | + 6,8  | + 9,94                  | 2,68<br>(15)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Oct.             | + 17,2                                | — 3,0                                 | + 10,9               | + 5,2  | + 8,09                  | 1,24<br>(14)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Nov.             | + 11,0                                | — 4,0                                 | + 4,9                | + 1,3  | + 3,10                  | 1,31<br>(17)                                                                                          | 0                                     | 0                          | 0,0                                                            |
| Dec.             | + 8,0                                 | — 7,2                                 | + 4,4                | + 0,6  | + 2,49                  | 1,85<br>(18)                                                                                          | 1                                     | 6                          | 0,0                                                            |
|                  |                                       |                                       |                      |        |                         | Summe                                                                                                 | Summe                                 | Summe                      | Maxi-<br>mum                                                   |
| Jahr<br>(Mittel) | + 15,4                                | — 1,5                                 | + 10,7               | + 3,8  | + 7,29                  | 19,29<br>(164)                                                                                        | 1 !                                   | 24                         | 2,5                                                            |

## VIII.

### Beiträge zur Kenntniss einiger Lichenensporen.

Von Herrn Dr. W. Uloth in Nauheim.

Seitdem sich in den letzten Decennien die Lichenologie des Mikroscoops zur Untersuchung der Lichenen bedient, ist es möglich geworden, mit größerer Bestimmtheit die einzelnen Gattungen und Arten von einander zu sichten; es war dieß der erste Schritt zur Entwirrung des unendlichen Durcheinander in der Lichenologie.

Die mikroskopischen Untersuchungen concentriren sich bis heute fast ausschließlich auf Sporenuntersuchungen, soweit diese für die Systematik der Lichenen von Interesse sind. Man hat sich damit begnügt, die morphologische Verschiedenheit derselben im ausgedehntesten Maaße zu studiren, da dieselben allerdings herrliche Unterscheidungsmerkmale bieten, während die physiologischen Verhältnisse ganz außer Acht gelassen worden sind.

Bei allen diesen Untersuchungen ist meines Erachtens viel zu wenig Gewicht auf die Entwicklungsgeschichte gelegt worden und mag es daher auch kommen, daß bisweilen Ansichten ausgesprochen worden sind, die mit der Wirklichkeit in Widerspruch stehen. In dem Folgenden werde ich einige derselben besprechen und meine Untersuchungen darüber mittheilen.

**Körper** entwickelt in seinem „Grundriss der Cryptogamenkunde“\*) seine Ansichten über die Organisation des Zelleninhaltes der Sporen. Er nennt den schleimigen Inhalt der Spore „Sporoblast“, welcher je nach Gattung und Art der Flechte äußerst verschiedene Morphosen eingeht. Der Sporoblast soll im Inneren der Zelle niemals eine besondere, ihm angehörende und ihn umschließende Zellenmembran bilden, sondern entweder die Sporenzelle gleichmäßig ausfüllen, oder sich zu einer opaken Substanz trüben, die dann durch Concentrirung der Schleimtheile eine Theilung ihrer selbst beobachten läßt, die stets in regelmäsigster Weise entweder eine halbirende oder eine ein Vielfaches von Zwei producirendes ist. Es bilden sich auf diese Weise mono-, dy-, tetra-, hexa-, poly- und pleioplastische Sporen.

Die durch Theilung entstandenen Sporoblasten vergrößern sich weiterhin, nähern sich einander und lassen einen leeren, eine scheinbare Scheidewand bildenden Zwischenraum, oder berühren sich zuletzt und bilden dann eine oder mehrere wirkliche Scheidewände, die aber doppelt sein müßten, wenn den Sporoblasten eine eigne Membran zukäme.

---

\*) Grundriss der Cryptogamen-Kunde, S. 74.

In seinem *Systema lichenum* giebt **Körber**\*) zwar zu, daß bei manchen Sporen eine Theilung durch Bildung wirklicher Querscheidewände vorkommt, welche letztere nicht dadurch entstanden sind, daß zwei im Contentum der ursprünglichen Spore frei sich bildende Sporoblasten sich endlich berührt haben, wie dies bei vielen anderen, namentlich ungefärbten Sporen geschieht.

Erst nachdem die Scheidewand fertig gebildet ist, tritt in jedem der beiden entstandenen Fächer je ein Sporoblast auf, der anfangs öltropfenähnlich ist, endlich aber so an Ausdehnung zunimmt, daß er den ganzen Innenraum seines Faches ausfüllt, den benachbarten Sporoblasten in der Scheidewand selbst gleichsam berührt und die Spore selbst nur als eine strotzend-reife erkennen läßt. So weit gediehen ist der Sporoblast längst nicht mehr ein bloßer öltropfenähnlicher, membranloser Körper, sondern hat sich längst seine Zellwandung geschaffen, die als zarter Innensaum die Spore säumt.

Diesen Ansichten huldigen viele Lichenologen, während andere die zusammengesetzten Sporen für Zellenkörper halten, die durch regelmäßige Zelltheilung entstanden sind.

Weder von der einen noch von der anderen Seite sind die verschiedenen Auffassungen zu widerlegen oder zu bestätigen versucht worden.

Es ist zur Aufklärung dieser Fragen vor allen Dingen nöthig, daß man die Entwicklungsgeschichte der zusammengesetzten Sporen von der Entstehung der Mutterspore an verfolgt.

Es steht fest, daß die letzteren sich durch freie Zellenbildung in den Schlauchzellen bilden; der mehr oder weniger trübe Inhalt des Schlauchs ballt sich zu ebensoviel kugeligen Massen zusammen, als später Sporen auftreten, es entstehen in denselben Zellenkerne und bald umkleiden sie sich mit einer Membran; in Folge weiteren Wachstums entwickelt sich diese Zelle zu der eiförmigen oder mehr länglichen Mutterspore, die in den ersten Stadien einen wenig opaken protoplasmatischen Inhalt besitzt.

Es ist dies ein Vorgang, der sich besonders schön bei den großen Sporen der Gattungen *Parmelia* (namentlich *P. aquila* Ach., *P. obscura* Ehrh. und *P. pulverulenta*) und *Solorina* beobachten läßt; ebenso eignen sich diese Lichenen auch zur Beobachtung des Theilungsprocesses der Mutterspore, da die braune Färbung derselben erst dann eintritt, wenn die Spore ausgewachsen ist; ich will daher den letzteren Proceß zunächst auch bei diesen Sporen beschreiben, da er sich bei allen übrigen in derselben Weise wiederholt. Nachdem die Mutterspore in der beschriebenen Weise isolirt ist, beginnt in derselben alsbald die weitere Theilung.

Das Protoplasma der Zelle trübt sich mehr und ballt sich zu zwei mehr oder weniger deutlich zu unterscheidenden Gruppen zusammen, in deren jeder bald ein oder seltener mehrere Zellenkerne auftreten. Es

---

\*) *Systema lichenum Germaniae*, p. 436.

entsteht nun eine Einfaltung des Primordialschlauchs, welche immer weiter von der Wand gegen die Mitte hin fortschreitet, während sich gleichzeitig ringsum auf der äußersten Schicht eine dünne Cellulose-Membran ablager, welche allmählig von der Peripherie gegen die Mitte fortwächst und so schließlich eine vollständige Scheidewand bildet, an der man deutlich die den beiden Tochterzellen angehörenden Lamellen und namentlich die durch den Zusammenstoß derselben gebildete dritte und Mittellinie wahrnimmt. Wir haben also unzweifelhaft zweizellige und nicht „dyblastische“ Sporen (Fig. 1 und 5). Ebenso wie bei diesen Sporen erfolgt der Theilungsproceß auch bei allen mehrzelligen, braunen sowohl wie farblosen, einerlei ob die Theilung in einer oder in zwei Richtungen vor sich geht. Auch in den ausgewachsenen Sporen kann man sich leicht davon überzeugen, daß die einzelnen Theile wirkliche Zellen sind. Zunächst unterscheidet man bei Anwendung einer stärkeren Vergrößerung die den einzelnen Zellen angehörenden Wandungen; also bei zweizelligen Sporen, als dem einfachsten Grad der Theilung, außen die der Mutterzelle, nach innen die der Tochterzellen, so daß drei Linien wahrnehmbar sind, von denen die äußerste die Wand der Mutterzelle, die innere die Wand der Tochterzellen begränzt und die mittlere durch den Zusammenstoß der inneren Seite der Mutterzelle und der äußeren der Tochterzellen gebildet wird; ebenso finden sich drei Linien an der Scheidewand der Tochterzelle, die sich auf ganz ähnliche Weise erklären (Fig. 2, 3, 4, 6, 7).

Besonders deutlich treten diese Verhältnisse bei den schon oben erwähnten Sporen der Gattung *Parmelia* und *Solorina* hervor; bei kleineren und parenchymatischen Sporen mit dünnen und zarten Wandungen kann man sich die Wahrnehmung derselben dadurch erleichtern, daß man den Primordialschlauch durch Zuckerlösung oder Alkohol contrahiren läßt.

Die Sporen der Gattungen *Anaptychia*, *Parmelia*, *Rinodina* und *Buellia* zeigen im ausgewachsenen Zustand eine nicht unbedeutende Verdickungsschicht auf der inneren Seite der primären Zellenwand der Tochterzellen abgelagert, welche stets von einem Porus durchzogen ist, so daß selbstverständlich die Pori der beiden Zellen aufeinander stoßen und nur durch die primäre Zellenmembran von einander getrennt sind (Fig. 2, 3, 4, 6). Da die Tochterzellen der zwei- und mehrzelligen Sporen am Rand nicht ganz dicht aufeinanderschließen, so entsteht an dieser Stelle ringsum ein Interzellulargang, der sich auf beiden Seiten als ein dreiseitiger Zwickel deutlich auszeichnet (Fig. 2, 3, 4, 6, 7).

Die Theilung der Sporen findet nach ganz bestimmten Gesetzen statt. Sie erfolgt entweder in einer Richtung, der horizontalen, oder in zwei Richtungen, der horizontalen und verticalen (parenchymatische Sporen).

Als einfachster Grad der Theilung bilden sich die zweizelligen Sporen, indem sich also die Mutterspore in zwei Tochterzellen theilt.

Vierzellige Sporen entstehen auf die Weise, daß sich die Mutterzelle in zwei Tochterzellen und diese wieder in je zwei Zellen (2. Grades) theilen. Acht- und sechszehnzellige Sporen durch Theilung in acht Zellen

(3. Grades) und sechszehn Zellen (4. Grades). Zweiunddreißigzellige Sporen kommen nur selten, bisweilen bei *Bocidia rosella* vor. Die Theilungsverhältnisse bilden demnach eine Reihe, deren Basis 2 ist und deren Exponenten wie die natürlichen Zahlen steigen ( $2^1$ ,  $2^2$ ,  $2^3$ ,  $2^4$ ). Zwischenstufen (sechs-, zehn-, vierzehnzellige Sporen) giebt es nicht, kommen sie vor, so gehören sie unreifen Sporen an.

Die Theilung erfolgt stets in den ältesten Tochterzellen, also den mittelsten, zuerst und schreitet von diesen nach den beiden Enden zu fort.

Nach einer gleichen Gesetzmäßigkeit theilen sich die parenchymatischen Sporen, nur mit der wesentlichen Verschiedenheit, daß die Theilung in zwei Richtungen erfolgt.

Die Mutterspore theilt sich auch bei ihnen in zwei Tochterzellen durch eine horizontale Wand. Jede der Tochterzellen theilt sich in je zwei Zellen ebenfalls in horizontaler Richtung; jetzt erst theilen sich die vorhandenen vier Tochterzellen in verticaler Richtung durch doppelte Scheidewandbildung in je vier Zellen und zwar so, daß auch hier die Theilung mit den ältesten (mittelsten) Zellen beginnt.

Wir erhalten also einen Zellenkörper, welcher aus sechszehn Zellen besteht (*Collema*, *Rhizocarpon p. p.*, *Urceolaria* etc.).

Wiederholt sich diese Theilung in derselben Weise nochmals, sodaß sich also jede Zelle durch eine horizontale Wand in zwei und von diesen jede sich in verticaler Richtung durch doppelte Scheidewandbildung in vier Zellen theilt, so erhalten wir einen Zellenkörper, der aus 128 einzelnen Zellen besteht (*Rhizocarpon*, *Montagnei*, *Phlyctis*, *Dematocarpon* u. v. A.).

Es ist wohl kaum anzunehmen, daß die Theilung des Zelleninhaltes ohne Scheidewandbildung, wie es von verschiedenen Lichenologen angenommen worden ist, nach einer solchen Gesetzmäßigkeit stattfinden würde und könnte diese, abgesehen von allen anderen Umständen, schon allein ein Beweis dafür sein, daß die einzelnen Abtheilungen nicht einfache Schleimkügelchen seien.

Von den bisher besprochenen Sporen ganz abweichende Verhältnisse zeigen diejenigen der Flechten, welche **Massalongo** \*) unter dem Namen „blasteniosporische Flechten“ zusammenfaßt und die er in folgender Weise characterisirt: „Mit dem Namen der blasteniosporischen bezeichne ich diejenigen Flechten mit blatt-, krusten- oder strauchartigem Thallus, welche eiförmige oder elliptische durchsichtige Sporen besitzen, mit zwei polaren, unter sich durch ein Band oder einen sehr zarten Isthmus, welcher oft zu fehlen scheint, verbundenen Kernen“.

**Körber**\*\*) beschreibt sie ähnlich, er sagt: „Diese Sporen stellen ziemlich kleine, durchsichtige und wasserhelle, ellipsoidische Körperchen

---

\*) Flora 1852, Nr. 35. Monografia dei licheni blasteniospori.

\*\*) **Körber**, Systema lich. germ., p. 90.

dar, welche in polarer Vertheilung an den beiden Enden des Längendurchmessers je einen halbkugeligen oder kugelförmigen oder kurzpyramidalen Sporoblasten bergen, sodaß zwischen beiden ein scheinbar leerer Raum bestehen bleibt. Doch ist stets in der Jugend der Spore und auch oft noch in ihrem Alter zwischen beiden Sporoblasten gleichsam eine verbindende schmale Brücke, ein Isthmus, wahrzunehmen und ebenso häufig wird in der Mitte der Spore der ideale Querdurchmesser durch eine reale Scheidewand bezeichnet“.

Hepp<sup>\*)</sup> hält diese Sporen für „zweizellig, mit verdickter Scheidewand, die von einem Poruskanal durchzogen ist“<sup>\*)</sup>.

Tulasne<sup>\*\*)</sup> beschreibt sie als „solide, ellipsoide, farblose Körper. An jedem ihrer Enden enthalten sie eine kleine kugelige Anhäufung von Protoplasma, bisweilen ohne deutliche Gränzen, welche von Jod braun gefärbt wird; diese zwei Kerne sind oft durch ein schmales Band von derselben Substanz verbunden, sodaß dieselbe die große Axe der Spore einnimmt. Diese ist zu beiden Seiten des Bandes, welches das Protoplasma enthält, im ganzen Inneren mit einer durchsichtigen und homogenen Substanz, welche ohne Zweifel von der Natur der Cellulose und gleichsam eine Verdickung der inneren Sporenwandung ist, ausgefüllt“.

Auch bei diesen Sporen giebt der Verfolg der Entwicklungsgeschichte den sichersten Aufschluß.

Die Sporen der blasteniosporischen Flechten entwickeln sich ebenso wie alle anderen in den Schläuchen durch freie Zellenbildung und zwar bei den Gattungen *Tornabenia*, *Physcia*, *Amphiloma*, *Callopisma* und *Blastenia* zu acht, bei *Candellaria* zu mehr als acht in einem Schlauch. Sobald sie sich mit einer Membran umkleidet und in Folge weiteren Wachstums die charakteristische tönnchenförmige Gestalt (Fig. 10 und 11) angenommen haben, enthalten sie ein trübes feinkörniges Protoplasma (ein Gemenge von Oel und Protein). Bald tritt in dem Letzteren eine eigenthümliche Veränderung ein. Es findet nämlich eine Differenzirung des Zellinhaltes statt, in der Weise, daß sich die stickstoffhaltigen Substanzen zu zwei kugeligen Massen (Blastidien) an beide Pole der Spore gruppiren (Fig. 12 und 13), während die stickstofffreien dazu verwandt werden, den übrigen Raum der Spore mit einer weichen Cellulosemasse auszufüllen. Oft sind jene polaren Anhäufungen bei jungen Sporen auch durch einen schmalen Kanal derselben stickstoffhaltigen Substanz mit einander verbunden, der aber in der Regel bei älteren Sporen verschwindet und namentlich bei ganz reifen stets fehlt, wie sich dieß aus der weiteren Entwicklungsgeschichte ergeben wird. Von allen Lichenologen ist dieser Kanal bisher als charakteristisch für die blasteniosporischen Flechtensporen angegeben worden, es ist dieß aber ein Irrthum, der, wie es mir scheint, durch eine optische Täuschung

---

<sup>\*)</sup> Hepp, Abbildung und Beschreibung der Sporen europäischer Flechten.

<sup>\*\*)</sup> Tulasne, Mémoire sur les lichens (Annales des sciences naturelles 1852).

herbei geführt worden ist; betrachtet man nämlich die mit einer fast durchsichtigen Cellulosemasse ausgefüllten ellipsoiden Sporen bei starker Vergrößerung, so bemerkt man in ihrer Längsaxe einen helleren Strich, der ohne Zweifel auf einer Reflexionserscheinung beruht, durchaus keine scharfen Gränzen zeigt und der allerdings, namentlich bei schwächeren Vergrößerungen, auf den ersten Blick wie ein Kanal oder Porus aussieht, dies aber, wie schon gesagt, in Wirklichkeit nur selten und dann bei ganz jungen Sporen ist und sich dann auch leicht als solcher durch Anwendung von Chlorzinkjod erkennen läßt.

Mit Chlorzinkjod färben sich nämlich die beiden Blastidien sowie der dieselben verbindende Kanal gelb bis braun, die Sporenmembran sowie die die Spore ausfüllende Cellulose blau; ebenso verhält sich Jod und Schwefelsäure; bei jungen Sporen tritt diese Färbung alsbald ein, bei älteren erst nach längerer Einwirkung.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß wir hier wirklich dyblastische Sporen nach **Körper's** Definition haben und nicht etwa zweizellige mit verdickter Scheidewand. Es sind einzellige, dyblastische Sporen, d. h. solche einzellige Sporen, deren Inhalt constant in zwei Gruppen vertheilt ist, ohne daß sich diese mit einer Membran umkleiden, also ohne zweizellig zu werden.

Bei weiterem Verfolg der Entwicklung bemerkt man, daß sich die Sporen unter Beibehaltung der tonnenförmigen Gestalt vergrößern und daß, wenn sie nahezu ausgewachsen sind, wiederum eine Veränderung in ihrem Inhalt vor sich geht. Während die Blastidien nämlich bisher eine gleichmäßige wenig trübe, fast durchsichtige Beschaffenheit und geringe Größe zeigen (Fig. 14 und 15), trüben sie sich jetzt mehr, nehmen eine grobkörnige Beschaffenheit an und fangen an sich zu vergrößern. In dem Maasse als die Blastidien zunehmen, nimmt die Celluloseablagerung zwischen denselben ab und es scheint mir wahrscheinlich, daß dieselbe als Reservenernährung dient, daß sie sich löst und bei der physiologischen Veränderung der Blastidien verwendet wird. Die letzteren nehmen schliesslich so zu, daß die Celluloseschicht nur noch ein schmales Band bildet, welches die Spore quer durchsetzt, seltener ganz resorbirt wird. Die Spore ist jetzt reif und keimfähig (Fig. 16 bis 19). Reife Sporen habe ich auf die Weise leicht zum Keimen gebracht, daß ich auf mehrfach zusammengelegtes weißes Fließpapier zerquetschte ausgewachsene Apothecien ausbreitete, dies auf eine Porcellanschale legte, mit einem Glasrichter bedeckte und von außen beständig mit Wasser feucht hielt; die Sporen keimten in dieser feuchten Atmosphäre schon nach 5 bis 6 Tagen und zwar nur solche, welche ich vorher als reif beschrieben habe. Die Keimung habe ich bei diesen Sporen, wie bereits gesagt, nur in den ersten Stadien beobachtet, da es mir im vorliegenden Fall nur darauf ankam, meine Annahme, daß die von mir als reif angesehenen Sporen, entgegen der Annahme Anderer, es auch wirklich seien, zu bestätigen.

Der Keimungsproceß wird also zunächst eingeleitet durch Anhäufung von Proteinsubstanzen in der Spore; alsdann treibt die letztere in der

Regel nur an einem, selten an beiden Polen einen Schlauch oft von beträchtlicher Länge. Den weiteren Verlauf müssen spätere Untersuchungen zeigen. Bemerkenswerth scheint mir hierbei die außerordentliche Dehnbarkeit der Sporenmembran, die bei schon beträchtlicher Länge des Schlauchs noch ihre Gestalt behält.

Alle diese Untersuchungen kann man natürlich nur mit Sporen aus frischen Apothecien, nicht aus alten getrockneten oder längere Zeit aufbewahrten anstellen.

Alte Sporen zeigen stets die Blastidien als homogene durchsichtige Körperchen an ihren beiden Polen; sie sind offenbar durch eine Desorganisation in dieser Weise verändert. Die Abbildungen, die man von den blasteniosporischen Sporen hat, sind stets, selbst in den besten Werken, nach unreifen Sporen genommen; **Tulasne** läßt sie sogar in diesem Zustand keimen. Im Allgemeinen verhalten sich die Sporen der blasteniosporischen Flechten wie eben beschrieben. Die der *Amphiloma Callopisma* findet man in der Regel mit „herausgedrängten Blastidien“ gezeichnet und beschrieben, dieß ist indessen nicht der Fall; die Sporen sind von fast parallelopipe-discher Form und die Blastidien liegen innerhalb der Sporenmembran in den beiden verschmälerten Polen (Fig. 23 bis 26). Etwas abweichend verhalten sich nur die Sporen der Gattung *Candellaria*; sie sind mehr länglich eiförmig, oft etwas bohnenförmig gekrümmt, die Celluloseablagerung ist ebenso wie die Zellenmembran durchsichtiger und wie es scheint weicher; man sieht daher fast nie einen die Blastidien verbindenden Kanal und die Resorption der Cellulose findet leicht und rasch statt.

---

Alle gefärbten Flechtensporen sind in ihrer Jugend vollständig farblos und erst dann, wenn sie fast ausgewachsen sind, beginnen sie sich aus den verschiedensten Nuancen von Blaugrün durch Gelb- und Rothbraun schließlichschwarzbraun zu färben. Der Farbstoff gehört, wenn diese Umwandlung vor sich geht, nur der Membran an und nicht dem Inhalt, obgleich er ohne Zweifel im Zelleninhalt gebildet, von diesem der Membran mitgetheilt wird. Ueber die Natur des Stoffes, aus welcher sich der Farbstoff entwickelt, sowie über die Art und Weise seiner Umbildung kann ich trotz vielfacher Untersuchung noch keine bestimmte Ansicht abgeben; soweit ich jetzt urtheilen kann, muß er ganz eigenthümlicher Art sein und sich wesentlich von den bis jetzt bekannten Flechtenstoffen unterscheiden; es ist dieß um so leichter möglich, als man bis jetzt auffallender Weise nur solche Flechten einer chemischen Untersuchung unterworfen hat, deren Apothecien farblose Sporen enthalten und keine einzige mit braunen Sporen. Der braune Farbstoff, den ich, wie oben gesagt, als Endresultat der Spaltung oder Zersetzung jener eigenthümlichen Verbindung betrachte, ist vollständig indifferent gegen Luft, Ammoniak und Chlorkalk; Salz- und Salpetersäure greifen ihn so wenig an wie alle anderen Säuren und

es ist mir nur durch ein sehr kräftiges Oxydationsmittel gelungen, ihn vollständig zu zerstören. Es ist dieß übermangansaures Kali und Salzsäure. Um damit zu experimentiren löst man einen kleinen Krystall des Salzes in einigen Tropfen destillirten Wassers auf und macerirt das Apothecium, dessen Sporen man untersuchen will, auf dem Objectträger in der Lösung, zerquetscht es dann nach einiger Zeit, läßt Salzsäure im Ueberschuß zutreten und erwärmt dann gelinde, bis die Gasentwicklung vorüber und die Flüssigkeit farblos geworden ist.

Die braune Färbung der Sporen verschwindet alsbald vollständig, ohne daß ihre Structur verändert wird. Die Wirkung des Gemisches aus übermangansauerm Kali und Salzsäure beruht zunächst darauf, daß Uebermangansäure frei wird, welche sich in Berührung mit organischen Substanzen bei Gegenwart von Salzsäure in der Weise zerlegt, daß sich Einfach-Chlormangan bildet und der nascirende Sauerstoff die organischen Substanzen oxydirt und entfärbt; wird die Mischung erwärmt, so wird Chlor frei, welches ebenfalls die Farbstoffe zerstört.

Auch die Sporen der Gattung *Phlyctis* werden in der Regel als braun oder gelb gefärbt beschrieben; indessen habe ich mich überzeugt, daß sie im ausgewachsenen Zustand, so lange sie noch in den Schläuchen liegen, farblos sind und erst dann eine gelbe oder rothbraune Färbung annehmen, wenn sie aus den Schläuchen ausgetreten mit feuchter ammoniakhaltiger Luft (etwa die einer bewohnten Stube) in Berührung kommen. Man kann sich hiervon leicht überzeugen, wenn man reife Apothecien einer *Phlyctis argena* zerdrückt und bei einer circa 600fachen Vergrößerung beobachtet; in der Regel beginnen sie schon nach wenigen Minuten sich zu färben.

Es beruht diese Färbung ohne Zweifel auf einem bedeutenden Gehalt an Orcin ( $C_{14}H_8O_4$ ), welches die Eigenschaft besitzt, sich in feuchter ammoniakhaltiger Luft in Orcein ( $C_{14}H_7NO_6$ ), eine braune unkrystallisirbare Verbindung, die in Wasser wenig, in Weingeist leicht auflöslich ist, zu zersetzen. Auf demselben Umstand beruht auch die Eigenschaft dieser Flechte, Wasser, in welches sie eingeweicht wird, rothbraun zu färben.

Läßt man auf die in dieser Weise gefärbten Sporen reducirende Substanzen (Schwefelwasserstoff-Wasser oder feingeschabtes Zink und Salzsäure) wirken, so entfärben sie sich wieder, indem sich das Orcein wieder in Orcin verwandelt, ein Versuch, der das Vorhandensein des Orcins bestätigt.

---

Die Membranen der Lichenensporen sind auf ihrer Oberfläche meist glatt, nur einzelne machen hiervon eine Ausnahme.

Einige Arten der Gattung *Pannaria* zeigen auf der Oberfläche der Membran eigenthümliche Unebenheiten, die in der verschiedensten Weise gedeutet worden sind.

Hepp z. B. beschreibt diese Sporen „mit gezähneltem Rand“ und gründet hierauf seine Gattung *Amphiloma*; Körber bemerkt indeß sehr

richtig, daß dies zwar ein hübsches specifisches, aber ein untergeordnetes Merkmal sei; jedenfalls reicht es nicht aus, diese Art von **Körber's** Gattung *Pannaria* zu trennen.

Bei den eiförmigen Sporen kann wohl kaum von einem Rand die Rede sein, wie z. B. bei einem linsenförmigen Körper; allerdings scheint auf den ersten Blick nur eine Kante gezähelt, bei näherer Betrachtung und besonders beim Drehen der Sporen überzeugt man sich leicht, daß die Membran der Spore auf ihrer ganzen Außenfläche mit höckerigen Erhabenheiten besetzt ist.

Dieselben sind cuticularischer Natur und entwickeln sich schon in den Schläuchen, bevor die Sporen reif sind, sodaß dieselben durch diese Substanz, so lange sie noch in den Schläuchen liegen, mit einander verkittet zu sein scheinen. In chemischer Beziehung verhalten sie sich ganz der Cuticula ähnlich, indem sie in Schwefelsäure unlöslich sind und sich mit Jod und Schwefelsäure nicht blau, sondern bläsgelb bis braun färben.

Sehr schön zeigen die Sporen der *Pannoria hypnorum* diese Eigenthümlichkeit.

Auch die der *Thelotrema lepadinum* besitzen auf ihrer Oberfläche Unebenheiten, die aber nichts Anderes als Ueberreste der in Resorption begriffenen Schläuche sind; diese Substanz löst sich leicht in Schwefelsäure und färbt sich mit Chlorzinkjod oder Schwefelsäure und Jod mattblau.

---

## Erklärung der Abbildungen.

---

1, 2, 3, Sporen der *Parmelia aquila*. 1, junge noch farblose Spore; a, Membran der Mutterzelle; b, der Tochterzellen. 2, gefärbte ältere Spore: a und b wie bei 1; c, Verdickungsschicht; d, Porus.

4, Spore der *Anaptychia ciliaris*, nach Behandlung mit übermangansaurem Kali und Salzsäure.

5, 6, Sporen der *Rinodina Bischoffii* Hepp.

7, Spore von *Sobrina*.

8 und 9, Spore von *Lecania fuscella* Massal. 8, junge Spore in einfacher Theilung; 9, Spore in doppelter Theilung mit contrahirtem Primordialschlauch.

10 bis 22, Entwicklung der Sporen blasteniosporischer Flechten von der Bildung der Mutterspore bis zur Keimung.

23, 24, 25, Sporen von *Amphiloma callopisma*.

26, dieselbe aus getrockneten Exemplaren.

27, Spore von *Pannoria hypnorum* mit Cuticularschichten auf der Oberfläche.

Die Objecte sind bei 600 — 1000 facher Vergrößerung untersucht, in den Abbildungen jedoch der Deutlichkeit wegen in größerem Maassstab gezeichnet.

---

## IX.

### Bericht über die Thätigkeit und den Stand der Gesellschaft vom 1. Juli 1863 bis 1. Juli 1865.

Von Herrn Gymnasiallehrer Dr. W. Diehl.

Die Gesellschaft versammelte sich, mit Ausfall der Universitätsferien — April, September, October — jeden Monat in je einer Sitzung. Die meist vorher angekündigten Vorträge, an welche sich häufig sehr anregende Besprechungen und Bemerkungen anknüpften, waren folgende :

Am 4. Juli 1863 in der Generalversammlung zu Friedberg : 1) „Ueber Höhenrauch“ von Director **Curtman**. 2) Ueber die Frage : „Sind auch die anderen Weltkörper bewohnt?“ von Reallehrer **Klein**. 3) „Ueber Kopfb Blutgeschwulst bei Kindern“ von Dr. **Heldmann**. 4) „Ueber die Grenze des Lebens unter dem Einflusse der Wärme und Kälte“ von Prof. **Hoffmann**.

Am 4. August : 1) „Ueber die physikalischen Hilfsmittel bei der Krankenuntersuchung, besonders über den Kehlkopfspiegel“, mit Demonstrationen, von Professor **Mosler**. 2) „Ueber den Lepidosiren“, mit Demonstrationen, von Professor **Leuckart**.

Am 10. November : „Ueber geschlechtliche Fortpflanzung im Pflanzenreiche“ von Professor **Hoffmann**.

Am 8. December : „Ueber den Aufbau der Kiefern, mit Bemerkungen über Generationswechsel, Generationsfolge und Polymorphismus im Pflanzenreiche“ von Professor **Rofsmann**. 2) Im Anschlusse an diesen Vortrag „Ueber analoge Erscheinungen im Thierreiche, insbesondere über Generationswechsel und Polymorphismus bei den Medusen“ von Professor **Leuckart**.

Am 16. Januar 1864 in der Generalversammlung zu Gießen : 1) „Ueber Trichinen, ihre Entwicklung, ihre Verbreitung und die durch sie veranlafsten Krankheitserscheinungen“, mit Demonstrationen, von Professor **Leuckart**. 2) „Ueber Mineralöle und deren Wirkung als Leuchtmaterial“, mit Demonstrationen, von Dr. **Buchner**.

Am 13. Februar : „Ueber das Tönen der Magnete mit Anwendung auf das Telephon“, mit Experimenten, von Professor **Buff**.

Am 8. März : „Ueber den Augenspiegel und seine Anwendung zum Erkennen von Krankheiten im Inneren des Auges“, mit Demonstrationen, von Assistenzarzt Dr. **Wernher**.

Am 3. Mai : 1) „Ueber die Widmannstätten'schen Figuren bei Meteoreisen“ von Dr. **Buchner**. 2) „Ueber die Entstehung und den Unterschied von Pseudomorphosen und Perimorphosen“ von Professor **Knop**.

Am 4. Juni : 1) „Ueber die Thierwelt Hochasiens“ von Professor **Robert von Schlagintweit**. 2) „Ueber die Pfahlbauten und die Funde in denselben“, mit Demonstrationen, von Professor **Leuckart**.

Am 2. Juli in der Generalversammlung zu Wetzlar : 1) „Ueber die Bewohner Indiens und deren wichtigste Bauwerke“ von Professor

**von Schlagintweit.** 2) „Ueber die Verschiedenheit der Gebirgsflora von der der Ebene und über eine neue Methode, das Klima einer Gegend durch gewisse, in ihr noch gedeihende, Pflanzen zu bezeichnen“, von Professor **Hoffmann.** 3) „Ueber Trichinen und die Trichinenkrankheit“ von Professor **Mosler.** 4) „Ueber ein von Opticus Rexroth in Wetzlar construirtes und aufgestelltes Spectroskop“ von Dr. **Buchner.**

Am 5. August : 1) „Ueber Anilin und Anilinfarben“, mit Demonstrationen und Versuchen, von Dr. **Oeser.** 2) „Ueber Thury's Beobachtungen und Theorie, betreffend die Abhängigkeit des Geschlechts vom Reifezustande des Eies zur Zeit der Befruchtung“ von Professor **Leuckart.**

Am 8. November : 1) „Ueber Statik des Landbaues“ von Dr. **Carl Birnbaum.** 2) Ueber die meteoritischen Eisenmassen, welche in Braunau in Böhmen, jenseits des Baikalsees in Ostsibirien, bei Bremerförde, bei Orgueil in Südfrankreich, letztere im Mai dieses Jahres, niederfielen“, mit Demonstrationen, von Dr. **Buchner.**

Am 6. December : 1) „Ueber die Metamorphose der Pflanzen“ von Professor **Rossmann.** 2) „Ueber das Sombrero-Phosphat“ von Dr. **Buchner.** 3) Ueber die Verbreitung der Feuchtigkeit im Boden und über ungewöhnliche Entwicklung von Wurzeln unter gewissen Umständen“ von Professor **Hoffmann.**

Am 18. Januar 1865 in der Generalversammlung zu Gießen : 1) „Ueber Hefe, als eigenthümlichen Entwicklungszustand gemeiner Schimmelpilze und die durch sie hervorgerufenen Gährungserscheinungen“ von Professor **Hoffmann.** 2) „Ueber die Art und Weise, wie in den verschiedenen Thierklassen die Embryone aus den Eihüllen sich befreien oder befreit werden“ von Dr. **Kehrer jun.**

Am 14. Februar : 1) „Ueber das Goniometer“ von Professor **Knop.** 2) „Verschiedene chemische Versuche, namentlich : Krystallüberzüge von Salzen auf Glasplatten, das Hochätzen von Zink und das Versilbern von Glas“, gezeigt und erläutert von Dr. **Oeser.** 3) Demonstration der kleinen, hier in einem Apfelbaum aufgefundenen Larven einer *Cecydomyia*, welche die Eigenschaft des Lebendiggebärens haben, mit Hinweisung auf ähnliche Vorgänge in der Entwicklungsgeschichte der Blattläuse, von Professor **Leuckart.**

Am 8. Mai : 1) „Ueber die Milch und ihre Bedeutung als Nahrungsmittel“ von Dr. **Friedrich Birnbaum.** 2) Ueber den Character der Vegetation im Himalaya“ von Professor **von Schlagintweit.**

Am 13. Juni : „Ueber die ersten Entwicklungsvorgänge beim Säugethiere“ von Dr. **Kehrer jun.** Anknüpfend an diesen Vortrag wurde „über den Unterschied zwischen lebendig gebärenden und eierlegenden Thieren, über Befruchtung, die Ernährung und Athmung der Embryone“ gesprochen von Professor **Leuckart.**

Was die **Personalverhältnisse** der Gesellschaft betrifft, so wurden in der Generalversammlung zu Wetzlar, am 2. Juni, folgende Mitglieder zu Beamten für 1864—65 gewählt, als :

Director : Professor Dr. **Leuckart**.

Vicedirector : Professor Dr. **Knop**.

Erster Secretär : Professor Dr. **Rofsmann**.

Zweiter Secretär : Reallehrer Dr. **Buchner**.

Bibliothekar : Gymnasiallehrer Dr. **Diehl**.

Rechner : Kaufmann **Theodor Kuchler**.

Bei Abschluß des zehnten Berichtes (August 1863) zählte die Gesellschaft 40 Ehrenmitglieder, 63 correspondirende, 207 ordentliche und 17 außerordentliche, zusammen 327 Mitglieder. — Von diesen sind durch Tod ausgeschieden :

- a. Die Ehrenmitglieder : Dr. **Robert Knox**, Professor der Anatomie zu London und Dr. **C. Rösler**, Director der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau.
- b. Die correspondirenden Mitglieder : Dr. **Gergens** zu Mainz, Realschul-Inspector **Gutberlet** zu Fulda und Dr. **Stegmayer**, Geheimerath und Leibarzt zu Darmstadt.
- c. Die ordentlichen Mitglieder : Domänenrath **Melchior**, Dr. **Mettenheimer**, Professor, Hofgerichtsadvocat **Rosenthal** zu Gießen, **H. Tasché**, Salineninspector zu Salzhausen, Dr. **Jost**, Kreisarzt zu Großgerau.

Den Austritt aus der Gesellschaft, wegen Wohnungsveränderung etc., erklärten 18 ordentliche und 6 außerordentliche Mitglieder.

Neu erwählt wurden : 3 correspondirende, 38 ordentliche und 5 außerordentliche Mitglieder.

Nach dem gegenwärtigen Bestande zählt die Gesellschaft :

|                             |   |   |           |     |   |                 |
|-----------------------------|---|---|-----------|-----|---|-----------------|
| Ehrenmitglieder             | . | . | .         | .   | . | 39              |
| correspondirende Mitglieder | . | . | .         | .   | . | 62              |
| ordentliche Mitglieder      |   |   |           |     |   |                 |
|                             |   |   | in Gießen | 117 |   |                 |
|                             |   |   | außerhalb | 103 |   |                 |
|                             |   |   |           |     |   | 220             |
| außerordentliche Mitglieder | . | . | .         | .   | . | 13              |
|                             |   |   | im Ganzen | .   | . | 334 Mitglieder. |

Ein Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder s. in der Anlage I.

Die in den beiden letzten Wintergeneralversammlungen von dem Rechner vorgelegten und von der Gesellschaft genehmigten Rechnungen über den Stand der Kasse wiesen nach :

Für 1863.

|            |   |   |   |   |   |                |
|------------|---|---|---|---|---|----------------|
| Einnahme   | . | . | . | . | . | 999 fl. 55 kr. |
| Ausgabe    | . | . | . | . | . | 870 „ 8 „      |
| Kassenrest |   |   |   |   |   | 129 fl. 47 kr. |

Für 1864.

|            |   |   |   |   |   |               |
|------------|---|---|---|---|---|---------------|
| Einnahme   | . | . | . | . | . | 615 fl. 2 kr. |
| Ausgabe    | . | . | . | . | . | 353 „ 59 „    |
| Kassenrest |   |   |   |   |   | 261 fl. 3 kr. |

Der Verkehr und Schriftentausch mit auswärtigen Societäten ist in den letzten Jahren erweitert worden durch Anknüpfung neuer Verbindungen mit :

Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna.

Naturforschender Verein in Brünn.

Museum of comparative zoölogy to Cambridge, Massachusets.

Verein für Naturkunde zu Cassel.

Kongelige Norske Universitet in Christiania.

Académie Impériale des sciences de Dijon.

Natural history Society of Dublin.

California Academy of natural sciences to San Francisco.

Verein deutscher Zahnärzte zu Frankfurt a. M.

Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera.

Società agraria in Gorizia.

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Graz.

Society of arts and of the institutions in union to London.

Museum di storja naturale della R. Università di Modena.

R. Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture in Sicilia, Palermo.

I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.

Redaction der Wiener entomologischen Monatsschrift zu Wien.

Naturhistorischer Verein zu Zweibrücken.

Im Ganzen stand die oberhessische Gesellschaft bis zum 1. Juli d. J. mit 148 Akademien, Behörden, Instituten, Redactionen und Vereinen in Schriftentausch-Verbindung. Ein Verzeichniß derselben stellt die Anlage II auf, zugleich mit dem Verzeichnisse sämmtlicher Literalien, mit welchen wir durch sie erfreut worden sind. Mit unserer Danksagung bitten wir durch diese Verzeichnung der Einsendungen auch die schuldige Empfangsbescheinigung entgegennehmen zu wollen. Besondere Empfangsanzeigen wird der zweite Secretär nur auf ausdrückliches Verlangen ertheilen.

Außer den Zusendungen auswärtiger Gesellschaften hat die Bibliothek eine Anzahl werthvoller Geschenke, theils von Mitgliedern, theils von Gönnern des Vereins, denen allen wir hiermit unsern besten Dank aussprechen, erhalten. Ein Verzeichniß dieser Geschenke giebt Anlage III.

Die Gesellschaftsbibliothek hat sich seit August 1863 bis August 1865 um 475 Nummern vermehrt und enthält jetzt in 2560 Nummern circa 3000 Bände oder Hefte.

Durch Ankauf wurden für die Bibliothek erworben :

1. Polytechnisches Centralblatt, herausgegeben von **Schnedermann** und **Böttcher**, 4. Leipzig.
2. Polytechnisches Notizblatt, herausgegeben von **Böttger**, 8. Mainz.
3. Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesamtgebiete der Geographie von **Petermann**, 4. Gotha.

4. Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie, redig. von **Heis**, 8. Münster.

Diese Zeitschriften werden mit den durch den Tauschverkehr eingegangenen Vereinsschriften, unter Leitung des Bibliothekars, allwöchentlich in einem hiesigen Lesecirkel bei den Mitgliedern, welche einen geringen, die Kosten des Umlaufs deckenden Betrag leisten, in Circulation gesetzt.

Schließlich fügen wir noch an, daß in der Generalversammlung zu Butzbach, am 8. Juli 1865, zur Geschäftsführung für 18<sup>65</sup>/<sub>66</sub> folgende Beamte erwählt wurden :

Director : Professor Dr. **Buff**.

Vicedirector : Professor Dr. **Hoffmann**.

Erster Secretär : Prosector Dr. **Kehrer**.

Zweiter Secretär : Reallehrer Dr. **Buchner**.

Bibliothekar : Gymnasiallehrer Dr. **Diehl**.

Rechner : Kaufmann **Theodor Kuchler**.

## Anlage I.

### Verzeichniss der Mitglieder.

#### A. Ehrenmitglieder.

Seine Großherzogliche Hoheit **Prinz Karl** von Hessen zu Darmstadt.

Seine Großherzogliche Hoheit **Prinz Ludwig** von Hessen zu Darmstadt.

Seine Großherzogliche Hoheit **Prinz Heinrich** von Hessen zu Darmstadt.

Seine Kaiserlich-Königliche Hoheit **Erzherzog Stephan** von Oesterreich zu Schloß Schaumburg.

Se. Exc. Herr Dr. **von Alphonsky**, Kaiserl. Russ. wirkl. Staatsrath, Professor chirurgiae emeritus und Rector der Universität Moskau.

Herr Dr. **Anke**, Kaiserl. Russ. wirkl. Staatsrath, Decan der medicinischen Fakultät etc. zu Moskau.

Herr Dr. jur. u. phil. **Birnbaum**, Geheimerath, Kanzler der Universität und ord. Professor der Rechte zu Gießen.

Herr Dr. **Ludwig Franz Bley**, Oberdirector des Apothekervereins in Norddeutschland, erster Director des allg. deutschen Apothekervereins, Medicinalrath, Apotheker zu Bernburg.

Se. Exc. Herr Dr. **Brandt**, wirkl. Staatsrath, ord. Professor der Naturgeschichte und Zoologie zu St. Petersburg.

Herr Dr. **Braun**, Akademiker, ord. Professor der Botanik an der Universität und Director des botanischen Gartens etc. zu Berlin.

Herr Dr. **Bunsen**, Hofrath, ord. Professor der Chemie und Director des chem. Laboratoriums zu Heidelberg.

Se. Exc. Herr Dr. Freiherr **von Dalwigk**, wirkl. Geheimerath, Präsident des Gesamt-Civil-Ministeriums, Minister des Großherzogl. Hauses und des Aeußeren, sowie des Innern etc. etc.

Herr Dr. med. u. phil. **Ehrenberg**, Königl. Preufs. Geh. Medicinalrath, ord. Professor der Medicin und Zoologie, beständiger Secretär der Academie der Wissenschaften etc. zu Berlin.

Se. Exc. Herr Dr. **Gauger**, wirkl. Staatsrath zu Tjouchino bei Smolensk.

Herr Dr. **Göppert**, Geh. Medicinalrath, ord. Professor der Botanik, Director des bot. Gartens etc. zu Breslau.

Herr Dr. **Grösser**, Medicinalrath zu Mainz.

Herr Dr. Ritter **von Haidinger**, K. K. wirkl. Hofrath, Akademiker, Director der geologischen Reichsanstalt zu Wien.

Herr **von Kokscharow**, Mitglied der K. Academie der Wissenschaften, Obrist im Bergingenieurcorps zu St. Petersburg.

Herr Dr. **Carl Martins**, Professor der Botanik und Director des bot. Gartens zu Montpellier.

Herr Dr. med. **Ernst Meyer**, Staatsrath etc. zu St. Petersburg.

Herr **Herrmann von Meyer** zu Frankfurt a. M.

Se. Exc. Herr **von Osersky**, Generalmajor, Professor am K. Bergcorps etc. zu St. Petersburg.

Herr Dr. **Quenstedt**, ord. Professor der Mineralogie etc. zu Tübingen.

Herr Dr. **Ratzeburg**, Geheimer Regierungsrath, Professor an der K. academischen Lehranstalt zu Neustadt-Eberswalde.

Se. Exc. Herr **Renard**, wirkl. Staatsrath, erster Secretär der K. Societät der Naturforscher etc. zu Moskau.

Herr Dr. med. u. phil. **von Ritgen**, Geheimerath, Professor der Geburtshülfe, der med. Polizei und Seelenheilkunde an der Universität, Director des Entbindungsinstituts etc. zu Gießen.

Se. Exc. Freiherr **von Schenk zu Schweinsberg**, wirkl. Geheimerath, Minister der Finanzen, Kammerherr etc. zu Darmstadt.

Herr Dr. **C. H. Schultz**, Bipontinus, Hospitalarzt zu Deidesheim.

Herr Dr. **Sichel**, Professor der ophthalmiatischen Klinik, Vicepräsident der entomologischen Societät von Frankreich, zu Paris.

Se. Erlaucht Herr **Otto Graf zu Solms-Laubach** in Laubach.

Herr Dr. **Steenstrup**, Professor in Kopenhagen.

Herr Dr. med. **Stiebel**, Geh. Hofrath in Frankfurt a. M.

Herr **Sturz**, Generalconsul für Uruguay und andere südamerikan. Staaten in Berlin.

Se. Exc. Herr Dr. **Thielmann**, wirkl. Staatsrath, Oberarzt des Peter-Paul-Hospitals etc. in St. Petersburg.

Herr Dr. **Vogel**, ord. Professor der Medicin und Director des academischen Clinicums zu Halle.

Herr Dr. **G. F. Weber I**, pract. Arzt in Gießen.

Herr **Th. Wright**, Esq. F. S. A., Mitglied des Institut de France, honorary Secretary of the Ethnological Society etc. zu London.

Herr **Zimmermann**, Geh. Cabinetsrath und Director der Großherzogl. Cabinetsdirection etc. zu Darmstadt.

### B. Correspondirende Mitglieder.

Herr Dr. **de Bary**, ord. Professor der Botanik etc. zu Freiburg i. Br.

„ **Bauer**, Oberpostrath in Darmstadt.

„ **Bernhard**, Apotheker in Samaden, Kanton Graubünden.

„ Dr. **Blöda**, pract. Arzt in Nordhausen.

„ Dr. phil. **Buchenau**, ord. Lehrer an der Bürgerschule zu Bremen.

„ Dr. **Budge**, ord. Professor der Medicin und Physiologie an der Universität Greifswalde.

Herr Dr. **Claus**, ord. Prof. der Zoologie an der Universität Marburg.

„ Dr. **Dunker**, ord. Professor der Mineralogie und Geognosie zu Marburg, Director der Landesanstalt für geologische Aufnahme des Kurstaates.

Herr Dr. med. **Erlenmeyer**, Sanitätsrath, dirigirender Arzt einer Privatanstalt für Hirn- und Nervenkrankte zu Bendorf bei Coblenz.

Herr Dr. **Escher von der Linth**, Professor der Mineralogie und Zoologie in Zürich.

Herr Dr. **Constantin von Ettingshausen**, Professor der Botanik und Mineralogie an der K. K. med.-chir. Josephsacademie zu Wien.

Herr Dr. **Feist**, Medicinalrath zu Mainz.

„ Dr. **J. G. Fischer**, ord. Lehrer an der Realschule des Johanneums zu Hamburg.

Herr Dr. **Flehsig**, Hofrath und K. Brunnenarzt in Bad Elster im Königreich Sachsen.

Herr Dr. **Fresenius**, Geh. Hofrath, Professor der Chemie am Herzoglich landwirthschaftlichen Institut zu Wiesbaden.

Herr Dr. **Gerlach**, ord. Professor der Anatomie etc. an der Universität Erlangen.

Herr Dr. **Giebel**, Professor an der Universität Halle.

„ Dr. **Glaser**, Gymnasiallehrer in Worms.

„ Dr. **von Hauer**, Ritter, K. K. wirkl. Bergrath und erster Reichsgeolog bei der K. K. geol. Reichsanstalt zu Wien.

Herr Dr. **Henry**, ord. Bibliothekar der K. rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn.

Herr **Friedrich Hessenberg** in Frankfurt a. M.

„ Dr. **von Heyden**, Senator zu Frankfurt a. M.

„ Dr. **Hille**, z. erster Secretär der Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde in Hanau.

Herr Dr. **Jones Hunt** in Hastings.

„ **Le Jolis**, Präsident und beständiger Secretär und Archivar der K. naturforschenden Gesellschaft zu Cherbourg.

Herr Dr. **Kaup**, Professor und Inspector des Großh. Naturalien-cabinets zu Darmstadt.

Herr **Kegel**, Bergamtssecretär in Harzgerode.

„ **Freiherr von Kittlitz**, K. Preufs. Hauptmann a. D. zu Mainz.

„ **Klingelhöffer**, Generallieutenant zu Darmstadt.

„ **Klingelhöffer**, Oberstlieutenant zu Darmstadt.

„ **Dr. Karl Koch**, ord. Professor der Botanik an der Universität in Berlin, Adjunct beim K. bot. Garten und General-Secretär der Gesellschaft zur Beförderung des Gartenbaues.

Herr Dr. **Küchenmeister**, Medicinalrath in Dresden.

„ **Dr. Martiny**, Apotheker in Bingen.

„ **Dr. Meding**, Arzt in Paris.

„ **Dr. Moldenhauer**, Professor an der höheren Gewerbeschule in Darmstadt.

Herr Dr. **Mosler**, Professor der Medicin an der Universität Greifswalde.

Herr Dr. **Müller**, Geheimerath, Leibarzt und Obermedicinalrath zu Homburg v. d. H.

Herr Dr. **Müller**, Hofrath, ord. Professor der Physik und Technologie zu Freiburg i. Br.

Herr Dr. **O'Leary**, Professor der Medicin etc. am Queens' College zu Cork in Irland.

Herr Dr. **Adolf von Planta** in Reichenau bei Chur.

„ **Röder**, Schulinspector zu Hanau.

„ **Dr. Rube**, Obermedicinalrath zu Darmstadt.

„ **Dr. F. Sandberger**, Professor der Mineralogie zu Würzburg.

„ **Dr. Guido Sandberger**, Conrector in Wiesbaden.

„ **Dr. Schabus**, Professor der Physik an der K. K. Oberrealschule zu Schottenfelde bei Wien.

Herr Dr. jur. **Scharff** in Frankfurt a. M.

„ **Dr. Schauenburg**, in Godesberg bei Bonn.

„ **Dr. theol. Schmitt**, Superintendent zu Mainz.

„ **Schnittspahn**, Director der Hofgartendirection, ord. Lehrer an der höheren Gewerbeschule etc. zu Darmstadt.

Herr Dr. **Max Schultze**, Professor der Medicin in Bonn.

„ **Dr. Simeons**, Medicinalrath und Kreisarzt zu Mainz.

„ **Dr. Söchting**, Archivar der deutschen geolog. Gesellschaft in Berlin.

Herr Dr. **Spengler**, Hofrath und pract. Arzt zu Bad Ems.

„ **Steeg**, Opticus in Homburg v. d. H.

„ **Dr. Susewind**, Regierungsmedicinalrath zu Braunfels.

„ **Theobald**, Pfarrer in Chur.

„ **Dr. Otto Volger** in Frankfurt a. M.

„ **Dr. Weitenweber**, pract. Arzt und Historiograph der medizinischen Facultät etc. zu Prag.

Herr Dr. **Hermann Welcker**, Professor der Anatomie in Halle.

„ **Dr. Georg Julius Wienecke**, Königl. Niederländischer Gesundheitsofficier auf Sumatra.

Herr Dr. **Zeller**, Regierungsrath, beständiger Secretär der Großh. Centralbehörde der landwirthschaftlichen Vereine zu Darmstadt.

Herr Dr. **Victor Ritter von Zepharovich**, K. K. Universitätsprofessor zu Graz in Steiermark.

### C. Ordentliche Mitglieder.

a) in Gießen wohnend:

Herr **August Bastert**, Kaufmann aus Frankfurt a. M.

„ **Dr. Baur**, pract. Arzt und Privatdocent.

„ **Friedrich Bender**, Fabrikant.

„ **Dr. med. Friedrich Birnbaum**, pract. Arzt, Privatdocent etc.

„ **Siegmund Bock**, Fabrikant.

„ **Dr. Bohn**, Professor der Physik.

„ **Dr. Braubach**, Professor an der Universität.

„ **Carl Braubach**, Fabrikant (auf d. Westphäl. Hofe).

„ **Briel**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Dr. Buchner**, Reallehrer.

„ **Carl Buchner**, Buchhändler.

„ **Louis Bücking**, Fabrikant.

„ **Dr. Buff**, ord. Professor der Physik, Director des physikalischen

Cabinets etc.

Herr **Buff**, Hofgerichtsrath.

„ **von Buri**, Staatsanwaltssubstitut.

„ **Dr. Clebsch**, Professor.

„ **Clemm**, Canzleirath.

„ **Curschmann**, Lehrer an der höheren Töchterschule.

„ **Dr. Curtman**, Director.

„ **Daudt**, Maschinenmeister bei der Main-Weserbahn.

„ **Deines**, Kunst- und Handelsgärtner.

„ **Dickoré**, Universitätsgraveur, Lehrer im Zeichnen an der

Realschule und dem Gymnasium.

Herr **Dr. Diehl**, Gymnasiallehrer.

„ **Dornseiff**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Dr. Draudt**, Oberförster.

„ **Ebel**, Hofgerichtsrath.

„ **Dr. jur. Eckstein**, Hofgerichtsadvokat und Stiftungsanwalt.

„ **Eickemeyer**, Baurath und Bahnhofsvorstand.

„ **Emmerich**, Besitzer eines opt. Geschäfts.

„ **Ferdinand Gail**, Fabrikant.

„ **v. Gehren**, Mechaniker.

„ **Wilhelm Gravelius**, Chirurg.

„ **Dr. jur. von Grolman**, Stadtgerichtsassessor.

„ **Habenicht**, Fabrikant.

„ **Haberkorn**, Universitätsrichter und Justizrath.

„ **Dr. Heinzerling**, Professor der Architectur.

Herr **Aug. Hefs**, Besitzer der hiesigen Gasfabrik.

„ **Dr. Heyer**, ord. Professor der Forstwissenschaft an der Universität.

Herr **Hirsch**, Steuerrath.

„ **Dr. med. u. phil. Hoffmann**, ord. Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens.

Herr **Hoffmann**, Postsecretär.

„ **Holzapfel**, Kreisbaumeister.

„ **Adolph Homberger**, Fabrikant.

„ **Heinrich Homberger**, Fabrikant.

„ **M. Homberger**, Fabrikant.

„ **von Hombergk zu Vach**, Rittmeister bei der Gendarmerie.

„ **Ludwig Jahreis**, Kaufmann.

„ **Kaufmann**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Kehr**, Rechner der Spar- und Leihkasse.

„ **Dr. Kehrler jun.**, pract. Arzt, Privatdocent etc.

„ **Kekulé**, Kreisassessor.

„ **Keller**, Buchdruckereibesitzer.

„ **Kempf**, Hofgerichtsrath.

„ **Dr. Klein**, pract. Arzt.

„ **Dr. Knop**, Professor der Mineralogie und Geologie.

„ **Fr. Koch**, Kaufmann.

„ **Koch**, Zahnarzt.

„ **L. König**, Brauereibesitzer.

„ **Dr. jur. Kraft**, Hofgerichtsrath.

„ **Dr. jur. von Krug**, Hofgerichtsrath.

„ **Th. Kuchler**, Fabrikant.

„ **Labrolisse**, Kaufmann.

„ **Leo**, Uhrmacher.

„ **von Lepel**, Hofgerichtsrath.

„ **Dr. Leuckart**, ord. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Director des zoologischen und vergleichend-anatomischen Cabinets.

Herr **Liebrich**, Mechanikus.

„ **Dr. von Löhr**, pract. Arzt.

„ **Friedrich Maurer**, Postsecretär.

„ **Dr. Adolf Mettenheimer**, Apotheker.

„ **Ph. Möhl**, Rentier.

„ **Dr. Muhl**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Dr. Naumann**, Gymnasiallehrer und Privatdocent.

„ **Neifs**, Conservator.

„ **Niefs**, Expedient bei der Main-Weserbahn.

„ **Adolph Noll**, Kaufmann.

„ **S. Pascoe**.

„ **Karl Peppler**, Kaufmann.

„ **Pfannmüller II**, Hofgerichtsadvokat.

Herr Dr. med. u. phil. **Phöbus**, ord. Professor der Medicin, Director des pharmakologischen Instituts.

Herr **Pietsch**, Buch- und Steindruckereibesitzer.

„ **Probst**, stud. chem. aus Mainz.

„ **Ricker**, Buchhändler.

„ Dr. phil. **von Ritgen**, Hofbaurath und ord. Professor der Architectur, Director des architectonischen Cabinets.

„ **Rosenberg I**, Hofgerichtsadvokat.

„ Dr. phil. **Rofsmann**, Professor der Botanik.

„ **Rübsamen**, Turnlehrer.

„ **Sander**, Pfarrer.

„ **von St. George**, Universitätsapotheker.

„ **Robert von Schlagintweit**, Professor.

„ Dr. theol. und phil. **Schmid**, ord. Professor der Philosophie.

„ Dr. **Schmidt**, pract. Arzt und Kreiswundarzt.

„ Dr. **Schüler**, Hofgerichtsadvokat.

„ Dr. **Schwarz**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Friedrich Seipp**, Privatmann.

„ Dr. **Seitz**, ord. Professor der Medicin und Director des medicinischen Klinikums.

Herr Dr. **Stahl**, ord. Professor der Staats- und Cameral - Wissenschaften.

Herr **Staudinger**, Mechaniker.

„ Dr. **Tasché**, Reallehrer.

„ **Thorwart**, Hofgerichtsadvokat.

„ **Trapp**, Justizrath, Fiskalanwalt.

„ **Völcker**, Hofgerichtsrath.

„ Dr. med. u. phil. **Vullers**, ord. Professor der orient. Sprachen.

„ Dr. **Wasserschleben**, ord. Professor der Rechte.

„ Dr. **H. Weber II**, pract. Arzt.

„ **Weidig**, Landrichter a. D.

„ **Wendeberg**, Postsecretär.

„ Dr. med. u. phil. **Wernher**, Geh. Medicinalrath, ord. Professor der Medicin, Director des academischen Gesammthospitals, des chirurgischen Klinikums etc.

Herr Dr. **Carl Wernher**, Assistenzarzt.

„ Dr. **Wetter**, Professor der Medicin.

„ **Wissel**, Architect.

„ Dr. **Wilbrand**, ord. Professor der Staatsarzneikunde.

„ Dr. **Will**, ord. Professor der Chemie und Director des chemischen Laboratoriums der Universität.

Herr **P. Wilson**.

„ **Witte**, Apotheker.

„ **Wortmann**, Geheimer Hofgerichtsrath.

„ **Wunderly**, emerit. Kurf. Hess. Leihhausinspector.

b) Auswärtige.

Herr **Belthle**, Opticus in Wetzlar.

„ **Dr. Beneke**, Geh. Medicinalrath zu Marburg, erster Badearzt zu Nauheim.

Herr **Dr. Birnbaum**, Kreisarzt zu Wörrstadt in Rheinhessen.

„ **Dr. Bode**, Physikus und Badearzt zu Nauheim.

„ **Dr. Bose**, Kreisarzt zu Ortenberg.

„ **Böfsler**, Lehrer in Heuchelheim b. G.

„ **Braun**, Apotheker in Nidda.

„ **Briegleb**, Pfarrer in Heuchelheim.

„ **Dr. Bruch**, Professor in Rödelheim.

„ **Buff**, Landrichter in Nidda.

„ **G. Buß**, Kaufmann in Wetzlar.

„ **Dr. Deibel**, Kreisarzt in Gladenbach.

„ **Dr. W. Diehl**, Kreisarzt in Butzbach.

„ **F. C. Eisenhuth**, Apotheker in Vilbel.

„ **Dr. Erhardt**, pract. Arzt zu Nauheim.

„ **Ewald**, Geh. Obersteuerrath, Oberzollrath etc. zu Darmstadt.

„ **Fabricius**, Rentamtman und Oberförster zu Kloster Arnsburg.

„ **Felthaus**, Steuerinspector in Wetzlar.

„ **Fendt**, Schönfärber und Mitgl. des Stadtvorstandes in Schotten.

„ **Fink**, Apotheker zu Krumstadt bei Darmstadt.

„ **Fresenius**, Kammerassessor zu Assenheim.

„ **Garnier**, Districtseinnnehmer in Großenbuseck.

„ **Dr. Gerhard**, Gymnasialoberlehrer in Wetzlar.

„ **Gefsner**, Eisenbahningenieur und Bahnhofsinspector zu Frankfurt a. M.

Herr **Günther**, Geometer in Butzbach.

„ **Dr. Hallwachs** zu Darmstadt.

„ **A. von Harnier** zu Echzell.

„ **Hechler**, Steuercommissär zu Butzbach.

„ **Heitefuss**, Hüttenbesitzer auf der Friedrichshütte bei Laubach.

„ **Dr. Heldmann**, pract. Arzt zu Selters bei Ortenberg.

„ **Herbst**, Apotheker in Wetzlar.

„ **Wilh. Hiepe**, Apotheker in Wetzlar.

„ **Dr. Jacobi**, Physikus in Bockenheim.

„ **Kinzenbach**, Bergverwalter zu Wetzlar.

„ **Klein**, Reallehrer zu Friedberg.

„ **Dr. Klingelhöffer**, pract. Arzt in Grofsbieberau.

„ **Carl Koch**, Hüttenbesitzer auf dem Schelder Eisenwerk bei Dillenburg.

Herr **Dr. Köhler**, Kreisarzt und Medicinalrath in Laubach.

„ **Kohlhauer**, K. Preufs. Artillerielieutenant a. D. zu Wetzlar.

„ **Kraufs**, Schreinermeister, vormal's Bürgermeister zu Butzbach.

„ **Dr. Kreuder**, Veterinärarzt zu Winnerod.

„ **Küchel**, Fabrikant zu Butzbach.

Herr **Kuhl**, Collector in Butzbach.

„ **Landauer**, Naturalienhändler in Frankfurt a. M.

„ **Georg Lettermann**, Pharmaceut aus Grofssteinheim.

„ **Ludwig**, techn. Directionsmitglied an der Bank für Handel und

Industrie zu Darmstadt.

Herr Dr. **Martiny**, Arzt in Fulda, Brunnenarzt zu Salzschlirf.

„ Dr. **Melchior**, pract. Arzt zu Butzbach.

„ **August Melior**, Oekonom in Holzhausen, Kr. Vilbel.

„ Dr. **Mengel**, Chemiker zu Salzbergen bei Rheine in Ost-

friesland.

Herr Dr. **Müller**, Kreisarzt zu Friedberg.

„ **Müller**, Landgerichtsassessor in Nidda.

„ **Naumann**, Pfarrer zu Butzbach.

„ **Georg Nöh**, Bergverwalter in Braunfels.

„ **Georg Noll**, Director der Ludwigshütte bei Biedenkopf.

„ **Freiherr von Nordeck zu Rabenau** auf Schlofs Friedelhausen.

„ **Pfannmüller**, Bergmeister in Thalitter.

„ Dr. **Pfeiffer**, Militärarzt zu Darmstadt.

„ Dr. **Pilger**, Hofrath, pract. Arzt zu Friedberg.

„ Dr. **Prinz**, Kreisarzt zu Nidda, erster Badearzt zu Salzhausen.

„ **Reißer**, pract. Arzt zu Worms.

„ **Reiz**, Reallehrer in Alsfeld.

„ Dr. **Renner**, Kreisarzt zu Friedberg.

„ **Rettig**, Bahnmeister zu Lollar.

„ **Reuning**, Bürgermeister zu Nidda.

„ **Heinrich Rexroth**, Opticus in Wetzlar.

„ **Riemann**, Berggeschworne in Wetzlar.

„ Dr. **Friedrich Rittershausen**, Amtsapotheker in Herborn.

„ **Alexander Saytzeff**, stud. chem. in Marburg.

„ **Schäfer**, Realschuldirektor in Alsfeld.

„ **Schäfer**, Bergverwalter in Wetzlar.

„ **Scheffer**, Badeinspector zu Nauheim.

„ Dr. **Schellenberg**, pract. Arzt in Wetzlar.

„ **Schlapp**, Lehrer in Rödchen bei Giefesen.

„ **Schmidt**, Bergverwalter zu Langenaubach bei Dillenburg.

„ **Simon**, Apotheker in Dillenburg.

„ Dr. **Schüz**, pract. Arzt zu Calw in Würtemberg.

„ **C. Scriba**, Buchhändler in Friedberg.

„ **Th. Scriba**, Apotheker zu Schotten.

„ **W. Scriba**, Pfarrer in Oberlais, Kr. Nidda.

„ **Seibert**, Lehrer an der Musterschule zu Bensheim.

„ Dr. **Siebrecht**, Physikus in Gelnhausen.

Seine Erlaucht Herr **Reinhard Graf zu Solms-Laubach**, K. Preufs.

Generalmajor a. D. in Braunfels.

Seine Erlaucht Herr **Friedrich**, Erbgraf zu **Solms-Laubach** in

Kloster Arnzburg.

Herr **Staaden**, Grubenbeamter in Wetzlar.

„ **Ludwig Storch**, Gräfl. Solms-Rödelheimischer Bergverwalter auf dem Bauernheimer Bergwerk bei Friedberg.

Herr **Strack**, Forstaccessist in Darmstadt.

„ **Dr. Strewe**, pract. Arzt in Wetzlar.

„ **Trapp**, pract. Arzt in Friedberg.

„ **Dr. Uloth**, Chemiker in Nauheim.

„ **Vogt**, Apotheker zu Butzbach.

„ **L. Vogt**, Kaufmann zu Butzbach.

„ **Wahl**, Hofapotheker zu Friedberg.

„ **Wahl**, Seminarlehrer zu Friedberg.

„ **Dr. Weber**, pract. Arzt zu Echzell.

„ **Dr. Carl Weber**, pract. Arzt in Alzey.

„ **Dr. Weiler**, pract. Arzt zu Frohnhausen.

„ **Wiesler**, Kaufmann zu Butzbach.

„ **Dr. Winckler**, Obermedicinalrath, Hofapotheker zu Darmstadt.

„ **Winterstein**, Steuercommissär in Nidda.

„ **Ziegler**, stud. phil. aus Frankfurt, z. Z. in Marburg.

„ **Dr. Zinfser I**, pract. Arzt und Kreiswundarzt zu Gladenbach.

#### D. Ausserordentliche Mitglieder.

Herr **G. L. Arkularius**, stud. med. aus Schotten.

„ **Dr. Blas**, Assistent am chemischen Laboratorium.

„ **Jos. Borgenheimer**, stud. med. aus Bensheim.

„ **Friedr. Erckmann**, stud. med. aus Alzey.

„ **Sebast. Fertig**, stud. med. aus Bensheim.

„ **Göbel**, Pharmaceut aus Plauen im Vogtlande.

„ **Jul. Hoffmann**, stud. med. aus Worms.

„ **E. Jochem**, stud. med. aus Wieseck.

„ **Dr. C. Oeser** aus Giefßen.

„ **Dr. Fr. Ploch**, practischer Arzt.

„ **Georg Reuling**, stud. med. aus Lorsch.

„ **J. P. Stumper**, stud. der Forstwissenschaft aus Luxemburg.

„ **L. Windecker**, Dr. phil. aus Giefßen.

## Anlage II.

### **Verzeichniss der Akademien, Behörden, Institute, Redactionen und Vereine, mit welchen Schriftentausch besteht, nebst Angabe der von denselben seit Mai 1862 bis Juli 1865 eingesandten Schriften.**

- Altenburg** : Naturforschende Gesellschaft. — Mittheilungen, XVI, 1—4, 18<sup>62</sup>/<sub>63</sub>.
- Amsterdam** : Koninkl. Akademie van Wetenschappen. — 1) Verhandelingen, 4<sup>o</sup>, Deel VIII, 1862. — 2) Verslagen en Mededeelingen; Afdeeling Natuurskunde, Deel XIII—XVI, 1862 u. 63; Afdeeling Letterkunde, Deel VI u. VII, 1862 u. 63. — 3) Jaarboek voor 1861 u. 62.
- Augsburg** : Naturhistorischer Verein. — Bericht 15, 16 u. 17 für 1862, 63 u. 64.
- Bamberg** : Naturforschende Gesellschaft. — Bericht V u. VI für 18<sup>60</sup>/<sub>61</sub> u. 18<sup>61</sup>/<sub>62</sub>.
- Basel** : Naturforschende Gesellschaft. — Verhandlungen, Theil III, 3 u. 4, 1862 u. 63; IV, 1, 1864.
- Batavia** : Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië. — 1) Verhandelingen, 4<sup>o</sup>, Deel I—VI, 1856—59; VIII u. IX, 1860. — 2) Natuurkundig Tijdschrift, Deel I—XXIV, 1851—62. — 3) Geneeskundig Tijdschrift, Deel IX, 1—6, 1860—62.
- „ Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. — 1) Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, Deel VII bis XII, XV, XVI, 1, 2, 1857—63. — 2) Verhandelingen, 4<sup>o</sup>, Deel XVII u. XVIII, 1860. — 3) A Dictionary of the Sunda Language of Java by **J. Rigg**, 4<sup>o</sup>, 1862.
- Berlin** : Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften. — Monatsberichte aus d. J. 1862, 63 u. 64.
- „ Deutsche geologische Gesellschaft. — Zeitschrift, XIV, 1—4, 1861 u. 62; XV, 1—4, 1863; XVI, 1—4, 1864; XVII, 1, 1865.
- „ Gesellschaft für allgemeine Erdkunde. — 1) Zeitschrift, herausgegeben v. **Koner**, XII, 1—6; XIII, 3—6, 1862; XIV, 1—6, 1863; XV bis XVII, 1—6, 1864; XVIII, 1, 2, 1865. — 2) Uebersicht der Aufsätze, Miscellen und Karten, welche in den Monatsberichten über die Verhandlungen der Gesellsch. für Erdkunde, sowie in der Zeitschrift für allgem. Erdkunde enthalten sind. 1863.
- „ Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder. — Verhandlungen, redig. v. **Acherson** und **Liebe**, Heft 3—5, 1861—63.
- Bern** : Naturforschende Gesellschaft. — Mittheilungen aus d. J. 1862, 1863, 1864.

- Blankenburg : Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. — Berichte, 4<sup>o</sup>, für 1859/60, 1861/62.
- Bologna : Accademia delle scienze dell' Istituto. — Rendiconto delle sessioni, anno 1862/63, 1863/64.
- Bonn : Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und Westphalens. — Verhandlungen, Jahrg. XIX, 1 u. 2, 1862; XX, 1, 2, 1863; XXI, dritte Folge, Band I, 1, 2, 1864.
- „ Landwirthschaftlicher Verein für Rheinpreussen. — Zeitschrift, redig. von **Thilmany**, Jahrg. 1863 u. 64, Nr. 1—8; 1865, Nr. 1—5.
- Bordeaux : Société des sciences physiques et naturelles. — Mémoires, tom. II, 2, 1863.
- Breslau : Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. — 1) Jahresbericht 39, 40 u. 41 für 1861, 62 u. 63. — 2) Abhandlungen, Abtheilung für Naturwissenschaften u. Medicin, Jahrg. 1862, Heft 1, 2, 3. Philosophisch-historische Abtheilung, Jahrg. 1862, Heft 1, 2; 1863, Heft 1.
- „ Gewerbeverein : Breslauer Gewerbeblatt, Band IX für 1863; X, 1864; XI, 1865, Nr. 1—13.
- Bromberg : Landwirthschaftlicher Centralverein für den Netzdistrict. — Mittheilungen, 4. Jahrg. X, XI, XII für 1862, 63 u. 64; XIII, 1865, Nr. 1—6.
- Brünn : K. K. Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u. Landeskunde. — Mittheilungen, Jahrg. 1862—64.
- „ Naturforschender Verein. — Verhandlungen, Band I, II, 1862 und 1863.
- „ Wernerverein zur geologischen Durchforschung von Mähren und Schlesien. — 1) XI. u. XII. Jahresbericht für 1861 und 1862. — 2) Hypsometrie von Mähren und Oestreichisch-Schlesien von **Koristka**, 4<sup>o</sup>, 1863. — 3) Bericht über einige im niederen Gesenke und im Marsgebirge ausgeführte Höhenmessungen von **Koristka**. Wien 1861.
- Bruxelles : Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. — 1) Bulletins des séances de la classe des sciences, année 1861, 62, 63. — 2) Annuaire pour 1861, 62 und 1864.
- „ Académie Royale de Médecine de Belgique. — 1) Mémoires, 4<sup>o</sup>, tome IV, 7. — 2) Mémoires des concours et des savants étrangers, tome V, 3, 4, 5, 1862—64. — 3) Bulletins, II ser., tome V, 1—11, 1862; VI, 1—11, 1863; VII, 1—11, 1864; VIII, 1, 2, 3, 1865.
- Caen : Société Linnéenne de Normandie. — Bulletins pour 1861/62, 1862/63, 1863/64, vol. VII, VIII, IX.
- Cassel : Kurfürstl. Commission für landwirthschaftliche Angelegenheiten. — 1) Landwirthschaftl. Zeitschrift, Jahrg. VIII, IX, X, 1862,

1863, 1864, XI, 1865, Heft 1. — 3) Landwirthschaftl. Anzeiger, Jahrg. 1862, 63, 64, 65, Nr. 1—5.

Cassel : Verein für Naturkunde. — Bericht XIII für 1860—62; XIV für 1862/<sub>63</sub> u. 1863/<sub>64</sub>.

Christiania : Videnskabs Selskabet. — 1) Forhandlingar 1861, 62, 63. — 2) Die Culturpflanzen Norwegens, beobachtet v. **Schübeler**, 4<sup>o</sup>, 1862. — 3) Geologiske Undersogelser i Bergens omegn af **Hiortdahl** og **Irgens**, 4<sup>o</sup>, 1862. — 4) Beskrivelse over *Lophocaster typicus* af **Sars**, 4<sup>o</sup>, 1862, 5.

„ Kongelige Norske Universitet. — 1) Det Kongel. Norske Frederiks-Universitets Aarsberetning for Aaret 1861 u. 62. — 2) Det Kong. Frederiks-Universitets Halvhundred Clars-Fest, Septbr. 1861. — 3) Veiledning til Dyrkning af glaciale, alpine og aretiske Planter af **Moe**, 1862. — 4) Om en i Sommeren 1861 foretagen entomologisk Reise af **Siebk**e, 1863. — 5) Geologiske og zoologiske Jagttagelser, af **Sars**, 1863. — 6) Om en i Sommeren 1862 foretagen zoologisk Reise i Christianias og Trondhjems Stifter, af **Sars**, 1863. — 7) Norges officielle Statistik. Tabeller over de Spedalske i Norge in Aaret 1860, 62, 63, 4<sup>o</sup>, 1860, 63, 64. — 8) Norges officielle Statistik. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge i Aaret 1861, 4<sup>o</sup>, 1864. — 9) Generalberetning fra Gaustad Sindssygeasyl for Aaret 1863, ved **Sandberg**, 4<sup>o</sup>, 1864. — 10) Aarsberetning for 1858 u. 59 fra Overlaegerne for den spedalske Sygdom **Hoeg** og **Loberg**, 4<sup>o</sup>, 1859 u. 60. — 11) Om det syphilitiske Virus af **Bidenkap**, 1863. — 12) Aperçu des différentes méthodes de traitement employées a l'hôpital de l'université de Christiania contre la syphilis constitutionnelle par **Bidenkap**, 4<sup>o</sup>, 1863. — 13) Meteorologische Beobachtungen, aufgezeichnet auf Christianias observatorium, Lief. I, II, III, IV, 4<sup>o</sup>, 1862 u. 64. — 14) Om **Sneebraeen** Folgefoen af **Sexe**, 4<sup>o</sup>, 1865. — 15) Om de geologiske Forhold paa Kyststraekningen af Nordre Bergenhus Amt af **Irgens** og **Hiortdahl** ved **Kjerulf**, 4<sup>o</sup>, 1864.

Chur : Naturforschende Gesellschaft Graubündens. — Jahresbericht, Jahrg. VII, 1860/<sub>61</sub>; VIII, 1861/<sub>62</sub>; IX, 1862/<sub>63</sub>.

Constantinopel : Société Impériale de médecine. — Gazette médicale d'Orient, 4<sup>o</sup>, VI, année 1862, Nr. 1—11; VII, Nr. 1, 1863.

Crefeld : Naturwissenschaftlicher Verein. — Jahresbericht für 1861/<sub>62</sub>, 1862/<sub>63</sub>.

Danzig : Naturforschende Gesellschaft. — Schriften, N. F. Band I, 1 u. 2, 1864 u. 65.

Darmstadt : Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. — Notizblatt, dritte Folge, Heft I, 1—12, 1862; II, 13—24, 1863; III, 25—36, 1864.

- Darmstadt : Centralbehörde für die landwirthschaftl. Vereine des Großherzogthums Hessen. — Zeitschrift, Jahrg. 1863, 64, 65, Nr. 1—26.
- Dessau : Naturhistorischer Verein für Anhalt. — Berichte XXI, v. J. 1862; XXII, 1863; XXIII, 1864.
- Dijon : Académie Impér. des sciences. — Mémoires, II. ser., tome X, a. 1862; XI, a. 1863.
- Dorpat : Naturforscher Gesellschaft für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. — Archiv, I. ser. Mineralogische Wissenschaften, Chemie, Physik und Erdbeschreibung, II, 3, 1861; II. ser. Biologische Naturkunde, Band IV, 1862.
- Dresden : Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis“. — 1) Sitzungsberichte, Jahrg. 1861, 62, 63 u. 64. — 2) Die Philosophie im Cyclus der Naturwissenschaften von **Drechsler**, 1863.
- „ K. K. Leopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher. — Verhandlungen, 4<sup>o</sup>, Band XXX, 1863; XXXI, 1864.
- „ Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. — Jahresberichte für 18<sup>63</sup>/64.
- „ Gesellschaft für Botanik und Gartenbau. — Mittheilungen über Flora, Band III, 1, 1864.
- Dublin : Natural history Society. — Proceedings, vol. III, 1 u. 2, 1859—60; IV, 1, 1862—63.
- Elberfeld und Barmen : Naturwissenschaftlicher Verein. — Jahresberichte, Heft 4, 1863.
- Emden : Naturforschende Gesellschaft. — 1) 48 u. 49ster Jahresbericht für 1862 u. 63. — 2) Kleine Schriften, Nr. X. Das geographische System der Winde über dem atlantischen Ocean von **Prestel**, 4<sup>o</sup>, 1863. Nr. XI, Ergebnisse der Witterungsbeobachtungen zu Emden im J. 1862 u. 63, von **Prestel**, 4<sup>o</sup>, 1864.
- Erfurt : Kön. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. — 1) Jahrbücher, n. F. Heft III, 1863. — 2) Zur Theorie des Quarzes von **Jenzsch**, 1861.
- Frankfurt a. M. : Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen, 4<sup>o</sup>, Band IV, 2, 3, 4, 1862 u. 63; V, 1, 2, 1864.
- „ Physikalischer Verein. — 1) Jahresberichte für 18<sup>61</sup>/62, 18<sup>62</sup>/63, 18<sup>63</sup>/64. — 2) Beglückwünschungsschrift des Vereins zur Säcularfeier der Senckenbergischen Stiftung, 4<sup>o</sup>, 1863.
- „ Aerztlicher Verein. — Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten etc. der fr. Stadt Frankfurt, IV. u. V. Jahrg., 1860 u. 61.
- „ Zoologische Gesellschaft. — Der zoologische Garten, herausg. von **Weinland**, jetzt von **Bruch**, Jahrg. III—V, 1862—64; VI, 1865, Nr. 1—6.
- „ Verein deutscher Zahnärzte. — I. Jahresbericht, 1864.

- Frauendorf** : Practische Gartenbaugesellschaft in Bayern. — Vereinigte Frauendorfer Blätter, allgemeine deutsche Gartenzeitung, red. von **Fürst**, Jahrg. 1863, 64, 65, Nr. 1—24.
- Freiburg i. Br.** : Gesellschaft für Beförderung der Naturwissenschaften. — Berichte über die Verhandlungen, II, 4, 1862; III, 1 u. 2, 1863 u. 64.
- Fürth** : Gewerbeverein. — Gewerbezeitung, 4<sup>o</sup>, Jahrg. XI—XIV, 1861—64; XV, 1—10, 1865.
- St. Gallen** : Naturwissenschaftliche Gesellschaft. — Berichte für 1861/<sup>62</sup>, 1863/<sup>64</sup>.
- Gera** : Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. — Jahresbericht I—VI, 1858—63.
- Görlitz** : Naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen, Band XI, 1862; XII, 1865.
- „ Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. — Neues Lausitzisches Magazin, Band XL, Abth. 2, 1863; XLI, Abth. 1 u. 2, 1864.
- Göttingen** : Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. — Nachrichten von derselben und der Georg-Augusts-Universität, Jahrg. 1862, 63, 64.
- Gorizia** : J. R. Societa Agraria. — Atti e memorie, anno III, 1—24, 1864; anno IV, Nr. 1—12, 1865.
- Gratz** : Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. — Mittheilungen, Heft I u. II, 1863 u. 64.
- „ Geognostisch-montanistischer Verein in Steiermark. — 1) XII. Bericht für 1862. — 2) Die geologischen Verhältnisse des südöstlichen Theiles von Untersteiermark von **Th. von Zollikofer**, Wien 1862. — 3) Höhenbestimmungen in Steiermark, mit Karte von **Th. von Zollikofer** und **Gobanz**, 1864. — 4) Die neogenen Ablagerungen im Gebiete der Mürz und Mur in Ober-Steiermark von **D. Stur**, Wien 1864.
- „ K. K. Steiermärkische Landwirthschaftsgesellschaft. — Wochenblatt, redig. von **Hlubeck**, Jahrg. XI, XII, XIII für 1862, 63, 64.
- Halle** : Naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen, 4<sup>o</sup>, VI, 2—4, 1861; VII, 1, 2, 1862/<sup>63</sup>; VIII, 1, 2, 1864; IX, 1, 1865.
- „ Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. — Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften, redig. von **Giebel** und **Heintz**, Jahrg. 1861—64, Band XVIII, 7—12; XIX u. XX, 1—12; XXI, 1—5; XXII, XXXIII, XXXIV.
- „ Redaction der Zeitschrift „die Natur“, zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntniß und Naturanschauung, herausgeg. von **Ule** u. **Müller**, 4<sup>o</sup>, Jahrg. 1862, 63, 64, Heft 1—4; 1865, 1, 2.
- „ Landwirthschaftlicher Centralverein der Provinz Sachsen. — Zeitschrift, redig. von **Stadelmann**, Jahrg. 1863 u. 64, Band XX u. XXI.

- Hamburg : Naturwissenschaftlicher Verein. — Abhandlungen IV, 3, 1862.
- Hanau : Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. — Jahresbericht für 18<sup>60</sup>/<sub>61</sub> u. 1861—63.
- Hannover : Naturhistorische Gesellschaft. — Jahresbericht XI, 18<sup>60</sup>/<sub>61</sub>; XII, 18<sup>61</sup>/<sub>62</sub>; XIII, 18<sup>62</sup>/<sub>63</sub>; XIV, 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>.
- Havre : Société Havraise d'études diverses. — Recueil des publications, 1862.
- Heidelberg : Naturhistorisch-medicinischer Verein. — Verhandlungen, Band II, 6; III, 1—5.
- Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societeten. — 1) Acta, tome VII, 4<sup>o</sup>, 1863. — 2) Öfversigt af Förhandlingar, tome V, 1857—63. — 3) Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, Heft 5 u. 6, 18<sup>62</sup>/<sub>63</sub>. — 4) Bidrag till Finlands Naturkännedom, Etnografi och Statistik, Heft 8 u. 9, 1863.
- Hermannstadt : Siebenbürgischer Verein für die Naturwissenschaften. — Verhandlungen und Mittheilungen, Jahrg. XIII, XIV, XV, 1862, 63, 64.
- Innsbruck : Ferdinandeum. — 1) Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg, dritte Folge, Heft 10, 11, 12, 1861—64. — 2) Bericht für 1860, 61, 62 u. 63.
- Karlsruhe : Centralstelle für die Landwirthschaft. — 1) Landwirthschaftliches Centralblatt, Jahrg. 1862. — 2) Wochenblatt des landwirthschaftl. Vereins im Großherzogth. Baden, Jahrg. 1863 und 1864. — 3) Protokolle über die Versammlung des Centralausschusses des landw. Vereins für d. Großherz. Baden im Jahr 1862 u. 63. — 4) Statuten des Vereins, 1863.
- „ Naturwissenschaftlicher Verein. — Verhandlungen, Heft 1, 1864.
- Kiel : Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. — Mittheilungen, Heft 5, 18<sup>61</sup>/<sub>62</sub>; 6, 1863.
- Kjöbenhavn : Naturhistoriske Forening. — Videnskabelige Meddelelser for 1861, 62, 63.
- „ Kongelige Danske Videnskaberne Selskab. — Oversigt over d. Forhandlingar i Aarets 1861, 62, 63.
- Klagenfurt : Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten. — Jahrbuch, Heft 5 u. 6, 1862 u. 63.
- Königsberg : Kön. physikalisch-ökonomische Gesellschaft. — Schriften, Jahrg. II, 2, 1861; III, 1 u. 2, 1862; IV, 1 u. 2, 1863.
- „ Ostpreussische landwirthschaftl. Centralstelle und Hauptverein westpreuß. Landwirthe zu Danzig. — 1) Landwirthschaftliche Jahrbücher aus Ostpreußen, Jahrg. 13—16, 1861—64. — 2) Land- und forstwirthschaftliche Zeitung der Provinz Preußen, I. Jahrg. 1865, Nr. 1—27.
- Lausanne : Société Vaudoise des sciences naturelles. — Bulletins, tome VII, nr. 49—52, 1863—65.

- Leipzig : Kön. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. — Berichte über die Verhandlungen, Jahrg. 1862 u. 1863, I, II.
- Liège : Société Royale des sciences. — Mémoires, tome XVII, XVIII, 1862 u. 63.
- Linz : Museum Francisco-Carolinum. — 21—24ster Bericht u. 16—19te Lief. der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enz, 1861—63.
- Liverpool : Litterary and philosophical Society. — Proceedings, Nr. XVI for 1862; XVII, 1863; XVIII, 18<sup>63/64</sup>.
- London : Geological Society. — 1) Quarterly journal, vol. XVIII, 1—4, 1862; XIX, 1—4, 1863; XX, 1—4, 1864; XXI, 1865, Nr. 1, 2. — 2) Address by Huxley, 1862. — 3) List for 1862 u. 63. — 4) The Charter and Bye-Laws, 1862. — 5) Address by Ramsay, 1864.
- „ Linnean Society. — Journal of the proceedings. 1. Botany, vol. VI, Nr. 21—24, 1861 u. 62; vol. VII, Nr. 25—28, 1863; vol. VIII, Nr. 29 u. 30, 1864. 2) Zoology, vol. VI, 21—24, 1861 u. 62; VII, 25—28, 1863; VIII, 29, 1864. List for 1861—64. 4) Address of Bentham, 1863 u. 64.
- „ Society of arts and of the institution in union. — Journal, vol. XII, 18<sup>63/64</sup>; XIII, Nr. 626—60, 18<sup>64/65</sup>.
- „ Anthropological Society. — Review and Journal, Nr. I, 1863.
- Lüneburg : Naturwissenschaftlicher Verein. — 1) Jahresbericht XI, 18<sup>61/62</sup>; XII, 18<sup>62/63</sup>; XIII, 18<sup>63/64</sup>. — 2) Zur wissenschaftl. Bodenkunde des Fürstenthums Lüneburg von **Steinvorth**, 4<sup>o</sup>, 1864.
- Luxembourg : Société des sciences naturelles, tome V, 1857—62; VI, 1863; VII, 1864.
- Manchester : Literary and philosophical society. — 1) Memoirs, III. ser., vol. I, 1862. — 2) Proceedings, vol. II, 1862. — 3) Rules, 1861.
- Mannheim : Verein für Naturkunde. — Jahresbericht 28, 29 u. 30 für 1862, 63 u. 64.
- Marburg : Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.
- Marienwerder und Danzig : Landwirthschaftlicher Centralverein. — Mittheilungen, 30ster Jahrg., 1862.
- Modena : Museum di Storia naturale della R. Università. — Archivio per la Zoologia, l'Anatomia e la Fisiologia, publ. per cura del Prof. Giovanni Canestrini, vol. II, 2, 1863; III, fasc. 1, 1864.
- Moskau : Société Imp. des naturalistes. — Bulletin, année 1861, I—IV; 1862, a. I—IV; a. 1863, I—IV; a. 1864, I—IV.
- Neubrandenburg : Verein der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg. — Archiv, Jahrg. 16, 17, 18 für 1862, 63 u. 64.
- Neuchâtel : Société des sciences naturelles. — Bulletin, tome VI, 1, 2, 3, 1863 u. 64.

- Neustadt a. d. H. : Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz. — XX. u. XXI. Jahresbericht, 1863.
- Nürnberg : Germanisches Nationalmuseum. — 1) Jahresbericht für 1862. 2) Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit. N. F. Jahrg. X, 1863; XI, 1864; XII, 1865, Nr. 1—4.
- Oels : Allgemeiner landwirthschaftlicher Verein. — Arbeiten, Jahrg. 1861, 62, 63.
- Offenbach a. M. : Verein für Naturkunde. — 1) Bericht III, IV, V für 18<sup>61</sup>/<sub>62</sub>, 18<sup>62</sup>/<sub>63</sub>, 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>. — 2) Denkschrift zur Säcularfeier der Senckenbergischen Stiftung, 4<sup>o</sup>, 1863.
- Palermo : R. Istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture in Sicilia. — Giornale, Ser. III, anno I, nr. 1—6, 1863 und 1864.
- Paris : Société géologique de France. — Bulletins, tome XXI, f. 1—28, 1863—64; XXII, f. 1—7, 1864—65.
- St. Petersburg : Académie Impér. des sciences. — Bulletin, tome IV, 3—8, 1862; V, 1—8, 1863; VI, 1—5, 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>; VII, 1, 2, 1864.
- „ Kais. Gesellschaft für die gesammte Mineralogie. — Verhandlungen, 1862.
- Prag : Verein böhmischer Forstwirthe. — Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde, redig. von **Smoler**, zweite Folge, Heft I, 1862; II, III, IV, 1863; V, VI, VII, 1864; VIII, 1865.
- „ K. K. patriotisch-ökonomische Gesellschaft im Königreich Böhmen. — Centralblatt für die gesammte Landescultur, Jahrg. 12—15, 1861—64; 16, Nr. 1—20.
- „ Naturhistorischer Verein Lotos. — Zeitschrift „Lotos“, Jahrg. 4—14, 1854—64.
- Presburg : Verein für Naturkunde. — Correspondenzblatt, Jahrg. I, II, 1862, 63.
- Regensburg : Zoologisch-mineralogischer Verein. — 1) Abhandlungen, Heft 9, 1864. — 2) Correspondenzblatt, Jahrg. XVII, XVIII, 1863, 64.
- „ Kön. Bayerische botanische Gesellschaft. — Denkschriften. Band IV, 2, 1861; V, 1, 1864.
- Riga : Naturforschende Gesellschaft. — Correspondenzblatt, Jahrg. XII, XIII, XIV, 1862, 63, 64.
- Schweizerische allgemeine naturforschende Gesellschaft. — Verhandlungen bei ihren Versammlungen in Luzern i. J. 1862, in Samaden 1863, in Zürich 1864.
- Sondershausen : Verein zur Beförderung der Landwirthschaft. — 1) Verhandlungen, 21—25ster Jahrg., 1862—64. — 2) Die Land- und Forstwirthschaft des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen in ihrer Entwicklung aus der Vergangenheit in die Gegenwart, Festschrift, 1862. — 3) Die Provinz Preussen. Geschichte ihrer Cultur und Beschreibung ihrer land- und

forstwirthschaftlichen Verhältnisse. Festgabe für die Mitglieder der XXIV. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Königsberg. i. Pr., 1863.

Stettin : Entomologischer Verein. — Entomologische Zeitung, Jahrg. XXIII, 1862 nebst Repertorium für die Jahrgänge I—XXIII.

Stockholm : Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademien. — 1) Handlingar, 4<sup>o</sup>, III, 2, 1860; IV, 1, 2, 1861 u. 62. — 2) Öfversigt af Föreläsningar, Årgångar 1862 u. 63. — 3) Meteorologiska Jakttagelser Sverige, Band II, III, IV, 1860, 61, 62.

Strasbourg : Société des sciences naturelles. — Mémoires, tome V, 2, 3, 1862.

Stuttgart : Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg. — Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte, Jahrg. XVIII, Heft 1, 2, 3, 1862; XIX, 1, 2, 3, 1863; XX, 1, 2, 3, 1864; XXI, 1, 1865.

Trier : Gesellschaft für nützliche Forschungen. — 1) Jahresbericht für 1861 u. 62. — 2) Chemische Untersuchung von Gesteinen aus der Trierschen Gegend, von **Steeg**, 4<sup>o</sup>, 1863.

Upsala : Kongl. Vetenskaps-Societet. — Nova acta, ser. III, vol. IV, 1 u. 2; V, 1; 1862 u. 63.

Utrecht : Kön. Nederlandsch Meteorologisch-Institut. — 1) Meteorologische Waarnemingen i. J. 1861, 62, 63. — 2) Sur la pression moyenne de l'atmosphère en plusieurs lieux de l'Europe par **Ballot**, Amsterdam 1864. — 3) Notices sur les observations météorologiques dans les pays-bas et dans les possessions aux Indes orientales et occidentales. Utrecht 1858.

Venezia : I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. — Atti, ser. III, tome IX, 1—10, 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>; X, 1—4, 18<sup>64</sup>/<sub>65</sub>.

Washington : Smithsonian Institution. — 1) Annual report for 1860, 61 u. 62. — 2) Miscellaneous collections, vol. I—IV, 1862; V, 1863. — 3) Results of meteorological observations, made under the Direction of the United States patent office and the Smithsonian Institution, from the year 1854 to 1859, 4<sup>o</sup>, vol. I, Washington 1861. — 4) Catalogue of the army medical museum, 1863. — 5) Sickness and mortality of the army during the first year of the war, from medical museum.

6) Boston : Society of natural history. a) Proceedings, VIII, 1861—62; IX, sig. 1—20, 1863. b) Boston-Journal of natural history, vol. VII, 2, 3, 4, 1861—63. c) Constitution and By-laws, 1855. d) Annual report of the trustees of the museum of comparative zoölogy, for 1862 u. 63. e) Address, 1863 u. 64.

7) Cambridge Massachusetts: Museum of comparative zoology. — Bulletin, 1863.

8) Columbus : Ohio-Staats-Landbaubehörde. — Jahresbericht für 1860, 61, 62.

- 9) S. Francisco : California Academy of natural sciences. — Proceedings, vol. II, 1858—62.
- 10) St. Louis : Academy of sciences. — Transactions, vol. II, 1, 1863.
- 11) New-York : Lyceum of natural history. — Annals, vol. VII, 10—16, 1861 u. 62; VIII, 1, 1863.
- 12) Philadelphia : Academy of natural sciences. — a) Proceedings for 1861, sig. 7—36; 1862, 1—12. b) Manual of public libraries, institutions and societies in the United States and British Provinces of N. A. by **Rhees**, 1859.
- 13) Philadelphia : American philosophical Society. — Proceedings, vol. VII, Nr. 64, 1863.
- Wien : Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. — 1) Sitzungsberichte, Band XLIV, 1—5 bis XLIX, 1—5 in Abth. I und II, 1862 bis 1864, 60 Hefte. — 2) Register zu Band XXXI bis XLII.
- „ K. K. geologische Reichsanstalt. — Jahrbuch, XII, 3—4, 1862; XIII, 1—3 nebst Generalregister der ersten 10 Bände, 1863; XIV, 1—4, 1864; XV, 1, 1865.
- „ K. K. zoologisch-botanische Gesellschaft. — 1) Verhandlungen, Band XI, 1—4, 1861; XII, 1, 2, 1862, nebst Register für die Jahrg. 1856 bis 1860; XIII u. XIV, 1863 u. 64. — 2) Nachträge zu Maly's enumeratio plantarum phanerogamicarum imperii Austriaci von **Neilreich**, 1861. — 3) Monographie der Oestriden von **Brauer**, 1863.
- „ K. K. geographische Gesellschaft. — Mittheilungen, red. von **Fötterle**, Jahrg. V, 1861; VI, 1862; VII, 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>.
- „ Redaction der entomologischen Monatsschrift, herausg. von **J. Lederer** und **L. Miller**, Band I—VII, Wien 1857—63.
- Wiesbaden : Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau. — Jahrbücher, Heft 16, 1861.
- „ Verein nassauischer Land- und Forstwirthe. — Wochenblatt, N. F. Jahrg. XIV—XVI für 1862, 63, 64; XVII, 1—27, 1865.
- Würzburg : Physicalisch-medicinische Gesellschaft. — Naturwissenschaftliche Zeitschrift III, 1—4, 1862; IV, 1, 2, 3, 1863; V, 1—4, 1864.
- „ Polytechnischer Verein. — Gemeinnützige Wochenschrift, Jahrg. XIII u. XIV, 1863 u. 64; XV, 1—26, 1865.
- Zürich : Naturforschende Gesellschaft. — Vierteljahrsschrift, red. von **Wolf**, Jahrg. VI, VII, VIII, 1861, 62, 63.
- Zweibrücken : Naturhistorischer Verein. — I. Jahresbericht für 18<sup>63</sup>/<sub>64</sub>.

### Anlage III.

## Verzeichniss der Geschenke von Mitgliedern und Gönnern der Gesellschaft für die Bibliothek \*).

- Berend.** Medicinische Reiseskizzen aus England im Sommer 1862. Berlin, 1863. Geschenk von Herrn Prof. Phöbus.
- Birnbaum, Fr.** Untersuchungen über den Bau der Eihäute bei Säugethieren. Gießen, 1863.
- Böck.** Vorläufige Uebersicht der während der Reise der Fregatte Novara von den Herrn Naturforschern gesammelten Spinnen. Wien, 1861. Geschenk v. Herrn Ritter von Frauenfeld in Wien.
- Brunner von Wattenwyl.** Ueber die von der k. k. Fregatte Novara mitgebrachten Orthoptern. Wien, 1862 (Sep. Abdr.). Geschenk des Herrn Ritter von Frauenfeld in Wien.
- Buchenau.** Die botanischen Producte der Londoner Industrie-Ausstellung. Bremen, 1863.
- Buchner, O.** Zweites Quellenverzeichniss zur Literatur der Meteoriten, 4<sup>o</sup>. Frankfurt a. M., 1863.
- „ Ueber Erdöllampen (Separ. Abdr.) 1863.
- „ Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Geschichte, mineralogische und chemische Beschaffenheit. Leipzig, 1863.
- „ Separatabdrücke von verschiedenen Aufsätzen im Gewerbeblatt f. d. Gr. Hessen, über Erdöllampen, Prüfung des Leuchtgases, die Verschiedenheit der Mineralöle etc. 1864.
- „ Ursprung der Meteoriten, Sep. Abdr. aus der Zeitschrift: „Aus der Natur“.
- Dittrich.** Der Kurort Salzschlirf im Kurfürst. Hessen. Kassel und Göttingen, 1863.
- v. Frauenfeld.** Der Aufenthalt auf Manila während der Weltreise der k. k. Fregatte Novara. Wien, 1861.
- „ Versuch einer Aufzählung der Arten *Bithynia* Lch. und *Nematura* Bns. Wien, 1862. Sep. Abdr.
- „ Beitrag zur Insectengeschichte aus d. J. 1861. Wien, 1862.
- „ Ueber ein neues Höhlen-Carychium und zwei neue fossile Paludinen. Wien (Sep. Abdr.).
- „ Eine für Oestreich neue Trypeta. Wien, 1861.
- „ Ueber die s. g. Sägespän-See, beobachtet während der Weltreise der Novara. Wien, 1862.
- „ Bericht über eine Reise durch Schweden und Norwegen im Sommer 1863. Wien, 1863.

---

\*) Der Verf. ist auch der Geschenkgeber, wenn nicht eine besondere Bemerkung angefügt ist.

- v. Frauenfeld.** Beitrag zur Metamorphosengeschichte aus d. J. 1862. Wien, 1863.
- „ Vorläufige Aufzählung der Arten der Gattungen *Hydrobia* Htm. und *Ammicola* Gld. Hldm. in der kaiserl. Sammlung. Wien, 1863.
- „ Bemerkungen über *Strigops habroptilus*, von Haast, aus dem Engl. übersetzt. Wien, 1863.
- „ Das Vorkommen des Parasitismus im Thier- und Pflanzenreiche. Wien, 1864.
- „ Zoologische Miscellen, Nr. I, II, III. Wien, 1864.
- „ Entomologische Fragmente. Wien, 1864.
- „ Ueber in der Gefangenschaft geborene Jungen von *Salamandra maculosa*. Wien, 1864.
- „ Ueber einige Pflanzenverwüster. Wien, 1864.
- v. Gauger.** Repertorium für Pharmacie und practische Chemie in Rußland, VII. Jahrg., Heft 12. St. Petersburg, 1863.
- Glaser.** Der neue Borkhausen oder hessisch-rheinische Falterfauna, Darmstadt, 1863.
- „ Naturgeschichtliche Beschreibung der Wormser Rheinebene, 4<sup>o</sup>. Worms, 1865.
- Gistel.** Die Mysterien der europäischen Insectenwelt. Kempten, 1856.
- Haberlandt.** Ueber *Cecidomyia destructor* Say, Weizengallmücke oder Weizenverwüster. Wien, 1864. Geschenk von Herrn Ritter von Frauenfeld in Wien.
- „ Ueber eine bisher wenig beobachtete Getreidemotte, *Tinea pyrophagella*. Wien, 1864. Geschenk wie vorher.
- v. Hauer.** Der Salinenbetrieb im österreichischen und steiermärkischen Salzkammergute in chemischer Beziehung. Wien, 1864.
- Haupt.** Erfahrungen über die Zucht des Yama-may-Guér-Mén. Bamberg, 1865.
- Hessenberg.** Mineralogische Notizen, Nr. 5 u. 6, Frankfurt, 1863 u. 64.
- Hoffmann, Herm.** Ueber Düngung mit Nephelin-Dolerit (Separ. Abdr.).
- „ Untersuchungen zur Klima- und Bodenkunde mit Rücksicht auf die Vegetation, 4<sup>o</sup>, o. O. u. J.
- Kohrer.** Ueber die Zusammenziehungen des weiblichen Genitalcanals, 4<sup>o</sup>. Gießen, 1863.
- Kisch.** Ueber die kohlen. Gasbäder Marienbads. Wien, 1863.
- „ Marienbad im Sommer 1864 nebst Bemerkungen zur Balneotherapie der chronischen Metritis. Prag, 1865.
- Kleinhaus.** Erfahrungen aus dem Gebiete der Hautkrankheiten. Coblenz, 1862.
- Körner.** Zur Kenntniß der Bildung des Senföls aus dem Samen des schwarzen Senfs (Separ. Abdr.).
- v. Kokscharow.** Materialien zur Mineralogie Rußlands, nebst Atlas, Band IV. St. Petersburg, 1861—62.

- Künstler.** Ueber Getreideverwüster. Wien, 1864. Geschenk des Herrn Ritter von Frauenfeld in Wien.
- Ludwig.** Die Kochsalz- und Eisensäuerlinge zu Pirmont. Darmstadt, 1862.
- „ Zur Paläontologie des Urals, 4<sup>o</sup>. Cassel, 1862.
- Petri.** Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Wassercur. Coblenz, 1865.
- Phöbus.** Die Preussische Pharmakopöe, 7te Ausgabe von Völcker. Recension derselben, 1863.
- „ Die Delondre-Bouchardatschen China-Rinden. Gießen, 1864.
- v. Planta Reichenau.** Chemische Untersuchung der Schwefelquellen zu Alvenau im Canton Graubünden. Chur, 1864.
- „ Chemische Untersuchung der Heilquellen zu Bormio (Worms) im Veltliner Thale. Chur, 1860.
- „ Die Heilquellen zu Alvenau, Tiefenkasten, Solis im Canton Graubünden. Chur, 1865.
- Rolle, Friedrich.** Ueber die geologische Stellung der Sotzka-Schichten in Steiermark. Wien, 1858.
- „ Ueber einige neue Acephalenarten aus den unteren Tertiärschichten Oesterreichs. Wien, 1859.
- „ Ueber die geologische Stellung der Horner Schichten in Nieder-Oesterreich. Wien, 1859.
- Sandberger, Fridolin.** Die Flora der oberen Steinkohlenformation im badischen Schwarzwalde, 4<sup>o</sup>, o. O. u. J.
- „ Zur Erläuterung der geologischen Karte der Umgebung von Carlsruhe, 4<sup>o</sup>.
- v. Saytzeff.** Ueber Diamidosalicylsäure (Separ. Abdr.).
- „ Action du Cyanate de potasse sur l'éther monochloracétique, 4<sup>o</sup>. Paris, 1865.
- Scharff, Friedrich.** Der kohlen saure Kalk. Stuttgart, 1862.
- „ Ueber Bleiglanz-Krystalle (Separ. Abdr.).
- „ Ueber den Zwillingsbau des Quarzes (Separ. Abdr.).
- Schauenburg.** Baunscheidt's Lebenswecker oder die exanthematische Heilmethode, Theil 1 u. 2. Godesberg u. Leipzig, 1863 u. 64.
- v. Schlagintweit, Hermann.** Meteorologische Resultate aus Indien und Hochasien (Separ. Abdr.). Geschenk des Herrn Robert v. Schlagintweit.
- v. Schlagintweit, Robert.** Enumeration of the hot springs of India and High-Asia (Separ. Abdr.).
- Schultz, Bipontinus.** *Lychnophora* Martius und einige benachbarte Gattungen. Neustadt a. d. H., 1864.
- Söchting.** Zur Paragenesis des Glimmers und über Einschlüsse in den Krystallen russischer Mineralien. St. Petersburg, 1862.
- „ Der Fortschritt der physikalischen Geographie im J. 1861 u. 62. Berlin, 1863 u. 64.
- Spengler.** Ueber die Inhalation der Emser Thermalgase gegen *Pharyngo-Laryngitis granulosa*, 4. Aufl. Neuwied u. Leipzig, 1864.

- Spengler.** Zusammenstellung einiger Urtheile über die Gasinhalationen zu Bad Ems. Neuwied u. Leipzig, 1864.
- Stiebel.** Jubeldissertation für Aerzte, Erzieher und Kinderpfleger. Frankfurt a. M., 1865.
- Tassi, Attilio.** Sulla flora della provincia Senese e Maremma Toscana. Siena, 1862.
- Temple, Rud.** Die Gebirgsbewohner in Galizien, Beitrag zur Völkerkunde des Kaiserthums Oesterreich. Wien, 1860.
- „ Die nördlichen Abfälle oder die Galizische Seite der Karpathen, geographisch-historisch skizzirt. Wien, 1861.
- „ Ueber die polnische Nation in der österreichischen Monarchie. Wien, 1863.
- „ Das Tatragebirge in Galizien, seine Bewohner und deren Sagen. Wien, 1863.
- „ Das Mineralbad Krynica, mit Rücksicht auf Galiziens Heilbrunnen. Wien, 1864.
- Ullersperger.** Memoria sobre la influencia del cultivo del arroz y exposicion de las medidas conducentes a evitar todo daño o rebajar los que sean inevitables, 4<sup>o</sup>. Madrid, 1864.
- Valentiner.** Aperçu medical et renseignements généraux sur les eaux de Pyrmont. Leipzig, 1864.
- Will u. Kopp.** Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie u. verwandter Wissenschaften für 1861, 2. Hälfte, Gießen, 1863; für 1862, Heft 1 u. 2, 1863; für 1863, Heft 1 u. 2, 1864. Geschenk des Herrn Verlegers Ricker.
- v. Zepharovich.** Der Diamant, ein populärer Vortrag. Graz, 1862.
- „ Krystallographische Mittheilungen aus dem Laboratorium der Universität zu Graz. Wien, 1863.



## Aufforderung an die Freunde der Pflanzenkunde.

Ich erlaube mir die Bitte, mich mit möglichst genauen Angaben über das Vorkommen oder Fehlen (wo möglich mit Rücksicht auf die geognostischen Verhältnisse) der nachstehend verzeichneten Pflanzen aus dem Landstriche zwischen Siegburg, Hersfeld, Mergentheim und Zweibrücken zu unterstützen, da ich damit beschäftigt bin, in den nächsten Jahren eine Anzahl pflanzengeographischer Specialkarten aus dem betreffenden Gebiete zu veröffentlichen. Ich ersuche die Beobachter, sich aus den Folgenden diejenigen Species auszuwählen, welche ihnen am nächsten zugänglich sind.


Giefßen, 10. Juli 1864.

**H. Hoffmann**, Professor.

Die Species sind im Sinne von **Koch's** Synopsis genommen. 1) *Alysum calycinum*. 2) *Amaranthus retroflexus*. 3) *Anagallis arvensis*. 4) *Anagallis coerulea*. 5) *Anthyllis Vulneraria*. 6) *Arnica montana*. 7) *Artemisia campestris*. 8) *Aster Amellus*. 9) *Campanula patula*. 10) *Centaurea Calci-trapa*. 11) *Centaurea Jacea*. 12) *Centaurea montana*. 13) *Centaurea nigra*. 14) *Chondrilla juncea* (*C. latifolia*). 15) *Chrysanthemum segetum*. 16) *Cynanchrum Vincetoxicum*. 17) *Cytisus sagittalis*. 18) *Delphinium Consolida*. 19) *Dianthus deltoides*. 20) *Dianthus prolifer*. 21) *Digitalis purpurea*. 22) *Diptotaxis tenuifolia*. 23) *Euphrasia lutea*. 24) *Genista germanica*. 25) *Genista pilosa*. 26) *Gentiana ciliata*. 27) *Gentiana germanica*. 28) *Helianthemum vulgare*. 29) *Helleborus foetidus*. 30) *Isatis tinctoria*. 31) *Lathyrus tuberosus*. 32) *Lepidium graminifolium*. 33) *Linosyris vulgaris*. 34) *Matricaria Chamomilla*. 35) *Mentha rotundifolia*. 36) *Papaver Rhoeas*. 37) *Polypodium Dryopteris*. 38) *Prenanthes purpurea*. 39) *Raphanus Raphanistrum*; a. flore albido; b. flore

sulphureo. 40) *Reseda lutea*. 41) *Reseda Luteola*. 42) *Rosa arvensis*.  
43) *Rosa pimpinellifolia*. 44) *Rosa rubiginosa*. 45) *Sambucus Ebulus*.  
46) *Saponaria Vaccaria*. 47) *Sarothamnus vulgaris* (*Spartium scoparium* L.).  
48) *Scabiosa Columbaria*. 49) *Sedum reflexum* (c. v. *glauca*). 50) *Sinapis*  
*arvensis*. 51) *Sisymbrium Sophia*. 52) *Stachys recta*. 53) *Teucrium Botrys*.  
54) *Teucrium Chamaedrys*. 55) *Teucrium Scorodonia*. 56) *Viburnum Lan-*  
*tana*. 57) *Viola tricolor*; a. flore subluteo; b) flore coeruleo-violaceo;  
c) flore vario.


---











3 2044 106 272 735

